

Alvorens te beginnen wil ik eerst een probleempje aan de orde stellen. Er is niet zoals je misschien zou verwachten een gebrek aan copy voor deze rubriek, maar het spul dat ik binnen krijg komt altijd van dezelfde mensen. Zoek daarom even of je wat kunt vinden en maak er een klein artikeltje van! (vriendelijk bedoelt)

Lex

AGRESSIEVE GEDRAGINGEN VAN BOOMKLEVERS TEGENOVER PIMPELMEZEN.

Op 24-04-'78 nam ik in de Hertgang 2 Boomklevers waar. Beide exemplaren zaten in een eik waarin een hol bevond dat bezet was door een paartje Pimpelmezen. Steeds als één van de mezen het hol verliet werd deze door de Boomklevers bedreigd waarbij sissende geluiden werden gemaakt. Soms werden ze zelfs tot ver uit de omgeving van hun nestplaats verjaagd. Waarschijnlijk is de verklaring voor dit gedrag, dat de Boomklevers het hol als broedplaats wilden innemen. Twee weken later bleken ze zich echter ca 20 meter verderop in het gebied gevestigd te hebben.

Lex

KUIFAALSCHOLVERS WAARGENOMEN IN DE KEMPEN.

Op 24-04-'79 bevond Koos Venema zich aan het Goorven. Het was rustig en zonnig weer. De zon stond in het westen zodat het licht ideaal was.

Turende door zijn "Celestron" ontdekte hij om 17.30u 3 vrij grote vogels die zijn richting in kwamen. Toen ze dichterbij gekomen waren en zelfs op ca 75 meter afstand op het ven plaats namen, zag hij dat het Aalscholvers waren, maar het volgende viel hem op: De vogels hadden geen witte dijvlekken en geen wit aan de kop. Het waren geen onv. Aalscholvers daar de borst egaal zwart was. Het donkergeel van de snavel liep door tot achter het oog. Over het diepzwarte verenkleed lag een staalblauwe tot groene schijn. Verder gaven ze Koos een veel elegantere en fijner gebouwde indruk. Kortom, hij had al gauw door hier niet met gewone Aalscholvers te doen te hebben. Na een tijd gedoken te hebben, vertrok het drietal om 18.20u in oostelijke richting.

Thuis aangekomen kon Koos later, na het raadplegen van wat literatuur, de vogels determineren als zijnde Kuifaalscholvers. Deze waarneming is zeer bijzonder daar Kuifaalscholvers ten eerste echte kustvogels zijn die zich zelden naar het binnenland begeven, en ten tweede, ook aan de kust van Nederland maar zelden gezien worden. De Avifauna van Noord-Brabant meldt dan ook geen enkele waarneming uit onze provincie.

- Koos bedankt voor je gegevens.

RANSUILEN OP VOGELJACHT IN DE STAD.

Eind juli hoorde ik 's nachts om ca 1uur een enorm lawaai van Merels die bij ons in de straat in meelbessen sliepen. Buiten gekomen zag ik onmiddellijk de oorzaak; in het licht van de lantaarns zag ik een Ransuil die zich herhaaldelijk in de dichte kruinen van de struiken "ploffen". Het was hem duidelijk te doen om een vette merelbout. Ik kon helaas niet zien of hij succes had.

Ditzelfde zag ik een paar jaar geleden in een andere straat

van Woensel. Daar sliepen de Merels in Robinia's en ook hier vloog de uil van boom tot boom. Tel ik hierbij een aantal incidentele waarnemingen van Ransuilen op (in dezelfde buurt), dan lijkt het er veel op dat sommige Ransuilen (dezelfde???) zich althans gedurende een bepaalde tijd op vogels (in de stad) specialiseren. Alle waarnemingen stammen uit de nazomer, herfst en/of winter. Overigens hoor je volièrehouders wel eens klagen dat zij last van uilen hebben, waarschijnlijk vrijwel allemaal Ransuilen. Maar zelf heb ik ook een Kerkuil ooit volièrevogels zien belagen!?

Frank

-Bij het doornemen van bovenstaand stukje schoot me te binnen dat er bij Ties op zijn jacht eens een Havik gezeten had die gespecialiseerd was op het grijpen van spechten. Het is misschien wel leuk wat van dergelijke ervaringen, met aanpassingen van de jachtwijze van roofvogels aan het prooiaanbod, te verzamelen.

Zie voor een ander voorbeeld verderop in deze rubriek.

GEMERKTE KOKMEEUW.

Op 180579 werd op de Flaes mijn aandacht getrokken door een Kokmeeuw met een geel merkteken. Het plaatje was bevestigd aan de onderzijde van de rechtersvleugel en voorzien van een zwart opschrift dat door de afstand onmogelijk te lezen was. Toevallig had kort daarvoor een oproep in het vogeljaar gestaan m.b.t. dit soort waarnemingen. De studie had tot doel via het individueel merken van Kokmeeuwen een beter inzicht te verkrijgen in de taakverdeling bij het nest gedurende de broedtijd.

Na de gegevens doorgespeeld te hebben aan het Laboratorium voor Systematiek en Ecologie van het Zoologisch Instituut te Leuven (Naamsestraat 59), ontving ik bericht dat de vogel op 14 april 1979 in de omgeving van Snipkensvijver bij Herentals geringd en gemerkt was. De waarneming was des te interessanter omdat men verwacht had dat alle Kokmeeuwen die op de genoemde datum gevangen waren aldaar broedvogel zouden zijn. Het betrof hier dus nog een late doortrekker.

Lex

OPVALLENDE TREK VAN GRAUWE KIEKENDIEVEN DOOR DE KEMPEN.

Tegenwoordig worden bij ons zeer zelden Grauwe Kiekendieven waargenomen (ongeveer 'n halve per jaar). Dit jaar was dit echter anders.

De volgende gegevens werden mij bekend: (Voorjaar) ♂ Zwart Kot (L. Peeters), ♂ Budeldorplein (H. Lurling), en gedurende enkele dagen ♂ Strabrechtse Heide (H. Hendriks).

(Najaar) ♀ Budeldorplein (L. Peeters, P. Voorn, Wvd Voort), ♂ Malpie (T. Heynen), ♂ Eckersweyer (T. Heynen, F. Neyts), ♂ Beleven, Reusel, (J. Wouters).

Mark Smets (Wielewaal, afd. Turnhout) vertelde me verder dat ook in hun werkgebied een ongewoon aantal exemplaren waren doorgetrokken.

Lex

"DE TWEEMAANDELIJKSE HOOGVLIEGER(S)"

In een kersenboom bij de familie Sanders te Reusel werd op 1-7-'75 een spreeuw bemachtigd. (Hoe!?: red.) De vogel was