

De waarnemingen hieronder geplaatst komen uit de tweede helft van 1979.

Geeoorde fuut:(Frank Neyts):23 en 25.07 1 ex.in prachtkleed Ekkersweyer.De soort is hier geen broedvogel.11.09 1 ex.in winterkleed afgraving Philipsvijvers.

Aalscholver(Frank Neyts):06.09 2 exx.Ringselven Budel Dorpplein.21.10 2 exx. i Valkenswaardse visvijvers.(V.V.V.)

Purperreiger(Lex Peeters,Tom + Maarten):1 ex.bij de V.V.V.De avifauna geeft als laatste datum 29 okt.1 ex.Tilburg in 1965.(mededeling Vimb,21) en voorts een winterwaarneming op 20 dec.1962 1 ex. geschoten bij Veldhoven.

Krakeend(F.Neyts,Rob,Ruud Bouman):21.10 1 groep van 75 en 1 groep van 10 exx.V.V. Smient:21.10 2 ♂♂ op V.V.V.(F.Neyts,Rob,Ruud Bouman).06.11 3 ♂♂ op het Grootmeer.

08.12 2 ♂♂ op het Beuven(Henk Hendriks,Ruud Bouman).

Brilduiker:07.11 de Heesch;10.11 m + v Lansard;14.11 3 m. + 7 v. de Heesch; 27.11 3 m. + 8 v. de Heesch.(F.Neyts)

Eidereend(F.Neyts)21.09 10 exx.(alle eerstejaars) de Heesch.Deze exx. zijn mogelijk hier terechtgekomen door de storm die enkele dagen ervoor boven de Noordzee woedde(windkracht 9/10 langs de kust).

Middelste zaagbek(Lex Peeters):22-12 3 vr.op het Goorven.De vogels zaten voortdurend op 30-60 meter afstand en waren volop aan het duiken.Borst duidelijk licht (wit) en niet zoals bij de grote zaagbek veelal opvalt rozeachtig.Hals grijs/bruin waardoor de overgang tussen de de bruine keel/kop niet zo goed opviel,wat echter wel het geval is bij de grote zaagbek.Bij de grote zaagbek is de nek wit.De drie waren ongeveer even groot als de wilde eenden,die volop ter vergelijking aanwezig waren en hadden een fijne lichaamsbouw(niet zo plomp als bij een grote zaagbek). De kuif was niet opvallend groot.Ik heb niet kunnen zien of deze een- of tweedelig was.Het licht was gunstig(zon scheen uit het Z.westen en werd door bewolking gedempt).Na ca. 50 min. verdwenen ze in Z.westelijke richting.

Grote zaagbek(Wim de Kroon,Nico Venema) 25.12 4 v.het Goorven.

Bergeend: 29.08 2 exx. Keyenhurk(F.Neyts);10.11 1 ex. Beuven(H.Hendriks).

Zwarte wouw(Ruud Bouman).14.7 1 ex.omgeving Scheidingsven,Strabrecht.De vogel kwam op ong. 100 m. afstand laag voorbij vliegen.Onmiddellijk vielen de smalle ietwat geknikte(verg.met buizerd)vleugels op en de licht gevorkte staart.Opvallend was ook dat het beest in glijvlucht de staart regelmatig van links naar rechts bewoog.Het verenkleed had de typerende zwart/bruin tekening van een adult ex.Boven het scheidingsven begon de vogel omhoog te schroeven en verdween toen in de richting van Mierlo.Het was die dag helder en zonnig weer en ik had dezon in de rug.

Ruigpootbuizerd(Frank Neyts)24-10,1 ex.zwevend over de Heesch.Eerste indruk was kiekendiefachtig(b.v. bruine).De vogel had langere rechttere vleugels,relatief wat langere staart dan buizerd.Verder vrij licht met donkere polsvlekken en donkere buik.Staart wit met zwarte eindband.Bij het afweren van een paar zwarte kraaien waren de witbevederde poten goed te zien.(buizerd gele poten).De vogel vloog op dat moment op ca. 40 m. afstand(nagemeten!) en ca. 20 m. hoogte.Op grotere afstand viel op:"fraaiere"proporties dan buizerd,groter,eleganter met iets langere kop en staart en rechttere en langere vleugels.

Wespendief(Frank Neyts):07-10 1 ex.overvliegend Varkensput(Nuenen).De vogel maakte een slanke indruk met een klein "duivenkopje",lange staart met 3 duidelijke banden.Veel soepeler vliegend dan buizerd.

Slechtvalk(Ruud Bouman):19-7 1 ex.omgeving Grafven,Strabrechtse heide.Ik zag de vogel in eerste instantie op vrij grote afstand in een dode boom bij het Grafven zitten.Op dat moment dacht ik met een boomvalk te maken te hebben.Op een gegeven ogenblik echter vloog de vogel op en stootte op een biddende torenvalk.Onmiddellijk viel toen de grootte van het beest op i.v.m.de torenvalk.Ongeveer 5-10 min. stootduikend waar kunnen nemen waarbij de vogel fabelachtige snelheden bereikte.Het was een juveniel ex.aangezien de vogel van onderen zwaar in de lengte was gestreept en van boven donkerbruin was. D



Grauwe kiekendief(F.Neyts): ♂ naar zzw.Ekkerswijer(en THE).Hoewel uitsluitend in silhouet gezien m.i.onmiskenbaar:maakte de indruk van een soort supertorenvalk, uiterst slanke,elegante en vrij kleine roofvogel met typische kiekendiefvlucht. (dat elegante deed Tom in eerste instantie uitroepen:een"wouw!"

Roodpootvalk(F.Neyts):06-09 ♂ adult en ♂ onvolwassen Ringselven,Budel-dorpplein. ♂ adult:vrij donker grijs met zilverkleurige grote slagpennen,afstekend tegen donkere vleugeldekveren.Onderzijde was egaal grijs.Maakte zwarte sternachtige indruk maar met grote snelheid jagend op insecten bijna als boomvalk.(waarmee kon worden vergeleken).♂ onvolwassen had een zeer lichte onderzijde i.t.t.jonge boomvalk of torenvalk.Gedrag identiek aan ♂ adult.Opvallend is dat van 7-10 juni op de strabrechtse heide zich ook 2 roodpootvalken op hielden en wel dezelfde combinatie(♂ adult en ♂ onvolwassen).(mededeling H.Hendriks).Op 9-06 konden wij op strabrecht langdurig van dichtbij(100 m.) het ♂ onvolwassen bekijken door een 60 maal zoomtelescoop.De vogel had een zeer lichte borst ,bijna egaal wit,was grijsachtig op de schedel,rug en vleugels met uitzondering van de vleugelpunten die duidelijk donkerder waren.Verder waren de wangen licht en vertoonden een aanzet tot een lichte halsring.Deze beschrijving blijkt bijna exact te kloppen met de beschrijving die in de "Flight Identification"gegeven wordt van een onvolwassen . Overigens een onvolwassen ♂ is een tweede jaars vogel.In de"Flight Identification" wordt gesproken van een "first summer male"en een "juvenile".Het onvolwassen ex. op Strabrecht en B.Dorpplein was dus een "first summer male".

Smelleken:19-10 ♂ op Strabrecht(F.Neyts).6-12 ♀ op Strabrecht(H.Hendriks).

Er overwinteren elk jaar enkele exx. op de strabrechtse heide,

Waterral:21-10 2 exx.slachtoffer van havik of sperwer(V.V.V.F.Neyts,R.en R.Bouman)

Zilverplevier:19-10 1 ex.gehoord en gezien bij Beuven(F.Neyts).

Bontbekplevier:06-09 1 ex.Ekkerswijer;08-09 1 ex.bij Acht(F.Neyts).

Bonte strandloper:12-09 1 ex.Loozerheide(H.Hendriks,F.Neyts),08-10 3 exx.Ekkerswijer(F.Neyts).

Krombekstrandloper:18-08 4 exx.Ekkerswijer,19-08 2 exx.Ekkerswijer,20-08 2 exx.Ekkerswijer(F.Neyts).12-09 4 exx.Loozerheide(H.Hendriks,T.Heijnen,F.Neyts).

Drieteenstrandloper:12-09 1 ex.Loozerheide (Hendriks,F.Neyts).

Dwergmeeuw:18-08 1 juv.ex.Ekkerswijer(F.Neyts).

Kleine mantelmeeuw:13-09 1 ex. Beuven(H.Hendriks).De vogel vloog tussen enkele zilvermeeuwen,waartussen hij een wat kleinere en slankere indruk maakte.

Drieteenmeeuw:11-11 1 adult ex.bij de Hees,Eersel(Lex Peeters).Vloog tussen een groepje van 11 stormmeeuwen.Viel het eerst op beweeglijker gedrag(soepelere vleugelslag).Vleugelpunten waren geheel zwart i.t.t. de stormmeeuwen die ook enigszins groter leken.Snavel duidelijk licht.Verder een gedrongener postuur en grijze boven vleugels.

IJsvogel:17-09 1 ex.Ekkerswijer(F.Neyts).30-09 1 ex.Ringselven(H.Hendriks e.a.) 07-10 1 ex.Eindhovenskanaal(Collse zegge),F.Neyts,12-10 1 ex.Collse zegge(Maatman)

Waterpieper:13-10 1 ex.zandvanger Tongelreep(F.Neyts),10-11 14 exx.weiland bij de Philips visvijvers en op 1-12 5 exx.weiland langs Dommel(T.Heijnen),14,15-12 2 ex langs de Dommel Geldrop(H.Hendriks).De indruk bestaat wel dat er dit jaar duidelijk minder waterpiepers gezien zijn dan andere jaren.Oorzaak?

Grote gele kwikstaart:02-10 5 exx. langs de Dommel tussen waterzuivering en samenkomst met kleine Dommel.(F.Neyts).Langs dit stukje Dommel kan men in het winterhalfjaar praktisch altijd 1 of 2 grote gele kwikken aantreffen.Blijkbaar zijn de overwinterings,voedselomstandigheden voor deze soort hier erg gunstig.Tijdens 6 bezoeken in nov.,dec. en jan. nam ik hier altijd 1 of 2 exx.waar(H.Hendriks).

Paapje:06-09 13 exx.lupinenveld B.Dorpplein,7 exx.erwtentakker Ekkerswijer(F.Neyts) 11-09 7 exx. Dommelbeemden.(F.Neyts).

Tjif tjaf:10-11 1 ex. zingend Ekkerswijer(F.Neyts).

Kruisbek:Aangezien er in juli een invasie van deze soort in midden nederland plaatsvond(vrnl.Veluwe) was het te verwachten dat er ook in de Kempen kruisbekken gezien zouden worden.Temeer daar er in ons gebied voldoende geschikt terrein voor de kruisbek aanwezig is.Deze verwachting is niet helemaal uitgekomen.Oorzaak?

29-08 3 exx. boswachterij Hapert(T.Heijnen,F.Neyts).19-10 2 exx.Strabrecht(Neyts) 09-11 3 exx.overvliegend Groot Meer.(F.Neyts).

Keep:Opvallend meer kepen dan andere jaren.In dec.regelmatig groepen van 80-100 exx.gezien Hulsterbroek Geldrop.Vaak alleen kepen geen andere vinkachtigen(Hendr.



Zo dat was nu de eerste maal dat deze waarnemingenrubriek "serieus" verscheen (zie Lustrumnummer). Ik dacht dat ik er wel in geslaagd was een droge opsomming van soorten te vermijden; zie de beschrijvingen van de diverse soorten.

Weliswaar is het gelukt om 2 volle pagina's waarnemingen te bespreken, maar het is te hopen dat in de toekomst méer mensen hun bijdrage aan deze rubriek willen leveren. Tenslotte is het een rubriek die alleen maar kan bestaan met de medewerking van de leden!

Het ligt in de bedoeling om voortaan ruimte te kreëren voor reakties (positief of negatief) op beschreven waarnemingen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de reakties op de foto's van duikers in "het Vogeljaar".

Om de zaak wat te verlevendigen lijkt het mij wel leuk wanneer mensen schetsjes van een waargenomen soort opsturen. Voorbeelden: silhouet van vrouwen, kiekendieven, wespdiëven, of: typische houdingen en/of gedragingen, enz. Het hoeven echt geen artistieke kunstwerken te zijn!

Jongens, bedankt voor de inzendingen. Vogelaars die hun waarnemingen voor de volgende keer in willen sturen, zend deze s.v.p. aan:

Henk Hendriks

Groesstraat 5

Geldrop tel.: 040 - 85 33 72

N.B. Waarnemingen van bijzondere soorten (zie deze aflevering) graag vergezeld van een behoorlijke beschrijving.

N.B. 2: Als iemand wil reageren op de opzet van deze rubriek dan wil ik graag met hem (of haar) van gedachten wisselen.

Groetjes, Henk.