

# 10 jaar broedvogelinventarisatie Langeveld

*Gab de Croock*



In 2012 kwam bij onze vereniging het verzoek binnen van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) of wij de capaciteit en behoefte hadden om het Natuurontwikkelingsgebied Het Langeveld te inventariseren op broedvogels. Uiteraard konden wij aan dit verzoek voldoen en in 2013 werd het eerste onderzoek gedaan volgens de Broedvogel Monitoring Project (BMP) methode.

Wij konden toen niet vermoeden dat dit gebied zo een gevarieerdheid aan vogels had, dat wij, na inmiddels tien jaar inventariseren, hier zeker nog jaren mee door willen gaan. De inventarisaties werden verricht door mij in samenwerking met Jan Jacobs en Jos Zonneveld.

Naast het inventariseren worden ook vogelzangrondleidingen voor het ZHL verricht. Tevens wordt dit gebied stevast opgenomen in de Zangvogelcursus van Dineke Kistemaker.

Natuurgebied Langeveld (30 ha) ligt in de Noordzijderpolder, aan de binnenduinrand boven Noordwijkerhout.

Het grootste deel bestaat uit loofbossen en graslanden, die werden aangelegd na de ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Begin deze eeuw heeft het gebied een flinke metamorfose ondergaan. Het Zuid-Hollands Landschap heeft open ruimtes in de bossen gemaakt, paddenpoelen gegraven, graslanden afgeplagd en over een lengte van 1200 meter een duinbeek door het gebied gegraven. Ook is een scherm geplaatst dat voorkomt dat het grondwater afstroomt naar het lagergelegen bollengebied van Polder het Langeveld. Het natuurgebied is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het gebied is rijk aan broedvogels, zowel bosvogels als vogels voor het halfopen duin. De duinen, die het gebied omringen, worden veelvuldig gebruikt als foerageerplaats. Als men in het gebied loopt, kunnen de Roodborsttapuiten uit de Gijs Kokkieshoek en de Veldleeuweriken uit de naastgelegen bollenvelden veelvuldig gehoord worden. Veel voorkomende broedvogels voor het bos zijn: Pimpelmees, Koolmees, Zwartkop, Winterkoning, Boomkruiper, Merel, Zanglijster, Tjiftjaf, Roodborst en Vink. Grote Bonte Spechten zijn in het vroege voorjaar veel te zien en te horen als ze in groepjes achter elkaar aan vliegen om hun territoria te bepalen. Als je geluk hebt, kun

je ook de Kleine Bonte Specht horen die hier elk jaar met minimaal één paar broedt. Zien doe je hem zelden. Glanskop en Staartmees zijn vaste broedvogels van dit gebied echter met een maximum van 2 á 3 paartjes. Sinds 2016 broedt hier ook de Boomklever, die de laatste jaren een oud nest van de Grote Bonte Specht heeft overgenomen en de ingang naar zijn maatstaaf heeft dichtgemetseld. Het bijzondere hierbij is, dat het op ca anderhalve meter hoogte zit vlak naast het meest belopen pad in het bos. Het deert de vogel blijkbaar niet, want ieder jaar worden succesvol jongen grootgebracht. Door de ligging naast de open duinen komen hier ook Fitis, Gekraagde Roodstaart en Boompieper tot broeden. Voor diegenen die een goed gehoor hebben, kunnen de Appelvink, Grauwe Vliegenvanger en het Goudhaantje waargenomen worden.

In de paddenpoelen en de duinbeek broeden veel Meerkoeten en zelfs een Dodaars.


Jaarlijks broeden er één of meerdere Rietzangers als het overjarige riet niet gemaaid wordt.

In het gebied vindt er wel een verschraling van de vegetatie plaats. De afgelopen tien jaar, en waarschijnlijk al langer, zijn de bomen tot ongeveer 2,5 meter vanaf de grond netjes “afgeschoren”. De onderbegroeiing is nagenoeg geheel verdwenen, waardoor men dwars door het bos kan kijken. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het groot aantal Damherten, welke in dit gebied verblijven. Dit heeft natuurlijk invloed op een aantal vogels die in laag struweel of op de grond broeden.

In bijgaande tabel worden Fluiter en Wielewaal als broedvogels weergegeven. Waarschijnlijk zijn dit ongepaarde vogels die tijdens de late voorjaarstrek blijven “hangen” en daardoor, door de BMP methode, als broedgeval worden aangemerkt.

De beste plek in het gebied om de herkenning van vogelzang weer op peil te brengen, is de omgeving van de woning langs het fietspad. Door de dichte begroeiing, waar de Damherten niet bij kunnen komen d.m.v. een hek, kunnen soms wel 15 verschillende soorten vogels en hun zang worden waargenomen.

Door de veelheid aan zowel vogels als soorten zullen wij dit gebied de komende jaren zeker blijven monitoren.



Boomklever 2021-03-26 Langeveld - foto: Gab de Croock



### BMP Langeveld 2013 tot en met 2022

Soort/jaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grote Canadese Gans	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Grauwe Gans	0	0	1	2	4	4	1	1	0	0
Nijlgans	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
Wilde Eend	3	4	2	2	1	2	1	2	1	2
Dodaars	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1
Sperwer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Buizerd	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Waterhoen	1	0	2	1	1	1	3	1	2	0
Meerkoet	6	6	7	4	6	6	4	5	7	5
Houtsnip	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
Holenduif	2	2	2	2	3	3	4	3	3	2
Houtduif	11	9	9	13	8	10	10	7	10	6
Turkse Tortel	1	1	1	1	0	1	3	1	1	1
Koekoek	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
Bosuil	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
Kleine Bonte Specht	0	2	1	1	1	1	1	3	4	1
Grote Bonte Specht	5	5	4	6	8	6	7	6	8	7
Groene Specht	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2
Halsbandparkiet	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Wielewaal	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Gaai	4	5	2	3	3	3	4	4	4	2
Ekster	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kauw	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Zwarte Kraai	2	3	3	3	3	3	4	4	5	4
Glanskop	3	3	1	4	2	1	1	3	5	2
Pimpelmees	9	10	11	10	13	12	16	14	13	12
Koolmees	17	19	19	21	18	17	20	15	15	13
Boomleeuwerik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Staartmees	2	3	3	2	1	1	2	2	2	2
Fluiter	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Fitis	20	10	15	14	13	11	10	7	4	4
Tjiftjaf	17	18	16	15	13	12	11	10	10	13
Kleine Karekiet	3	4	6	4	4	5	3	2	3	1
Sprinkhaanzanger	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Zwartkop	9	10	13	11	13	15	14	16	9	11
Tuinfluiter	2	4	1	2	3	4	4	2	1	3
Braamsluiper	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0
Grasmus	3	3	3	1	2	0	2	0	0	1
Goudhaan	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0
Winterkoning	13	22	20	27	25	20	21	16	16	18
Boomklever	0	0	0	1	1	2	3	2	1	1
Boomkruiper	2	2	3	5	9	8	9	11	11	7
Spreeuw	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Merel	16	22	19	18	19	16	13	16	15	16
Zanglijster	6	7	7	9	8	8	6	4	9	7
Grote Lijster	3	1	0	1	3	0	1	0	0	0
Grauwe Vliegenvanger	0	1	1	0	1	0	2	3	2	1
Roodborst	7	13	12	12	10	14	13	19	13	13
Nachtegaal	8	7	6	7	5	4	6	7	3	4
Bonte Vliegenvanger	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Gekraagde Roodstaart	4	4	3	7	9	6	5	6	5	4
Roodborsttapuit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Huisemus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Heggenmus	7	9	9	11	7	4	3	6	3	5
Witte Kwikstaart	1	1	3	2	3	4	4	2	2	2
Graspieper	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Boompieper	5	3	5	5	2	0	6	3	2	1
Vink	15	19	19	14	18	18	17	21	19	18
Appelvink	1	1	1	1	0	1	2	1	2	2
Groenling	2	2	4	2	2	2	3	4	2	2
Putter	0	0	0	1	2	0	1	1	0	2
Rietgors	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAAL	223	247	239	251	251	230	251	237	217	202

