

Lees Twirre

Twirre is een driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie en -bescherming in Friesland. Naast een gevarieerd aanbod aan veldbiologische artikelen bevat het tijdschrift onder meer mededelingen van de Friese vereniging voor veldbiologie (FFF) en nieuws uit de natuurreservaten. Artikelen over vogels maken altijd een belangrijk deel uit van de inhoud. Zo verscheen in juli het themanummer 'Weidevogelonderzoek in Fryslân', met bijdragen over achteruitgang van Kieviten in ZO-Friesland, resultaten van 43 jaar ringwerk aan Kieviten op Ameland en van 2411 tureluurkuikens in Friesland en Noord-Holland, teloorgang van de Grutto op de Friese zandgronden, invloed van predatie op weidevogels en analyse van aantalsontwikkelingen in een aantal weidevogelgebieden. In het reguliere septembernummer valt o.a. te lezen over kolonievogels en zeldzame soorten in Friesland in 1999 (incl. populatieschattingen) en het voorkomen van Goudplevieren op de Friese Waddenkust in 1948-99. Voorts staan er artikelen op stapel over doortrek van Krombekstrandlopers op de Friese Waddenkust en prooikeuze van Slechtvalken op Griend.

Een abonnement op Twirre kost f 17,50 per jaar, losse nummers kosten f 6,-. Twirre is te bestellen bij Stichting Twirre, p/a Sinnebuorren 34, 8491 EH Akkrum (0566-652881, email: twirre.redactie@planet.nl).

Dodaars
(Frank van der Meer)

Mededelingen BMP

BMP Jaarverslag 1998-99

Afgelopen voorjaar is het nieuwste BMP-verslag verschenen, waarin recente ontwikkelingen worden besproken en vergeleken met de situatie in eerdere BMP-jaren. Speciale aandacht gaat uit naar de Tapuit, die de laatste jaren razendsnel in aantal terugloopt. BMP-tellers in 1998-99 hebben het verslag inmiddels ontvangen. Het verslag wordt altijd gratis verstrekt aan de contactpersoon per proefvlak. Heeft u naar uw mening ten onrechte niets ontvangen, laat het ons weten. Waarschijnlijk kunnen we u uit voorraad nog wel een rapport leveren. Het volgende rapport, over 2000-01, kunnen we in 2002 tegemoet zien.

Naweeën Mond- en Klauwzeer

Het is inmiddels onomkeerbaar: mond- en klauwzeer zal tot in lengte van jaren z'n sporen ook achterlaten in het BMP. We verwachten dat in 2001 ongeveer de helft van de proefvlakken niet of niet volledig is geïnventariseerd. De grootste klappen zijn gevallen in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Friesland en in het hele land in agrarische gebieden. West- en Zuid-Nederland lijken het meest gespaard en ook het Waddengebied is bijna normaal onderzocht. De totale schade kunnen we pas opmaken na afsluiting van het jaar. MKZ heeft ook tot onvolledige BMP-inventarisaties geleid en in verband daarmee willen we BMP'ers het volgende mededelen. Onvolledige of sterk afwijkende gege-

vens kunnen, hoe jammer ook, niet worden opgenomen in het BMP. Zijn bijvoorbeeld niet alle soorten geteld (bij BMP Alle soorten), zijn er tussen half maart en begin mei geen bezoeken gebracht of heeft u vanaf wegen geteld terwijl u normaal gesproken het gebied betreedt, spaar u de moeite en lever uw gegevens niet in voor het BMP! Bent u van mening dat u ondanks onvolkomenheden toch een goed beeld heeft van de broedvogelstand, dan kunt u uw gegevens insturen; in onderling overleg zal dan worden besloten of de gegevens kunnen worden toegevoegd. Accepteren van bijvoorbeeld alleen de zomervogels - in mei-juni konden veel gebieden weer worden betreden - geeft veel problemen met de verwerking en latere berekeningen (welke soort in welk gebied wel of niet). We zijn wellicht wat streng, maar het BMP staat of valt nu eenmaal met de betrouwbaarheid van de gegevens. Hoe we het zaakje oplossen met betrekking tot de statistiek, is een ander chapter; daar moeten we ons hoofd nog over buigen. Uiteraard heeft u zelf de vrijheid om met uw gegevens te doen wat u wilt, want de resultaten van sommige soorten kunnen zeker betrouwbaar zijn. Gegevens van (volledige getelde) kolonievogels en zeldzame soorten ontvangen we uiteraard graag. Invullen op formulieren van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels dus, en opsturen naar Sovon.



Witbuikrotganzen met de satelliet gevolgd

Atlanten met flyways van ganzen en zwanen laten vaak mooie gescheiden gebieden zien waar de verschillende populaties voorkomen. Zo bestond tot voor kort het idee dat de Witbuikrotganzen die in NW-Europa voorkomen uitsluitend broeden op Spitsbergen en Franz Josefland (eilandengroep oost van Spitsbergen). De laatste jaren was dit beeld al geweld aangedaan door

meldingen van geringde vogels op de noordoostpunt van Groenland. Deense en Zweedse onderzoekers vingen dit voorjaar 8 Witbuikrotganzen en gaven de vogels een kleine satellietzender. Deze vogels vertrokken eind mei in de richting van Spitsbergen, en één vogel vloog daadwerkelijk door naar Groenland. De peilingen van de gezenderde vogels laten fraaie beelden zien en zijn

steeds per periode van een aantal dagen te volgen. Kijk op: http://www.dmu.dk/CoastalZoneEcology/satellite/position_uk.htm

De zenders werken nog steeds en het is de bedoeling dat de vogels ook worden gevolgd op de terugtrek naar de Deense en Engelse overwinteringsgebieden.