

# Naar een nieuwe wintervogelatlas?

***Hoewel het PTT-project in eerste instantie is bedoeld voor het vaststellen van trends van de meer algemene wintervogels, kan het dichte waarnemersnetwerk ook worden gebruikt voor het samenstellen van verspreidingskaarten. Uit de resultaten van 980 routes die meerdere jaren zijn geteld in december 1979-99 is de gemiddelde verspreiding berekend, zowel op landelijke als op regionale schaal (zie blz. 3-4 in deze Sovon-Nieuws).***

Als voorbeelden van beide typen kaarten zijn hiernaast de verspreidingskaarten gegeven van Houtduif (landelijk) en Boomklever (regio Arnhem/Nijmegen). Houtduiven prefereren in de winter de kleinschalige en bosrijke landschappen van het oosten en zuiden van het land.

In de open poldergebieden van West- en Noord-Nederland zijn Houtduiven minder dik gezaaid. De regionale winterverspreiding van de Boomklever in de regio Arnhem/Nijmegen toont accenten in de zware oude loofbossen langs de Veluwe-randen en op de stuwwal bij Nijmegen.

In door naaldbos gedomineerde gebieden (centrale Veluwe) en in zeer open gebieden (Overbetuwe) komen amper Boomklevers voor. In de Liemers en de Achterhoek is de Boomklever bepaald niet zeldzaam in de oudere bosjes. Omdat geschikt bos er echter nogal verspreid voorkomt, blijft de dichtheid achter bij die in gebieden met een grotere oppervlakte bos.

Zulke kaarten zouden in een winter-vogelatlas zeker niet misstaan ...

