

Opvallende aantallen Lachsterns in nazomer

Ooproep!

Ooproep voor gekleurde Lachsterns: Lachsterns uit Schleswig dragen telkens vier kleuringen (zonder inscriptie) en een metalen ring. Gebruikte kleuren zijn blauw (B), groen (G), oranje (O), rood (R), wit (W) en geel (Y). Aflezingen noteren als links van onder naar boven, en dan rechts van onder naar boven.

Waarnemingen insturen aan Klaus Günther: k.guenther@schutzstation-wattenmeer.de. Ook meldingen van ongeringde Lachsterns zijn erg waardevol, omdat ze inzicht verschaffen in het totaal aantal jonge vogels dat de kolonie heeft verlaten.

*Begin augustus 2012 verbleef bijna de helft van de Noordwest-Europese broedpopulatie in Nederland.
Foto: Ran Schols*

Begin augustus werden in Nederland opvallende aantallen Lachsterns waargenomen. Rond 5-6 augustus ging het volgens de ingevoerde waarnemingen op www.waarneming.nl om tenminste 47 individuen, waaronder diverse families met jongen. Op 5 augustus werden 31 ex. geteld op de slaappleaats op Balgzand. Een tweede opvallende groep verbleef rond twee zandgaten bij Nieuwe Pekela/Alteveer in Oost-Groningen. Vanaf de eerste waarneming van drie vogels op 31 juli tot de laatste op 18 augustus verbleven hier maximaal 13 individuen (6 augustus). Al deze vogels zijn afkomstig van de enige Noordwest-Europese kolonie, die van de kwelder van Neufeld, in de Elbemonding van Schleswig-Holstein in Duitsland. Dit werd bevestigd door aflezingen van gekleurde dieren. In 2012 broedden hier 38 paren die samen 25-30 jongen grootbrachten. Daarnaast nestelden er 1-2 paren in de Waddenzee in Nedersachsen, waarvan een paar bij de Jadebusen (nabij Wilhelmshaven) één jong grootbracht.

De eerste vogels verschenen begin augustus in ons land, vrijwel direct na het verlaten van de kolonie in Schleswig-Holstein. Op 27 juli werden daar nog 21 adulten en 12 juvenielen gezien (www.ornitho.de). Na een eerste waarneming bij Noordwijk op 20 juli, werd vanaf 28 juli dagelijks een toenemend aantal Lachsterns gevonden. De waarnemingen in de Kop van Noord-

Holland, waaronder de slaappleaats van het Balgzand, passen goed in de traditionele nazomerverspreiding van Lachsterns, zoals die eerder door Ruud Vlek werd beschreven in *Limosa* 75: 147-158. Overdag werden deze vogels (vaak families) veel op ondergelopen bollenvelden in de omgeving van Schagerbrug gezien, waar de jonge vogels voornamelijk met kikkers werden gevoerd. De waarnemingen bij Nieuwe Pekela laten zien dat de soort ook in het diepere binnenland kan verschijnen. Overdag foeragereden ze in de uitgestrekte akkergebieden, 's avonds rustten ze vaak in één van de twee baggerputten van Nieuwe Pekela/Alteveer. De Lachsterns verschalkten er opvallend vaak Grote Groene Sabelsprinkhanen, die in de afgelopen zomer in Oost-Groningen naar verluidt talrijk waren.

Afgaande op de Duitse broedvogelaantallen en hun jongen (40 paar en 25-30 jongen) verbleef begin augustus 2012 dus rond 45% van de Noordwest-Europese Lachsterns in Nederland. Van de 30 gekleurde jongen werden er zelfs 16 in Nederland afgelezen. Dat Nederland belangrijk is als nazomerpleisterplaats voor deze vogels is niet nieuw. In augustus 1947 werden bij het Balgzand zelfs ca. 400 Lachsterns geteld, bijna 40% van de toenmalige broedpopulatie in Denemarken. Gezien het belang van Nederland voor de enige Noordwest-Europese kolonie zou het wenselijk zijn het voorkomen in de nazomer op een meer structurele wijze vast te leggen. Dat kan onder andere door regelmatige slaappleaatsstellingen te organiseren, zoals dat momenteel reeds voor Reuzensterns gebeurt. Ook systematische waarnemingen waar de vogels foerageren en wat als voedsel wordt aangedragen zou interessante informatie opleveren. In het artikel in *Limosa* eindigde Ruud Vlek eerder met een lijst van zes aandachtspunten om het voorkomen in de Kop van Noord-Holland beter in kaart te brengen. De meeste daarvan, zo niet allemaal, zijn nog steeds actueel.

- **Kees Koffijberg & Bernd Hälterlein** (Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein)

