

W. Dubbeldam en M. Zijlstra
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

INLEIDING

In de winters 1974/1975, 1975/1976 en 1976/1977 heeft de Biologische Afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders elf watervogeltellingen op het gehele IJsselmeer uitgevoerd. Hierbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt ook naar dwergmeeuwen uit te kijken.

METHODE

Het randgebied langs de kust, de Afsluitdijk en de Markerwaarddijk kon over een breedte van ca. 1 km. vrijwel volledig worden geteld vanaf de aangrenzende dijken. Het middengebied werd vanaf een boot (de Dr. Ir. De Blocq van Kuffeler van de Dienst der Zuiderzeewerken) geteld, waarbij een strook van 2 km. breedte, 1 km. aan weerszijden van de boot, langs een vaste vaarroute kon worden overzien (figuur 1). Op deze wijze is van het IJsselmeer ten noorden van de Markerwaarddijk bijna 40% afgezocht (randgebied bijna 100%, middengebied ruim 25%).

Van het IJsselmeer ten zuiden van de Markerwaarddijk kon in totaal ruim 50% worden overzien (randgebied bijna 100%, middengebied bijna 40%).

De tellingen kunnen dus niet als volledig worden beschouwd. De aanwezige aantallen kunnen verder onderschat zijn, doordat op het water rustende groepen dwergmeeuwen gemakkelijk over het hoofd worden gezien, vooral bij winderig weer.

RESULTAAT

De getelde aantallen varieerden van 120 tot 1200 à 1500 (zie tabel 1), uitgezonderd de tellingen van februari, maart en april 1976, toen slechts enkele dwergmeeuwen werden gezien. Mogelijk heeft het dichtvriezen van grote delen van het IJsselmeer gedurende de vorstperiode van eind januari en begin februari 1976 geleid tot het vertrek van de meeste dwergmeeuwen.

Verreweg de meeste dwergmeeuwen waren volwassen; het aantal jonge vogels bleef beperkt tot enkele eksemplaren.

De dwergmeeuwen kwamen vrijwel alleen voor in het noordelijk deel van het IJsselmeer, ten noorden van de Markerwaarddijk. Alleen bij de tellingen in januari 1975 en december 1975 werden achtereenvolgens 2 en 21 eksemplaren

