

## Kweekresultaten uit sigaargallen

Hans Nieuwenhuijsen

In de nalatenschap van Henny Wiering (1929 - 2001) vond ik een aantal aantekeningen over enkele bijen- en wespensoorten, die hij in 1956 had gekweekt uit sigaargallen van de grote rietsigaargalhamvlieg *Lipara lucens* (Fig. 1).

Ik vat ze samen in de tabel hieronder.

Ik neem aan dat hij sommige larven heeft zien verpoppen. Blijkbaar heeft hij de gallen geopend,

een hele klus want ze zijn keihard, het aantal cocons genoteerd en die laten uitkomen. Hij meldt geen data van uitkomen.

Van *Hylaeus pectoralis* en van *Hoplitis leucomelana* is bekend dat ze in gallen van riet nestelen. Van *Trypoxylon* is bekend dat ze samen met andere aculeaten nestelen, maar bij geen van deze soorten wordt expliciet de sigaargal als nestplaats genoemd.

### Summary

Some old observations of aculeates, grown by the late Henny Wiering from *Lipara lucens* galls, are summarized in the table.

Gal nr.	Vindplaats	Datum	Vorm larven	verpopt	Aantal cocons	soort
1	Zuidelijk deel Verbrande Pan, Bergen NH	19.4.1956	glad	2 ± 22.4.1956; 1 ± 24.4.1956	4	<i>Hylaeus pectoralis</i>
2	Zuidelijk deel Verbrande Pan, Bergen NH	19.4.1956	gestippelde buik		2	1 <i>Hoplitis leucomelana</i>
3	Zuidelijk deel Verbrande Pan, Bergen NH	19.4.1956	glad	Aantal? 25.4.1956	2	<i>Hylaeus pectoralis</i>
4	Eendenkooi Heemskerkerduin.	24.4.1956	glad		3	2 <i>Hylaeus pectoralis</i> ; 1 <i>Trypoxylon spec.</i>
5	Eendenkooi Heemskerkerduin	24.4.1956	glad		1	<i>Trypoxylon spec.</i>
6	Noordelijk deel Verbrande Pan, Bergen NH	23.4.1956	gestippelde buik		2	<i>Hoplitis leucomelana</i>
7	Noordelijk deel Verbrande Pan, Bergen NH	23.4.1956	gestippelde buik		3	1 <i>Hoplitis leucomelana</i> ; 1 <i>Trypoxylon spec.</i>
8	Noordelijk deel Verbrande Pan, Bergen NH	23.4.1956	gestippelde buik		4	<i>Hoplitis leucomelana</i>



Figuur 1. Sigaargal van *Lipara lucens*. Foto Hans Jonkman (Licentie CC BY-NC-ND).