

van de teruggang/verdwijnen van Houtduif, Ransuil, Groene Specht en Ekster(?) uit het telgebied. De losse bomen, boomgroepen en het open bos in het telgebied oefenen aantrekkingskracht uit op soorten als Boomleeuwerik, Boompieper, Gekraagde Roodstaart en Vink. Soorten die in het begin van de jaren tachtig ontbraken en in 2021 en/of 2022 wel werden vastgesteld zijn Torenvalk, Kievit, Grote Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Grote Lijster, Roodborsttapuit, Zwartkop, Boomkruiper en Vink. Daar kwamen in 2023 Buizerd en Putter als nieuwkomers bij.

- Van der Spek, V., L. Schaap en A. Ehrenburg, 2018. Dertig jaar broedvogelmonitoring in de Amsterdamse Waterleidingduinen. LIMOSA 91 (3): 108 - 122.
- Aartse E., W. Baalbergen, F. van der Berg, B. Heethuis, H.J. van Emmerik, B.C. Punt, J. van Saase, Q. Sluijs en H. Veefkind-Lieneman, 1985. Broedvogelinventarisatie Amsterdamse Waterleidingduinen 1978 t/m 1985. Rapport voor de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Noordwijk.



Vinkenbaandriften – foto: Jaap Vink

Broedvogelinventarisatie AWD Gijs Kokkieshoek 2023

Marinka Onderwater, Edgar de Vries en Jan Jacobs



Gijs Kokkieshoek (Sovonplot 318) ligt langs de Langevelderslag in het zuiden van de AWD. Het heeft een oppervlak van 47,6 ha, waarvan ca. 7 ha gemengd bos, met voornamelijk Berk, Ratelpopulier, Abeel en Meidoorn. De kavel telt ca. 7 ha struweel van Duindoorn en Kruiwilg. Het bevat een groeiend aantal stuifkuilen en daarmee ook een flink oppervlak aan kaal stuifzand, waarop steeds meer nieuwe Helm tot ontwikkeling komt. Verder bestaat de begroeiing vooral uit Duinriet, Zandzegge en veel mos. In het terrein staan veel solitaire Meidoorns en hier en daar enkele Vlieren. In de dellen vinden we vooral Abeel, Duindoorn, Liguster en Kruiwilg. Sinds enkele jaren wordt getracht het aantal Damherten in de AWD terug te brengen. Door afschot is het aantal Damherten merkbaar gedaald. We telden er nu gemiddeld

9 per bezoek tegen 16 in 2022 en nog 27 in 2021. Het afschotbeleid gaat zijn vruchten afwerpen. In de exclusie binnen Gijs Kokkieshoek zagen we weer heesters en planten groeien en bloeien. Het aantal Konijnen is verder gedaald naar gemiddeld 2 per bezoek. In 2022 waren dat er per telronde nog 9. Ook zagen we zo nu en dan een Ree.

Tussen 8 maart en 9 juni hebben we 10 telrondes gelopen, waarvan 6 vroege bezoeken bij zonsopgang, 3 ochtendbezoeken en een avondbezoek op 5 juni. We troffen bijna altijd fris en droog weer met op het eerste bezoek een mooi sneeuwlandschap met volop zingende Boomleeuweriken.

Na twee jaren met een laag aantal broedsels zit het jaar 2023 weer op het oude niveau van meer dan 110 territoria. Dit komt voornamelijk voor rekening van de meer algemene soorten, zoals de Boomleeuwerik, Fitis, Koolmees, Pimpelmees, de Kneu en Vink. Ook de Boompieper en de Gekraagde Roodstaart, beide met 6 territoria, mogen we inmiddels tot de algemenere soorten beschouwen. De Heggenmus met 6 territoria en de Grasmus met 4 territoria zijn nog steeds niet hersteld van de achteruitgang in de afgelopen jaren. Een opmerkelijke



Graspieper – foto: Edgar de Vries

score haalde de Tjiftjaf die met 5 territoria hoger scoorde dan ooit. Ook de Roodborsttapuit deed het met 5 territoria goed, evenals de Graspieper, die met 4 territoria aanwezig was. We hebben in ons kavel weer 2 Nachtegalen kunnen tellen, nadat ze in 2021 en 2022 verstek hebben laten gaan. Misschien is dit een gevolg van de afname van het aantal Damherten in ons terrein. Ook voor de Merel konden we weer 5 territoria vaststellen.



Jan in zijn element – foto: Edgar de Vries

Tabel 1. Broedvogels Gijs Kokkieshoek 2016-2023								
soort	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Appelvink			1					
Boomkruiper						1		1
Boomleeuwerik	9	8	10	9	9	8	7	11
Boompieper	1	1	2	2	4	4	2	6
Braamsluiper	1	3	4	4	4	4	5	2
Buizerd			1			1	0	
Fazant							0	
Fitis	12	21	11	18	13	8	9	10
Gaai	2	1	2	2	1	1	1	2
Gekraagde Roodstaart	5	5	4	3	6	8	4	6
Glanskop			1					
Grasmus	17	12	13	9	8	7	2	4
Graspieper	2	4	2	3	3		2	4
Groenling				2	1		0	
Grote Bonte Specht		1	3		1	1	1	1
Grote Lijster							1	
Heggenmus	21	10	10	9	8	4	6	6
Houtduif	1	1	3	1	3		0	1
Kneu	5	3	12	9	7	6	6	7
Koekoek	1	1	1	1	1			
Koolmees	7	9	11	11	15	10	12	11
Merel	5	7	9	6	6	5	6	5
Nachtegaal	14	11	7	7	7			2
Oeverzwaluw					6			2
Pimpelmees	4	1	4	3	4	3	3	5
Putter		1						
Rietzanger							1	
Roodborst	2	2		1	3		0	1
Roodborsttapuit	4	1	4	5	5	4	2	5
Staatmees					1			
Tjiftjaf	2	2	2	1	1	1	1	5
Tuinfluit				1			1	
Vink	2	5	8	6	8	10	6	12
Winterkoning	1	1	2	1	1	3	1	2
Witte Kwikstaart			1	1			0	
Zanglijster	1		3	1		1	1	0
Zwarte Kraai	1	1	2	3	3	3	1	2
Zwartkop	4	2	2	1	1	2	2	2
aantal territoria	124	114	135	120	130	95	83	115
aantal soorten	24	25	28	27	27	22	24	25

Voor de Oeverzwaluw zijn de omstandigheden niet verbeterd. De steile wanden van de stuifgaten van 2020 zijn verder afgekalfd, maar toch hebben we weer 2 territoria kunnen vaststellen.

De overige struikbewonende soorten zoals Zwartkop, Winterkoning, Roodborst en Braamsluiper waren dit jaar maar sporadisch aanwezig. De Tuinfluit zelfs helemaal niet. De waarneming van een Boomkruiper is dan weer een opkikker. Houtduif, Grote Bonte Specht, Gaai en Zwarte Kraai maakten de inventarisatie compleet. Tijdens het avondbezoek hebben we geen Houtsnippen of Nachtzwaluwen kunnen vaststellen.



Een bijzondere vondst – foto: Edgar de Vries

