

Broedvogelinventarisatie ZHL Langeveld-Vogelaardreef 2023

Gab de Croock en Jos Zonneveld.



Kaart van ZHL Langeveld-Vogelaardreef.

Voor het elfde jaar werd door ons het natuurontwikkelingsgebied Langeveld-Vogelaardreef op broedvogels geïnventariseerd. Het gebied van ruim 30 ha ligt tussen de Vogelaardreef en het fietspad vanaf de Langevelderslag naar het zweefvliegveld. Aan de zuidkant van de Langevelderslag ligt nog een driehoekje elzenbos met grasland dat tot het gebied behoort.

Het Langeveld bestaat hoofdzakelijk uit loofbos met daartussen graslanden. In het gebied zijn een duinbeek en enkele paddenpoelen aangebracht. Tevens staan er in het telgebied twee woningen.

Zoals gewoonlijk is de eerste telronde rond half maart, wanneer de Grote Bonte Spechten volop hun territoria verdedigen. Met een beetje geluk is ook de Kleine Bonte Specht te horen en te zien. De Boomkruiper, Boomklever, Zanglijster, Heggenmus en de Vink zingen dan al volop. Eind maart komen we op de vaste plek de Appelvink tegen, die dan goed te zien is omdat de bomen nog zonder blad zitten. Begin april komen de meeste zomervogels, zoals de Gekraagde Roodstaart en de Fitis; de Tjiftjaf is dan al volop aanwezig in het gebied. Iets later komen de Nachtegaal en de Grauwe Vliegenvanger. Het totaal aantal soorten is dan zo goed als compleet.

Het afgelopen jaar zagen we toch weer enkele schommelingen van het aantal territoria van bepaalde soorten ten opzichte van 2022. De Boompieper was weer met twee territoria aanwezig. Het lijkt dat de dalende trend van de Fitis (20 in 2013 naar 4 in 2022) met 6 exemplaar in 2023 gebroken is, of is het slechts een korte opleving? De Grasmus is inmiddels geheel verdwenen uit het gebied. De Heggenmus was aanwezig met slechts drie territoria. De Kleine Bonte Specht deed het afgelopen jaar goed met drie territoria. Doordat het overjarig riet vorige winter nagenoeg geheel gemaaid was, broedde er dit jaar geen Kleine Karekiet. De Merel deed het opvallend goed met 19 territoria. Met de Nachtegaal gaat het steeds verder bergafwaarts. Alleen aan de zuidkant van de Langevelderslag is er nog voldoende biotoop om de vogel

BMP ZHL Langeveld-Vogelaardreef - 30,6 ha												
Soort	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Appelvink	1	1	1	1	-	1	2	1	2	2	2	
Bonte Vliegenvanger	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Boomklever	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	2	
Boomkruiper	2	2	3	5	9	8	9	11	11	7	9	
Boomleeuwerik	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Boompieper	5	3	5	5	2	-	6	3	2	1	2	
Bosuil	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	
Braamsluiper	1	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Buizerd	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Dodaars	1	1	1	1	1	1	-	1	2	1	1	
Ekster	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fitis	20	10	15	14	13	11	10	7	4	4	6	
Fluiter	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Gaai	4	5	2	3	3	3	4	4	4	2	3	
Gekraagde Roodstaart	4	4	3	7	9	6	5	6	5	4	4	
Glanskop	3	3	1	4	2	1	1	3	5	2	2	
Goudhaan	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	
Grasmus	3	3	3	1	2	-	2	-	-	1	-	
Graspieper	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grauwe Gans	-	-	1	2	4	4	1	1	-	-	1	
Grauwe Vliegenvanger	-	1	1	-	1	-	2	3	2	1	2	
Groene Specht	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2	
Groenling	2	2	4	2	2	2	3	4	2	2	2	
Grote Bonte Specht	5	5	4	6	8	6	7	6	8	7	6	
Grote Canadese Gans	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Grote Lijster	3	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	
Halsbandparkiet	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	
Heggenmus	7	9	9	11	7	4	3	6	3	5	3	
Holenduif	2	2	2	2	3	3	4	3	3	2	3	
Houtduif	11	9	9	13	8	10	10	7	10	6	8	
Houtsnip	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Huisemus	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kauw	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Kleine Bonte Specht	-	2	1	1	1	1	1	3	4	1	3	
Kleine Karekiet	3	4	6	4	5	-	3	2	3	1	-	
Koekoek	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	
Koolmees	17	19	19	21	18	17	20	15	15	13	13	
Meerkoet	6	6	7	4	6	6	4	5	7	5	6	
Merel	16	22	19	18	19	16	13	16	15	16	19	
Nachtegaal	8	7	6	7	5	4	6	7	3	4	2	
Nijlgans	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	
Pimpelmees	9	10	11	10	13	12	16	14	13	12	13	
Putter	-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	1	
Rietgors	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Roodborst	7	13	12	12	10	14	13	19	13	13	10	
Roodborsttapuit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Sperwer	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Spreuw	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
Sprinkhaanzanger	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staatmees	2	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	
Tjiftjaf	17	18	16	15	13	12	11	10	10	13	14	
Tuinfluiter	2	4	1	2	3	4	4	2	1	3	3	
Turkse Tortel	1	1	1	1	-	1	3	1	1	1	-	
Vink	15	19	19	14	18	18	17	21	19	18	21	
Waterhoen	1	-	2	1	1	1	3	1	2	-	1	
Wielewaal	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Wilde Eend	3	4	2	2	1	2	1	2	1	2	1	
Winterkoning	13	22	20	27	25	20	21	16	16	18	18	
Witte Kwikstaart	1	1	3	2	3	4	4	2	2	2	1	
Zanglijster	6	7	7	9	8	8	6	4	9	7	6	
Zwarte Kraai	2	3	3	3	3	3	4	4	5	4	3	
Zwartkop	9	10	13	11	13	15	14	16	9	11	15	
Aantal territoria	223	247	239	251	251	230	251	237	217	202	214	
Aantal soorten	43	43	40	42	43	38	48	43	38	41	41	

tot broeden te brengen. De Vink en de Zwartkop hadden een topjaar met respectievelijk 21 en 15 territoria. Nagenoeg ieder jaar zien we Sperwers rondvliegen. Dit jaar werd voor het eerst een parend stel waargenomen waardoor deze als territorium aanvaard werd. De aanwezigheid van een Fluiter (waarschijnlijk doortrekker) werd als broedgeval aangemerkt. We kunnen er vrijwel zeker van zijn dat dit niet het geval is.

In tegenstelling tot het vorig jaar, dat een dieptepunt vormde in het aantal territoria, 202 ten opzichte van een gemiddelde van rond de 230, lijkt het dat met 214 territoria de dalende trend is gebroken. De toekomst zal dit moeten aantonen.

