

## Erratum

### Boswachterij Noordwijk; Historisch en actueel overzicht van de broedvogelstand

Leo Schaap

In de vorige Strandloper (55<sup>e</sup> jaargang, nr. 4, december 2023) zijn in de laatste tabel van het artikel “Boswachterij Noordwijk, Historisch en actueel overzicht van de broedvogelstand” een aantal vervelende fouten geslopen. In een kolom is gewerkt met een verkeerde oppervlakte en in andere kolommen zijn verschuivingen opgetreden. De juiste tabel is hieronder weergegeven:

Typische duinvogels. Jaren 2021, 2022 en 2023 gemiddeld					
Soort/Gebied	Berkheide	Coepel- duynen	Boswacht. Noordwijk	AWD zuid	AWD noord
Blauwborst	4,0	0,0	0,6	0,1	7,2
Braamsluiper	10,7	7,3	6,9	4,1	10,6
Fitis	40,0	18,7	22,7	21,5	40,1
Grasmus	37,0	28,8	21,2	12,0	16,4
Graspieper	9,3	17,0	8,0	7,5	1,0
Heggenmus	27,4	38,6	26,5	7,6	10,7
Kneu	3,7	18,3	9,0	1,8	6,4
Nachtegaal	27,1	15,8	20,6	4,7	10,6
Roodborsttapuit	6,8	13,5	4,8	1,9	4,8
Sprinkhaanzanger	9,1	1,7	1,2	7,0	4,1
Tapuit	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0
Veldleeuwerik	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
<b>Dichtheid/100ha</b>	<b>175,1</b>	<b>160,1</b>	<b>121,6</b>	<b>68,2</b>	<b>112,0</b>
<b>Oppervlakte ha</b>	<b>900,0</b>	<b>161,0</b>	<b>457,0</b>	<b>301,0</b>	<b>312,0</b>

Afbeelding 1: Gecorrigeerde tabel.

Voor de berekening van de dichtheden zijn de totale oppervlaktes van de geïnventariseerde gebieden gebruikt en is geen rekening gehouden met verschillen in begroeiing. De conclusies blijven grotendeels hetzelfde. In Berkheide is de dichtheid van de meeste soorten gemiddeld het grootst, vooral voor Grasmus, Nachtegaal en Sprinkhaanzanger. In de Coepelduynen doen typische duinvogels het ook erg goed. Opvallend zijn daar de mooie resultaten van Graspieper, Kneu, Heggenmus en Roodborsttapuit. Het lijkt alsof de Boswachterij Noordwijk het een stuk slechter doet, maar dat is minder erg dan het lijkt. De Boswachterij kent ca. 140 ha aaneengesloten bos, dat is in verhouding van een heel andere orde dan in Berkheide, de Coepelduynen en AWD-zuid. Zou deze 140 ha worden verrekend dan komen de aantallen dicht in de buurt van Berkheide. Het aantal Nachtegalen komt dan zelfs boven die van Berkheide uit. De broedvogeldichtheid van typische duinvogels in AWD-zuid is minder dan de helft van andere gebieden. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de graasdruk van de Damherten. De geïnventariseerde percelen van AWD-noord hebben daar kennelijk minder last van, mogelijk door de omvang van het open water. Opvallend is ook dat de gebieden met veel water goed zijn voor Fitis en Blauwborst.

## Waarnemingen oktober, november, december 2023

Peter Spierenburg

Waarnemingen zijn overgenomen van [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl). Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

### Mongoolse Pieper nieuw voor Noordwijk

Tijdens het opnemen van de ‘Vogelspotcast’ ontdekte Arjan Dwarshuis een nieuwe soort voor Noordwijk: een Mongoolse Pieper. Arjan Dwarshuis is bekend als degene die in één jaar wereldwijd de meeste vogels wist te zien. In de podcast vertelt hij ‘live’ tijdens het vogels kijken over de vogelsoorten die hij tegen komt. Deze podcast werd op 10 oktober opgenomen in de Luchterduinen, met als thema de najaarstrek over de duinen. De hoop op een zeldzame soort werd al snel bewaarheid. Twee keer passeerde er een Dwerggors. De tweede was zelfs luid en duidelijk in de opname te horen. Maar nog

