

## Baardrob

### *Erignathus barbatus*

De baardrob is een solitair levende soort met een circumpolaire verspreiding. Het dier is goed te herkennen aan de lange snorharen, die opkrullen wanneer ze opgedroogd zijn. Hij heeft een bruingrijze vacht en soms zijn gezicht en nek roodbruin. De vacht van de jongen is donker met witte vlekken op rug en flippers. Beide seksen worden tot 270 cm lang en 350 kg zwaar (DE JONG ET AL. 1997F). De baardrob heeft net als de monniksrob *Monachus monachus* vier tepels; beide zijn daarmee uitzondering onder de vinpotigen.

#### Leefomgeving

Baardrobben leven gedurende het hele jaar in de buurt van de grens van het pakijns. Ze houden zich in relatief ondiep water op en foerageren bij de bodem. Op het ijs rusten ze vlak bij de rand, zodat ze bij gevaar snel in het water kunnen gaan. De jongen worden op ijsschotsen geboren.




#### Voedsel

De baardrob eet voornamelijk evertrebraten zoals kreeftachtigen, schelpdieren en wormen, maar ook wel vis (DE JONG ET AL. 1997F).

#### Areaal

Er worden twee ondersoorten erkend: *Erignathus barbatus barbatus* en *E. b. nauticus*. De eerste komt voor op het pakijns van de Oost-Siberische eilanden in de Laptevzee en via Noord-Noorwegen tot Oost-Canada. Exemplaren van deze ondersoort dwalen weleens af naar de Europese kust, zelfs tot aan Portugal. *Erignathus b. nauticus* leeft in de noordelijke Stille Oceaan.



▼  
Baardrob.  
Foto: Mario Acquarone.  
*Bearded seal.*



**Voorkomen in Nederland***Prehistorie*

De uit de Noordzee opgeviste fossiele resten van baardrob-  
 bben stammen uit het Weichselien, in het midden van  
 de laatste ijstijd, en bleken ongeveer 50.000 jaar oud (MOL  
 ET AL. 2008, POST 2005). Jongere fossielen zijn niet bekend.

*Historische gegevens tot 1970*

Tot 1970 zijn geen gegevens bekend.

*Periode 1970-1988*

Op 27 juni 1988 is een levende subadulte baardrob ge-  
 vonden in de haven van Yerseke (ZE), in de Oosterschelde  
 (VAN BREE 2000).

*Periode 1989-2012*

In deze periode zijn geen baardrob-  
 ben waargenomen in de  
 Nederlandse wateren.

*Na 2012*

In 2013-2015 zijn geen baardrob-  
 ben waargenomen.

**Veranderingen en oorzaken**

Kennelijk is de zuidwaartse trek vanuit het noordelijke  
 verspreidingsgebied naar de Noordzee een incidenteel fe-  
 nomeneen. Dat blijkt ook het feit dat er tussen 1910 en 1999  
 slechts 11 exemplaren zijn aangetroffen op de West-Euro-  
 pese kusten (VAN BREE 2000).

**Bedreigingen en bescherming**

Klimaatverandering is voor deze arctische soort een po-  
 tentiële bedreiging. De baardrob is beschermd onder de  
 Bern-conventie.

*Sophie M.J.M. Brasseur & Peter J.H. Reijnders*

**SUMMARY****Bearded seal *Erignathus barbatus***

The bearded seal occurs along the edge of the pack ice in  
 the Northern Hemisphere. Its nearest habitats are off  
 northern Norway, but stragglers sporadically reach west-  
 ern Europe. In the Netherlands, a bearded seal was seen  
 just once: in 1988, a living subadult was found in the  
 harbour of Yerseke, in the Oosterschelde in Zeeland.