



Broedvogels van Het Hol en Suikerpot in 2023,
Dirk Prop
Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken,
rapportnummer 319

*Karakteristieke vegetatie van Gele Plomp en Waterlelie in de Suikerpot, juni 2023
Dirk Prop*



Broedvogels van Het Hol en Suikerpot 2023

Dirk Prop

samengevat en besproken door Dirk Prop

Ligging van de gebieden

Suikerpot: Neem de Vreelandseweg N201. Ga linksaf bij de 1e stoplichten vanuit Hilversum, die bij het tuincentrum. Na 400 meter, voorbij de Intratuin, begint de Suikerpot. Ook wanneer je via de N201 richting Vreeland rijdt, ligt de Suikerpot tot een kilometer na de stoplichten aan de linkerkant.

Het Hol bevindt zich wat verder van de doorgaande wegen. Het grenst aan de Suikerpot, is waterrijk. Het ligt ingeklemd tussen de weg Moleneind (westelijk) en is aan de zuidzijde bereikbaar via de Kromme Rade.

Samenvatting

De VWG Het Gooi en Omstreken heeft in 2023 een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in Het Hol en de Suikerpot. Totaal zijn er 54 verschillende broedvogelsoorten vastgesteld. Beide gebieden ontlopen elkaar hierin weinig met 48 soorten in het Hol en 47 in de Suikerpot.

De top 5 van de meest talrijke vogels, bestaat uit bosvogels: Tjiftjaf (79), Tuinfluiter (62), Zwartkop (60), Winterkoning (54) en Fitis (53). In het Hol, dat veel meer moerasvegetatie heeft dan de Suikerpot, is de Rietzanger (39) nipt de talrijkste broedvogel voor de Tjiftjaf (38). Ook al heeft de Suikerpot veel minder

riet- en oevervegetatie, toch is het aantal rietvogels er relatief hoog. Zo zitten er in de rietkragen twaalf territoria van de Kleine Karekiet, wat maar iets minder is dan de veertien territoria in het Hol. Kwetsbare soorten van de Rode Lijst zijn Koekoek, Nachtegaal en Snor. Gevoelige soorten van de Rode Lijst zijn Huismus en Spotvogel. De Nachtegaal (1) was nog niet eerder tijdens een broedvogelinventarisatie in het gebied vastgesteld. Een bijzonder fenomeen doet zich voor bij de mezen waarbij de Glanskop zich als nieuwe soort heeft gevestigd in de broekbossen, terwijl de Matkop hier juist is verdwenen.

Aanbevelingen voor beheer

- Liefst geen veldwerkzaamheden gedurende de broedtijd: in april zijn de meeste rietvogels al gearriveerd en vaak ook al in de nestfase. Om verstoring te vermijden heeft het de voorkeur om de veldwerkzaamheden, zoals het opruimen van rietbundels zo veel mogelijk in maart of nog eerder uit te voeren.
- Maaien van de slootranden van Het Hol en de Suikerpot gebeurt soms al in de eerste week van juli. Het is beter om dit een of twee weken uit te stellen zodat late legsels van Kleine Karekiet (soms met Koekoeksjong), Bosrietzanger en Cetti's Zanger gespaard blijven. Positief is dat Natuurmonumenten de slootranden van de hooilanden tussen het Hol en de Suikerpot over een breedte van een meter ongemaaid laat bij de eerste snede.

De medewerking van Natuurmonumenten bij het verstrekken van vergunningen en boten/kano's werd erg op prijs gesteld.

Vanuit de vogelwerkgroep namen naast de auteur, negen VWG-leden deel aan deze inventarisatie, te weten: Guido Band, Juun de Boer, Pieter Bogaers, Helene Heckman, Ans van der Knaap, Arda van der Lee, Ellen de Moel, Ad Vendrig, Carel de Vink en Frits Wolfswinkel.