

Over de verbreiding van den buizerd *Buteo b. buteo* L., in Nederland, in het broedseizoen 1932,

DOOR

A. B. WIGMAN.
(met plaat 3)

In den loop van het voorjaar 1932 waren mij vijf bewoonde horsten van den buizerd, *Buteo b. buteo* L. bekend, een aantal dat zeker de verwachtingen der meestes ornithologen overtreft en een mededeeling in dit tijdschrift rechtvaardigt. Deze roofvogel komt in Nederland ongetwijfeld zelden broedende voor; de Avifauna van v. OORDT en VERWEY (1925) vermeldt slechts een zestal gevallen, verdeeld over ± 15 jaren.

Het eerste horst van mijn vijftal is dat van Hagenau, Dieren, waar de soort vrij geregeld broedt, wat ook in 1932 wederom het geval was. Een tweede bevond zich in de Montferlandsche bosschen, waar ook de havik al ettelijke jaren nestelt. Beide soorten genieten van den eigenaar de meest volkomen bescherming; van laatstgenoemde werd in 1932 weder een nest aangetroffen. Dat van den buizerd werd door den heer J. HOOGLAND Jr. gesignaleerd en door den heer Jb. v. D. PEPPEL bezocht, die nevenstaande foto van een der twee jongen vervaardigde en voor deze bijdrage afstond.

Niet ver van onze Oostelijke landgrens, in 't Overijselsche, mocht ik 11/12 Juni j.l. in eenzelfde boschcomplex, op vrij geringen onderlingen afstand, drie horsten van den buizerd aantreffen, evenals de vorig genoemde, in naalddhout, op ± 10 M. hoogte. Twee ervan bevatten elk één jong, nog ongeveer ten halve in het dons; het derde mocht om jachttreden niet worden bezocht, doch de mededeelingen der zeer betrouwbare waarnemers sluiten elke gedachte aan fictie of verkeerde determinatie uit. Zelfs was daar in de vroege lente nog een vierde horst bekend, maar door een ongelukkigen samenloop van omstandigheden sneuvelde een der ouden en het is niet onwaarschijnlijk, dat dit gehalveerde paar zich weer completeerde en een der drie



Jb. v. d. Peppel phot.
(copyright).

Jonge buizerd, *Buteo b. buteo* L.; Zeddam, 25-VI-'32.

horsten betrok, zoodat het te problematiek is, om van vier broedgevallen in dezen hoek te spreken. Het ettelijke honderden hectaren omvattende bosch, waar deze buizerds nestelden en zeer afdoende beschermd worden, bestaat uit gemengd loof- en naalddhout, goeddeels van reeds gevorderden leeftijd, veel grazige open terreintjes, enkele kleine boerderijen, onderbeplantingen en aansluitende aan veengebied, goor, heide enz. De menscheelijke bewoning is vrij schaarsch. Ondanks de in groote hoeveelheid voorkomende zeer hooge pijn- en loofboomen, prefereert de buizerd een vrij lagen neststand in $\pm$ 50 jarige grove-dennen, zoodat het zelfs mocht gelukken, een opname van den ouden vogel te maken, voor zoover mij bekend, de eerste in Nederland. Belangstellenden mogen verwezen worden naar het uitvoerige, geïllustreerde relaas omtrent deze vondst van mijne hand in het maandblad „de Wandelaar” van Juli 1932.

Blijkens mededeeling van den jachtopzichter broedt de buizerd in dit gebied reeds minstens tien jaar in meerdere paren. De meest volstreckte rust, die er in de streng verboden en goed bewaakte bosschen heerscht, zal aan het geregelde voorkomen dezer roofvogels niet vreemd zijn. Het is bemerkenswaardig, dat alle drie de gebieden, waarvan in deze mededeeling sprake is, een volledige bescherming genieten en ook alle roofvogels er gespaard worden.

WAGENINGEN, eind Juni '32.

Korte Mededeelingen.

Algemeene index op de Jaarberichten der Club van Nederlandse Vogelkundigen.

Bij het verschijnen van den Algemeenen Index op de Jaarberichten der Club, samengesteld door den heer G. VAN DER MEER, kunnen wij niet nalaten den schrijver onzen welgemeenden dank te betuigen voor dit zoo hoogst nuttige, ja wij durven gerust zeggen, voor den studeerenden lezer onzer Clubberichten, onontbeerlijke werk, dat hij hier heeft geleverd.

Het werd steeds als een gemis gevoeld, dat een algemeene