

overgebracht. Hieruit blijkt, dat het aantal dezer beide soorten, die toen nog in Engeland broedden (kemphanen werden o.a. in Lincolnshire en Cambridgeshire met netten gevangen en als kwartels gemest) toch lang niet voldoende was om te voorzien in de behoeften van de koninklijke tafel.

De nederlandsche scholekster, *Haematopus ostralegus*,

DOOR

J. G. VAN MARLE.

Het „Committee on the Nomenclature etc. of the birds in the British Islands” erkende in haar 8ste bericht, Ibis 1932, p. 97, de geldigheid van *Haematopus ostralegus occidentalis*, welke door NEUMANN destijds beschreven was, als ras van de scholekster voor Engeland.

Reeds eerder spraken Prof. NEUMANN en de heer HENS het vermoeden uit, dat de nederlandsche scholekster tot de nominaatvorm *H. o. ostralegus* L. van Scandinavië, Oostzeelanden en Duitschland behooren zou, en niet tot de Engelsche vorm. Maten aan een 10-tal zekere broedvogels van Zeeland, Holland en Friesland genomen bevestigen deze vermoedens. Opvallend is aan deze vogels de slanke snavelvorm, welke voor *H. o. ostralegus* karakteristiek is. De hoogte en dikte der snavel blijft dan ook bij die der Engelsche vogels achter.

Ter vergelijking geef ik hierbij, behalve voor de inheemsche vogels, de maten door bovengenoemd comité, voor britsche en zweedsche vogels genoemd.

		vleugellengte	snavelengte van bevedering	snavel bij voorste einde v./h. neusgat		snavel, grootste hoogte van groeve tot punt
				hoogte	dikte	
Nederland	4 ♂ ♂	244-252-256-264.	70-74-79-69.	9 $\frac{1}{2}$ -10- 10-10-	8-7-8-8.	9-9-9 $\frac{1}{2}$ -10.
Zweden	4 ♂ ♂	min. 241 max. 255.	65-71.	9-11.	7-8.	9-10.
Engeland	12 ♂ ♂	„ 252 „ 263.	67-78.	11-12 $\frac{1}{2}$.	8-10.	10-11 $\frac{1}{2}$.
Nederland	6 ♀ ♀	245-245-250- 252-250-256.	75-78-75- 79-74-78.	9 $\frac{1}{2}$ -10-9 $\frac{1}{2}$ - 9-11-11.	8-7-7- 8-8-8.	10-10-9 $\frac{1}{2}$ - 9-10-10.
Zweden	4 ♀ ♀	min. 241 max. 258.	71-78.	9 $\frac{1}{2}$ -11.	7-9.	8 $\frac{1}{2}$ -10 $\frac{1}{2}$.
Engeland	9 ♀ ♀	„ 257 „ 270. (één 242)	73-79. (één 86)	11-12.	8-11.	10 $\frac{1}{2}$ -12.

Korte Mededeelingen.

November-waarneming van een gele kwikstaart, *Motacilla flava* subsp.

Op 10 November 1932, een zéér laten datum, werd mij een gele kwikstaart gebracht, die door een landbouwer onder 's Gravezande in een schuur was gegrepen. Door de helgele kleur der onderzijde hield ik het ex. voor een ♂; bovenkop en nek waren lichtvaalbruin. Een duidelijke lichte oogstreep was aanwezig; hierdoor en omdat vlekjes aan keel en bovenborst geheel ontbraken, kon *thunbergi* worden uitgesloten, zoodat de vormen *flava* of *rayi* overblijven; van *rayi* is in Brittannië een nog later voorkomen op 27 Nov. bekend (Pr. H.).

Het voorwerp werd direct op een weiland, geringd, in vrijheid gesteld.

J. C. KOCH.

IJsgors-vangsten en waarnemingen, *Calcarius l. lapponicus* (L.), aan het Ringstation Wassenaar.

Aan het „Ringstation Wassenaar” deed ik een vijftal waarnemingen dezer soort, waarvan de éérste viel op 29 September 1932, waarschijnlijk wel de vroegste herfstdatum voor ons land, waarbij een juv. ex., waarschijnlijk een ♂, werd gevangen.