

„Vandalisme”.

„Bij een praeparateur in Nederland (ik vermeld opzettelijk „niet de plaatsnaam, omdat de man er part noch deel aan heeft), „trof ik aan: 2 adulte ♂♂, één ad. ♀ en een vlug jong van de „steltkluit, bedroevend slecht opgezet en geschoten in het ooste- „lijk gedeelte van Zeeuwsch Vlaanderen, zomer 1932.”

C. EYKMAN.

Uit dit betreurenswaardig geval blijkt wederom duidelijk het voorkomen van de steltkluit in Oost Zeeuwsch Vlaanderen, waarop ik reeds wees in dit tijdschrift, 4, 1932, p. 162, naar aanleiding van een mededeeling in „Le Gerfaut”. Het is te hopen, dat nu spoedig een of meer onzer nederlandsche ornithologen in de gelegenheid zullen zijn om nauwkeurig uit te maken, hoe het met de steltkluitten in het bewuste gedeelte van ons land staat, of ze daar ook werkelijk broeden en zoo ja, uit hoeveel paren deze nederzetting bestaat. (t. K.)

Vergadering te Amsterdam in „Artis” op 29 Januari 1933.

Aanwezig van het Bestuur: de heeren P. A. HENS, Dr. C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE, Jhr. Dr. Ir. F. C. VAN HEURN en Tsjeard Gs. DE VRIES, alsmede de leden: M. J. TEKKE, Dr. J. C. KOCH, J. P. BOUMA, Dr. H. W. VAN RHYN, L. J. KLEYN, G. A. L. BISSELING, Dr. D. MAC GILLAVRY en Dr. C. G. B. TEN KATE.

De Voorzitter opent de vergadering en de notulen worden na lezing goedgekeurd.

Besloten wordt aan de Contactcommissie inzake Natuurbescherming, waartoe de Club is toegetreden, een jaarlijksche bijdrage van f 5.— te verleen.

Als nieuwe leden worden aangenomen: de heeren H. DAENDELS te Hattem en H. RUITER te Gorinchem, alsmede de bibliotheek van de Landbouwhoogeschool te Wageningen.

Vervolgens zijn aan de orde de wetenschappelijke mededeelingen.

De heer DE VRIES vermeldt de waarneming van een pestvogel, *Bombycilla garrulus* (L.), 14 dagen geleden te Oenkerk (Fr.).

Dr. TEN KATE demonstreert, mede namens den heer BOSCH te Leeuwarden, 1e het tweede inlandsche ex. van *Turdus dauma aureus* Hol. (zie dit tijdschrift, 5, 1933, p. 118—121); 2e een ♀ torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L., onlangs door den heer BOSCH uit Birdaard (Fr.) ontvangen, waarvan de bandeering van den staart gedeeltelijk ontbreekt. Verder doet hij mededeeling van een ♀ roodkeelduiker, *Colymbus stellatus* Pontopp., 17 Januari 1933 bij Kampen aan zee in halfdoode toestand aangetroffen, met een lintworm uit de bek hangend. Bij sectie bleek de slokdarm propvol lintwormen te zitten, zoodat het ex. vermoedelijk door ondervoeding is omgekomen. Over de daarna gedemonstreerde ingewanden van een ♀ of juv. toppereend, *Nyroca m. marila* (L.), zie men dit no., p. 173. Daarna deelt spreker mede, dat ons nieuw lid, de heer DAENDELS te Hattem, hem in de gelegenheid heeft gesteld diens coll., bestaande uit een klein aantal opgezette ex. en eenige honderden huiden, grootendeels uit de jaren 1925—1927, door te werken. Bij het voorloopige doorzien van een gering gedeelte hiervan trof spreker daarbij direct eenige belangrijke objecten, waarvan hij er 3 laat rondgaan en wel 1e een ♂ en ♀ krombekstrandlooper, *Calidris testacea* (Pall.), in prachtkleed, geëtiketteerd Uithuizen, 26 Juni 1926. Voor zoover is na te gaan is de laatste v o o r - jaarsdatum 28 Mei 1926 (2 op Vlieland, waarneming BROUWER, 1 in winterkleed en 1 in overgang) en de eerste n a - jaarsdatum 17 Juli 1927 (1 op Texel, in zomerkleed, waarneming BIERMAN). De 2 gedemonstreerde huiden zijn dus voor zoover bekend, de e e n i g e J u n i - waarnemingen uit ons land. 2e een vogel geëtiketteerd „*Emberiza calandra* var. *isabella*, ♀, Zwolle 5 December 1926”, geprepareerd door firma ENGELS aldaar. Er ontstaat een gedachtenwisseling over dit merkwaardige object, dat volgens de heeren EYKMAN en HENS zeer zeker geen *Emberiza calandra* is, maar hoogstwaarschijnlijk een *Melanocorypha*. De heer VAN MARLE, die later ter vergadering verschijnt, neemt het voorwerp ter nadere determinatie mee ¹⁾.

¹⁾ Dato 4 Maart j.l. ontving TEN KATE bericht van den heer VAN MARLE, dat het voor hem vast stond, dat we met *Melanocorypha* te doen hebben en wel de species *calandra*, maar voor *M. c. calandra* leek de snavel te klein, even als de vleugelmaat (117 tegen 130 voor *calandra*), terwijl het hem toescheen, dat de vogel in rui was. Op aanraden van den heer VAN MARLE zond TEN KATE het object naar prof. STRESEMANN te Berlijn, die hem dato 11 April het volgende schreef: „... (ich) fand, dass es sich

Dr. MAC GILLAVRY vertoont als curiosum een oud ornithologisch prentenboek getiteld: „Alderhande vreemde en hollandse vogels”, waarschijnlijk ongeveer in 1720 uitgegeven by Pieter VAN DER AA, te Leyden en geteekend door Abraham ALLARD te Amsterdam. Het werkje bestaat uit 16 kopergravures, waarvan faunistisch voor ons land alleen plaat 15 van belang is.

Spreker deelt vervolgens mede dezen zomer te Didam op den grond te hebben gevonden aaskevers (twee *Choleva*-soorten), blijkbaar afkomstig uit de nestwand van daarboven broedende boerenzwaluwen, *Hirundo r. rustica* L. Onder de nesten van huiszwaluwen, *Delichon u. urbica* (L.), trof hij deze kevers niet aan. De bouw der nesten van beide zwaluwen was typisch, zoodat het nestmateriaal van de boerenzwaluw zich zeker eerder leenen zal voor goede ontwikkelingsvoorwaarden voor deze kevers, dan het klei-nest der huiszwaluwen. Daar spreker echter in een Engelsch werk gelezen heeft dat bij boerenzwaluwen op het continent overgangsnestbouw (naar de huiszwaluw) voorkomt, vraagt hij of dit ook van ons land bekend is. De heer DE VRIES verzekert, dat hem daarvan voor ons land niets bekend is. Wel is er een verschil in bouw wanneer het nest op een steunpunt gemaakt is of wel tegen een muur aangeplakt. Maar het nestmateriaal is behoudens de klei voor het aanplakken ongeveer hetzelfde.

De heer BISSELING vertoont een drie-legsel van de goudlijster, *Turdus dauma aureus* Hol., het eerste authentieke legsel, geveild in Engeland. Het werd verzameld te Fuji, Japan, op 3 Juli 1900, door Alan OWSTON en maakte daarna deel uit van de coll. H. NOBLES. De maten der eieren zijn 30.7×24.5 ;

„sicher um *Melanocorypha c. calandra* handle. Genau so kleinschnäblige „Exemplare besitzen wir aus Tunis und von anderen Orten. Die Schnabelform variiert wie bei allen grossschnäbligen Lerchen ungemein. Sie „werden schon bemerkt haben, dass bei dem Vogel die äusserste Hand- „schwingen und auch die äusseren Steuerfedern noch in den Blutkielen „stecken. (Daher die geringe Flügellänge!) Das Exemplar macht keines- „wegs den Eindruck, im Käfig gehalten gewesen zu sein; es wird wohl in „der Freiheit geschossen worden sein. Unter diesen Umständen kann aber „das „Erlegungsdatum‘ nicht richtig sein, denn diese Lerchen befinden „sich etwa Mitte September, nicht aber Anfang Dezember, in dem „entsprechenden Mauserstadium.” Getracht zal worden van den praepara- teur nadere inlichtingen en opheldering te verkrijgen over de juiste vind- datum en plaats van het bewuste object, terwijl ook op deze plaats prof. STRESEMANN nogmaals hartelijk wordt bedankt voor het uitspreken van zijn hooggeschat oordeel. (t. K.)

32.2 $\times$ 23.7 en 32.8 $\times$ 24. Zeer interessant was een doos met verschillende skeletdeelen van de groote alk, *Alca impennis*, gevonden op de Funk-eilanden (N. Foundland). Aanwezig waren: schedel, pijpbeenderen, ribben, borstbeen enz.)

De heer KLEYN laat wulpeneieren, *Numenius a. arquata* (L.), uit de Peel rondgaan met abnormale maten en vormen en eveneens afwijkende kluiteieren, *Recurvirostra avosetta* L.

Dr. VAN RHYN deelt uit een schrijven uit Boedapest mede, dat daar een groote pestvogelinvasie, *Bombycilla garrulus* (L.), is geweest. Het was aan één persoon gelukt in acht dagen 1060 pestvogels te ringen! Onder de gevangen vogels bevond zich een met een Rossittenring. Ruim 11½ maand van tevoren was de vogel daar gevangen en had daarom gemiddeld 18 K.M. per dag afgelegd.

Dr. KOCH heeft op 11 Aug. '32 op de Kaag een waterriet-zanger, *Acrocephalus paludicola* (Vieill.), waargenomen; voorts te 's-Gravesande een late gele kwikstaart, *Motacilla f. flava* L. of *f. rayi* (Bp) (zie dit no., p. 166). Het ringstation Wassenaar heeft het vorige najaar 5 exemplaren van de ijsgors, *Calcarius l. lapponicus* (L.), gevangen, waaronder twee adulte. Hij demonstreert vervolgens de huid van een ♀ keep, *Fringilla montifringilla* L., met afwijkend gevederte, gevangen te Wassenaar 7 Nov. '32. Keel en oordekveeren zijn wit en ook de zijhals is zeer lichtgekleurd.

Dr. VAN HEURN vertoont een opgezet exemplaar van *Machaeramphus alcinus* (Westerm.), een buizerdachtige roofvogel, die hoofdzakelijk van vleermuizen leeft en zeldzaam op Sumatra voorkomt. Het etiket vermeldt: Medan (Deli), Augustus 1926.

Vervolgens laat hij rondgaan een uiterst handig en compact apparaatje voor het automatisch-electrisch fotografeeren van vogels.

Een zeer interessante voordracht van Dr. KOCH over het ringstation Wassenaar, waarbij bleek, dat gedurende den korten tijd, dat dit station bestaat, reeds hoogst belangrijke resultaten zijn bereikt, besloot de bijeenkomst op een vervogorderd uur.

Als terrein voor de zomerexcursie werd gekozen: de Ankeveensche plassen (in Mei 1933). De vergadering op Zaterdag daaraan voorafgaande zal gehouden worden te Bussum.

De Secretaris, C. EYKMAN.