

Korte Mededeelingen.

Een zwartbruine wouw, *Milvus m. migrans* (Bodd.), in de „Peel”.

Op 17 April 1933 namen F. KOOYMANS, M. J. TĖKKE en ondergeteekende in de Vrede Peel nabij Twist een zwartbruine wouw waar. De sterk gevingerde vleugels, de flauw ingesneden staart en het ontbreken van een witte plek op den ondervleugel waren bij het laag langs ons heen zwevende ex. zeer duidelijk te zien.

J. C. KOCH.

Een vrij late voorjaarswaarneming van de kraanvogel, *Grus gr. grus* (L.), in de „Peel”.

Op 16 April 1933 zagen dezelfde waarnemers terzelfder plaatse een voedsel zoekenden kraanvogel, die zeer schuw was, zich moeilijk liet benaderen en spoedig opvloog. In de daaraan aansluitende week nam L. J. KLEYN waarschijnlijk het zelfde ex. nog eenige malen waar.

J. C. KOCH.

Late voorjaarstrek van de kleine barmsijs, *Carduelis flammea cabaret* (P. L. S. Müll.), bij Wassenaar.

Op 3 Mei 1933 werd op het Ringstation Wassenaar een ♀ van de kleine barmsijs geringd. Dit is thans het 4de achtereenvolgende jaar, waarin gedurende het late voorjaar telkens zwerfers of trekkers van dezen vorm in het duin te Wassenaar konden worden waargenomen.

RINGSTATION WASSENAAR.

Doortrek van de noordsche gele kwikstaart, *Motacilla flava thunbergi* Billberg, in Limburg.

Op 13 Mei 1933 zag ik een troep van 14 gele kwikstaarten bij Nederweert (Limburg), die zonder eenige twijfel behoorden tot den subspecies *thunbergi*, den zwart koppigen vorm, zonder oogstreep. Helaas gelukte het niet een ex. te verzamelen.

P. A. HENS.

Buizerd, *Buteo buteo* subsp., met ring uit Riga.

Eindelijk ontving ik bericht uit Riga, dat de buizerd met ring: Ornithol. Centrale Riga 48557 (zie dit tijdschrift, 5, 1933, p. 124), die in voorjaar 1932 te Barneveld was doodgevonden,

op 6 Augustus 1931 als nestjong te Windau in Letland was geringd.

P. A. HENS.

Merkwaardige standplaats van een baardmeesnest, *Panurus b. biarmicus* (L.).

Toen ik met den bewaker van het Kampereiland op 14 Mei 1933 even ging zitten uitrusten, op een luwe plek achter een groote rietmijt, die opgericht was aan den berm van de krib naar de Ramspol, kwamen een ♂ en ♀ baardmees steeds nader bij, met fijn nestmateriaal in de bek; tenslotte tot op 1 meter afstand! Schuin tegen de rietmijten waren een paar bossen riet geplaatst, die doordat wij er op waren gaan zitten, verschoven waren en toen bleek ons bij onderzoek, dat daarachter tegen en gedeeltelijk onder een paar iets meer uitstekende onder-einden van eenige rietbossen van de mijt zelf, een baardmeesnest was gebouwd! Het steunde verder op een paar doode halmen van het voorjarige riet, dat daar aan de kant had gegroeid. Het nest was nog leeg, maar toen we de schuin staande rietbossen weer in hun oude stand brachten, waren de oude baardmeezen er weer spoedig bij en den volgenden dag bevatte het 1 ei. 17 Mei zaten er 3 eieren in en op 19 Mei 5. 27 Mei waren 2 eieren verdwenen. Toen er al jongen in waren, werd de rietmijt weggehaald, maar de werklui zagen het nest en lieten het in de paar rietstengels hangen. De bewaker zette er weer wat riet omheen en toen kwamen de ouden weer voeren. Tenslotte echter werden de jongen, vermoedelijk door ongedierte, opgegeten. De bovenrand van het nest was 47 cm. van de grond verwijderd.

C. G. B. TEN KATE.

Een noorsche roodgevlekte blauwborst, *Luscinia svecica gaetkei* (Kleinschm.), op het Kampereiland verzameld.

Op 5 Mei 1933 ontdekte ik op het Kampereiland, buitendijks, een blauwborst, die het mij gelukte te verzamelen. Het bleek een prachtig adult ♂ te zijn van de roodgevlekte vorm en de vleugelvorm klopte geheel met die, welke in het Pr. Handb. voor de subspecies uit Noorwegen, *gaetkei*, is afgebeeld. In de literatuur zijn 7 voorjaarsgevallen vermeld: 6 ♂♂ en 1 ♀, alle tusschen 7 en 20 Mei; verder 1 zonder datum en 1 najaarsgeval, nl. een ♂ juv., dat op 7 Sept. 1930, door VAN DEN BRINK in mijn gezelschap, op dezelfde plaats als dit nieuwe ♂, werd ge-

schoten (zie dit tijdschrift, 3, 1931, p. 150). Volgens de literatuur is dit dus het 9e ex. met bekenden verzamel-datum. 14 Mei ontdekte ik aldaar weer een ♂ blauwborst, hetwelk helaas niet in mijn bezit kwam, zoodat ik daarvan de subspecies niet kan opgeven.

C. G. B. TEN KATE.

Dwerg-ei van de vischdief, *Sterna h. hirundo* L.

Op 5 Juni 1933 vond ik in een kleine vischdief-kolonie aan de IJssel bij Zalk (tusschen Katerveer en Kampen), o.a. een 3 legsel, waarvan 2 eieren normaal waren, terwijl het derde opvallend veel kleiner was. Dit miniatuur ei had de volgende maten: 26.0×22.0 mm., was onbebroed en bevatte ook een weinig dooier.

C. G. B. TEN KATE.

Broedgeval van de havik, *Accipiter gentilis gallinarum* (Brehm), in het seizoen 1933.

De havik broedde in het seizoen 1933 op de „Buunderkamp”, te Wolfheze (Gld.). Het horst, dat ik op 29 Mei bezocht, bevatte 1 jong van ongeveer 10 dagen oud en 2 schiere eieren (coll. Tsj. DE VRIES). 't Bevond zich op 8 M. hoogte in een zwaren pijnboom.

A. B. WIGMAN.

Broedgevallen van de buizerd, *Buteo b. buteo* L., in het seizoen 1933.

In het Montferland, nabij Zeddam, nestelde, evenals verleden jaar ook in 1933 wederom een buizerd. Het horst bevond zich op aanzienlijke hoogte in een pijnboom en bevatte met Pinksteren 3 halfwas jongen.

Voorts kan worden medegedeeld, dat deze soort ook onder Haaksbergen (Ov.), weer broedend aangetroffen werd, thans echter naar de eigenaar van het „Lankheet” mij meldt, wel $2\frac{1}{2}$ maal zoo hoog als in 1932, toen het horst zich, gelijk ik in dit tijdschrift berichtte (5, 1932, p. 30—31) op circa 8 meter hoogte bevond.

In den z.g. Driesche Singel, Staatsboschbeheer Putten (Veluwe), ondernam een buizerd-paar dit jaar een broedpoging, doch werd helaas het horst door jongens verstoord. Ook enkele jaren geleden was dat het geval.

A. B. WIGMAN.

De draaihals, *Jynx t. torquilla* L., als broedvogel op de Veluwe.

De draaihals is, althans hier op de Veluwe, sedert eenige jaren zóó zeldzaam geworden, dat m.i. de mededeeling gerecht-

vaardigd is van een nest met 5 eieren, hetwelk op 29 Mei 1933 werd aangetroffen in een nestkastje nabij „Johannahoeve”, te Wolfheze (Gld.). Er schijnen meer teekenen te zijn, dat de soort zich wat herstelt. De oorzaak van de teruggang is mij onbekend.

A. B. WIGMAN.

Evenals sommige andere soorten (b.v. *Riparia* en *Himantopus*) is ook *Jynx* een onstandvastige broedvogel, die soms en plotseling vrij talrijk kan optreden om dan weer, zonder — voor ons — begrijpelijke reden, even plotseling te verdwijnen.

TSJ. GS. DE VRIES.

Een vier-legsel van den boomvalk, *Falco s. subbuteo* L.

Op 14 Juni j.l. werd, onder Ede (Gld.) in een berk, waarin de soort ook het vorig jaar heeft gebroed, een fraai geteekend vier-legsel van den boomvalk, *Falco s. subbuteo* L., gevonden.

Dit aantal eieren is tamelijk zeldzaam; in de vele boomvalkenhorsten, die ik, in den loop der jaren, heb bezocht, bevond zich nog maar éénmaal méér dan drie eieren of jongen. Soms waren het er slechts twee.

A. B. WIGMAN.

Het „Pract. Handbook” zegt (Vol. 2, p. 115): „Normally „3, sometimes two. From Continent four have frequently been „reported, but few English records will bear investigation.”

(t. K.)

Ik bezit een engelsch vier-legsel.

DE VRIES.

De houtsnip, *Scolopax r. rusticola* L., als broedvogel op de Noordwest-Veluwe.

De houtsnip, die in de Staatsbosschen „Speulder- en Sprielderbosch” geregeld als broedvogel geconstateerd wordt, heeft daar ook in het seizoen 1933 wederom in meerdere paren gebroed. Er werden verscheidene jongen gezien, terwijl de Staatsboschwachter — een volkomen betrouwbaar waarnemer, die de soort zeer goed kent — nabij het bekende Solsche Gat, het wegdragen van een jong tusschen de pooten van den ouden vogel, van nabij heeft kunnen observeeren.

A. B. WIGMAN.

Voor mijn collectie verkreeg ik een vier-legsel van Putten (Geld.), op 22 April 1933.

W. HELLEBREKERS.

Zie ook dit tijdschrift, 5, 1932, p. 38.

(t. K.)

Een „sprinkhaanrietzanger”, *Locustella n. naevia* (Bodd.), die een snor, *Locustella l. luscinioides* (Savi), bleek te zijn!

Dit jaar in Mei bevond ik mij in de Drunensche duinen

(binnenland van N.-Brabant), een streek geheel verstoken van water en riet, toen mijn aandacht op 3 plaatsen getrokken werd door het bekende gesnor van een *Locustella*.

Zonder eenige twijfel een sprinkhaanrietzanger, zoo dacht ik. De triller kwam mij hooger voor dan die van de snor alhoewel zonder beide geluiden gelijktijdig te hooren, een diagnose op de toonhoogte altijd gewaagd is. De doorslag gaf bij mij echter de streek: hoofdzakelijk een droog terrein met zandbodemvegetatie, juist wat een sprinkhaanrietzanger noodig heeft.

Met zeer veel moeite en geduld gelukte het een „zingend” exemplaar voor mijn collectie te bemachtigen op een oogenblik, dat de geheimzinnige vogel zich een ondeelbaar moment liet zien.

Groot was mijn verbazing toen het slachtoffer een snor! bleek te zijn. Sindsdien geloof ik niet meer aan de juiste opgaven van het „besliste” voorkomen van den sprinkhaanrietzanger in bepaalde streken van ons land temeer daar deze vogel zich zoo goed als nooit laat waarnemen doch het geluid tezamen met de geëardheid van het terrein bijna steeds den doorslag moeten geven.

C. EYKMAN.

De in de duinen gevonden nesten waren steeds van *naevia*.

DE VRIES.

Mei-waarnemingen van de grauwe gans, *Anser anser* (L.), en de rotgans, *Branta b. bernicla* (L.).

Op 29 Mei jl. zag ik een exemplaar van de wilde gans, *Anser anser* (L.), dat, op drooggelooopen gronden, buiten de haven van Terschelling, voedsel zocht.

Later op den dag werden, bij Griend, een drietal zwemmende rotganzen, *Branta b. bernicla* (L.), waargenomen, terwijl op dat eiland een troep van ongeveer 30 dezer vogels „weidende” werd aangetroffen.

Tsj. GS. DE VRIES.

Ook op het Kampereiland werden weer Mei-waarnemingen van de grauwe gans gedaan en wel op 22 en 23 Mei 6 stuks (door den bewaker), aan zee bij de Ramspol. Men zie verder dit tijdschrift, 3, 1931, p. 152; 4, 1931, p. 31 en 5, 1932, p. 35-36. Voor zomer-waarnemingen van de rotgans zie men de lijst der N.O.V., p. 13.

C. G. B. TEN KATE.

Zomerwaarneming van het witgatje, *Tringa ochropus* L., bij Appelscha.

Gedurende den zomer van 1932 heeft zich een paartje wit-

gatjes voortdurend in de omgeving van het dorp Appelscha (Z. O. hoek van Friesland) opgehouden. Een nest werd echter niet gevonden en evenmin zijn jonge vogels gezien.

Tsj. Gs. DE VRIES.

De waterral, *Rallus a. aquaticus* L., broedvogel op Schiermonnikoog.

Op 30 Mei jl. werd, op Schiermonnikoog, een — verlaten — nest van de waterral, *Rallus a. aquaticus* L., met 6 eieren gevonden. Het legsel bevindt zich thans in het friesch natuurhistorisch museum te Leeuwarden. Behalve op Texel, is de soort nog op geen der waddeneilanden broedende waargenomen.

Tsj. Gs. DE VRIES.

Kievitseieren [*Vanellus vanellus* (L.)].

Het aantal eieren van *Vanellus vanellus* (L.), dat dit jaar, in Friesland, is verhandeld, was even groot als in 1932 (150.000 stuks). De prijzen waren over het algemeen iets lager dan het vorig jaar, maar toch werd, nog op den laatsten dag, door de handelaars grif 8 cts. per ei betaald, zoodat duizenden eierenzoekers in de Aprilmaand een aardige bijverdienste hebben gemaakt.

Tsj. Gs. DE VRIES.

Jaarverslag 1 Mei 1932—1 Mei 1933.

Het Bestuur der Club onderging dit jaar geen wijziging.

De Voorzitter, de heer P. A. HENS, aan de beurt zijnde van periodieke aftreding, werd bij acclamatie herkozen.

In het Clubjaar 1932/1933 werd driemaal vergaderd.

Deze vergaderingen, welke goed bezocht waren, werden gehouden resp.: te Delden (21 Mei), en te Amsterdam (9 October en 29 Januari). De Meivergadering te Delden werd gevolgd door een, dank zij het mooie weer, goedgeslaagde excursie naar het landgoed „Twickel” op 22 Mei, gecombineerd met de bezichtiging van de vogelcollectie van Förster MICHEL.

Ook in de samenstelling van de Redactie van het Orgaan kwam geen verandering.