

Vergadering te Bussum in Hotel „Jan Taback” op 20 Mei 1933.

Aanwezig van het Bestuur: de heeren P. A. HENS, Dr C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE, Tsj Gs. DE VRIES en Jhr. Dr Ir F. C. VAN HEURN, alsmede de leden: Dr C. G. B. TEN KATE, D. A. BLAUW, M. J. TEKKE, A. B. WIGMAN, Dr A. A. J. H. MARRES, L. J. KLEYN, W. HELLEBREKERS, W. F. SILLEM, L. SMELT WOODLAND, Dr J. C. KOCH, Dr H. W. VAN RHIJN en M. H. KLEYN.

Met kennisgeving afwezig: Dr G. J. VAN OORDT, J. P. BOUMA en A. H. SILLEM.

De Voorzitter opent de vergadering en de Secretaris leest de notulen voor, die daarna goedgekeurd worden.

Na behandeling van enkele huishoudelijke zaken en bespreking van ingekomen stukken is aan de orde de benoeming van een bestuurslid wegens periodieek aftreden van den heer J. G. VAN MARLE. Bij acclamatie wordt hij als bestuurslid herbenoemd.

De heeren VAN RHIJN en WIGMAN worden aangewezen de stukken van den penningmeester te contrôleeren. Deze worden in orde bevonden, zoodat de penningmeester gedechargeerd wordt.

Tot nieuwe leden worden benoemd: de heeren J. H. SMIDT VAN GELDER, te Arnhem, S. J. GEERTS, te Scheveningen en J. ZWOLLE, te Arnhem.

De heer HENS deelt mede thans eindelijk bericht uit Riga te hebben ontvangen over de geringde buizerd, *Buteo buteo* subsp. (zie dit tijdschrift, 5, 1933, p. 124 en dit no., p. 24). Vervolgens vermeldt hij de waarneming van een troep noordsche gele kwikstaarten, *Motacilla flava thunbergi* Billberg, in Limburg (zie dit no., p. 24).

Dr TEN KATE doet mededeeling van een zeer makke roodkeelduiker, *Colymbus stellatus* Pontopp., die op 7 April 1933, nog in winterkleed, zich in het Noorddiep op het Kampereiland bevond. Een boer, die in de buurt aan het werk was, vertelde, dat de vogel aardappels was komen opeten, die hij op een vonder had gestrooid. Wat verderop zwom nog een 2e ex., eveneens in winterkleed.

Dienzelfden dag joeg spreker op de Ramspol (aan zee), een korhoen, *Lyrurus t. tetrrix* (L.), op, dat boven op een riet-

mijt zat. Lang geleden werden korhoenders op het Kampereiland waargenomen en ook geschoten door beroepsjagers.

Verder vond spreker een nest van de baardmees, *Panurus b. biarmicus* (L.), dat zeer eigenaardig geplaatst was (zie dit no., p. 25).

Tenslotte laat spreker een prachtig ad. ♂ van de noorsche roodgevekte blauwborst, *Luscinia svecica gaetkei* (Kleinschm.), rondgaan, dat door hem op het Kampereiland werd verzameld (zie eveneens dit no., p. 25).

Dr KOCH wijst op de reeds enkele jaren aan het Ringstation Wassenaar geconstateerde late voorjaarestrek van de kleine barmsijs, *Carduelis flammea cabaret* (P.L.S. Müll.) (zie ook dit no., p. 24), en deelt mede, dat aldaar op 1 Mei 1933 een Groenlandsche tapuit, *Oenanthe oe. leucorrhoa* (Gm.), werd geringd; vleugelmaat l. en r. 105 mm. Verder is spreker op 16 en 17 April en op 13 en 14 Mei in de Peel geweest om een onderzoek in te stellen naar den huidige stand der goudpluvieren, *Charadrius apricarius oreophilus* Meinertzh. Het is hem niet gelukt een nest te vinden; slechts één exemplaar werd waargenomen. Spreker schrijft de oorzaak toe aan het volksgebruik om Paaschvuren te ontsteken, hetgeen de vogels wellicht zal afschrikken.

De heer DE VRIES is het er niet mede eens. Men heeft daar in den loop der jaren steeds heidebranden gehad. Het gebeurt meer, dat de pluvieren zich het eene jaar laten zien en een volgend jaar ontbreken. Deze ervaring heeft hij in 1918 en 1919 opgedaan. In '18 waren er verscheidene aanwezig terwijl ze in '19 ontbraken. De kans, dat ze geregeld minder worden is natuurlijk wel groot omdat de Peel meer en meer in cultuur wordt gebracht.

Dr KOCH vertelt nog van een waarneming van een kraanvogel, *Grus g. grus* (L.), en van een zwart-bruine wouw, *Milvus m. migrans* (Bodd.), in de Peel (zie dit no., p. 24).

De heer TEKKE vertoont enkele nog niet gedetermineerde balgen van vogels, die gedurende een reis van Indië naar Holland waren verzameld en aan boord in een koelcel waren bewaard: een ral-achtige, waarschijnlijk *Gallicrex cinerea* uit Indië, een nachtzwaluwsoort¹⁾ uit de Golf van Aden, een bijen-

¹⁾ Volgens den heer J. G. VAN MARLE, die zoo vriendelijk was de huiden te determineren, is de nachtzwaluw, *Caprimulgus europaeus meridionalis* Hart., en de bijeneter, *Merops persicus persicus* Pall.

eter uit de Roode zee, een kwikstaart ook uit de Roode zee en een roodstaart uit Algiers.

De heer WIGMAN zegt, dat op de Veluwe de zwarte specht, *Dryocopus m. martius* (L.) sterk toeneemt. Met zekerheid zijn er reeds 7 broedparen, drie nesten werden gevonden.

Er is dit jaar een haviknest, *Accipiter gentilis gallinarum* (Brehm), gevonden op een plaats, waar boscharbeiders aan het werk waren. De vogel verplaatste toen zijn horst naar een laag dennetje in een rustig bosch een kwartier verderop gelegen (de foto wordt rond gegeven).

Volgens spreker broedt op Hagenau en te Haaksbergen weer een buizerd, *Buteo b. buteo* (L.) (zie dit no., p. 26), en op het landgoed „de Hooge Veluwe” is op de vischvijvers den geheelen winter een vischarend, *Pandion h. haliaetus* L., waargenomen. Op 15 Mei was de vogel er nog aanwezig. De draaihals, *Jynx t. torquilla* L., komt dit jaar weer iets frequenter op de Veluwe voor (zie dit no., p. 26).

De heer HELLEBREKERS heeft in de tweede week van Mei een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van de steltkluit, *Himantopus h. himantopus* (L.), in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij heeft bezocht het „groot eiland” bij Hulst, een pracht terrein voor vogels in het algemeen. Hij trof daar veelvuldig aan kemp-hanen, *Philomachus pugnax* (L.), kluiten, *Recurvirostra avosetta* L., grutto's *Limosa l. limosa* (L.), kieviten, *Vanellus vanellus* (L.), en als tegenstelling zelfs wielewalen, *Oriolus o. oriolus* (L.). Na eenigen tijd zag hij werkelijk een steltkluit overvliegen. De jachtpachters in deze streek kenden de vogels ook en be-weerden ze in het begin van Juni meermalen bij de nesten gezien te hebben. Het aantal broedparen wordt in Zeeuwsch-Vlaanderen op 10 stuks geschat ¹⁾.

¹⁾ Op 29 Juni j.l. ontving de Redactie van den heer HELLEBREKERS nog het volgende bericht:

„De resultaten van mijn onderzoek bij Hulst zijn minder geweest dan „ik verwacht had. Op 13 Juni schreef mij de jachtopziener: „„Heden nog „naar „t Eiland’ geweest, doch niets gevonden, op het „Plaatje’ is ook niets „te vinden. Sedert 15 Mei wordt er steeds maar één gezien, ook door den „visscher, zoodat vermoed wordt dat de andere zit te broeden. Waar hij „zit blijft echter een raadsel. Spijt mij U geen beter nieuws te kunnen „berichten”.”

„Dat broeden is natuurlijk lang niet zeker. De eenige oplossing zal „zijn om het volgend jaar met een auto alle kreken maar eens af te „werken!”

De heer DE VRIES deelt mede, dat het broedseizoen dit jaar vroeger begonnen is dan andere jaren. Reeds op 26 Maart werden te Amsterdam drie broedende houtduiven, *Columba p. palumbus* L., aangetroffen, op 14 Mei had te Ankeveen de groote karekiet, *Acrocephalus a. arundinaceus* (L.), reeds drie eieren, terwijl de zwarte stern, *Chlidonias n. niger* (L.), en de vischdief, *Sterna h. hirundo* L., aldaar reeds voltallige legfels hadden.

Tenslotte vermeldt spreker nog de vondst van een legfel van zes van de kievit, *Vanellus vanellus* (L.), en demonstreert hij een ei van de meerkoet, *Fulica a. atra* L., waarbij al het pigment naar de stompe pool verhuist is. Dit ei is afkomstig uit een 7 legfel (waarvan de andere eieren normaal waren), gevonden op het Kampereiland, op 21 April 1933, door den bewaker, en werd door TEN KATE aan spreker afgestaan.

De heer KLEIJN heeft op 20 April in de Peel bij Venraaij een roodhalsfuut, *Podiceps g. griseigena* (Bodd.), waargenomen. In deze zelfde streek broedt dit jaar de zwarte stern, *Chlidonias n. niger* (L.). Op 21 April is door hem ook een goudpluvier, *Charadrius apricarius* subsp., in de Peel gezien.

Dr MARRES doet mededeeling van de vondst van een gecombineerd legfel van de koolmees, *Parus m. major* L., en de zwarte mees, *Parus a. ater* L., van ieder 6 eieren in één nestkastje. Van de eerste kwamen 5 eieren uit en van de andere drie.

Verder deelt hij mede in het nest van een kuifmees, *Parus cristatus mitratus* Brehm, een zwarte mees, *Parus a. ater* L., dood te hebben aangetroffen. De schedel was sterk verwond. Spreker vertoont vervolgens een nest van de kleine karekiet, *Acrocephalus s. scirpaceus* (Herm.), in een rhododendron.

De heer DE VRIES zegt, dat het meermalen voorkomt, dat deze rietvogel zijn nest in struiken of heesters bouwt. Dr KOCH heeft zelfs wel een groote karekiet, *Acrocephalus a. arundinaceus* (L.), nestelende in een boom aangetroffen. Toevallig kan hij ook een nest van de kleine karekiet rond laten gaan, gebouwd in een waterwilg. Nog een ander nest vertoont spreker van dezen vogel, dat heel lang van afmeting is. Dr MARRES geeft nog op als eigenaardige plaats van nestelen van de goudvink, *Pyrrhula p. coccinea* (Gm.), de rhododendron.

Dr EYKMAN deelt mede gelezen te hebben van een praktische tijdelijke conserveeringsmethode van vogels: aan een geconcentreerde superol-oplossing wordt het drievoudige volume absolute alkohol toegevoegd. Deze vloeistof zou, indien vogels

hiermede op verschillende plaatsen van het lichaam ingespoten worden, de voorwerpen wekenlang tegen bederf vrijwaren. Wellicht een zeer doelmatige methode op expedities.

Aan de orde is thans de bespreking van het geslacht *Acrocephalus* en *Locustella*. Enkele leden hadden uitgebreid demonstratiemateriaal medegebracht. De inheemsche soorten moesten helaas vluchtig de revue passeeren omdat de tijd reeds zoover gevorderd was.

Pas tegen het middernachtelijk uur sloot de voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. EYKMAN.

Excursie naar de Ankeveensche plassen op 21 Mei 1933.

Voormiddag half negen verzamelden zich 15 leden voor het station Bussum om met 4 auto's naar de Ankeveensche plassen te rijden. Van de aanwezigen ter vergadering namen geen deel aan de excursie: de heeren Dr J. C. KOCH, M. J. TEKKE en J. G. VAN MARLE, doch de heeren A. H. SILLEM en G. KALFF, die den vorigen avond verhinderd waren, meldden zich nu als deelnemer aan de tocht aan.

Onder begunstiging van fraai zomerweer hebben de leden, verdeeld over vijf roeibootjes, onder geleide van den jachtopenziener van den heer KALFF, dien dag volop kunnen genieten van het prachtige Hollandsche waterlandschap met zijn afwisselende avifauna.

Weliswaar zijn dien dag geen bijzondere vondsten of waarnemingen gedaan, doch het is altijd weer een genot de gewone bewoners gade te slaan van het bij uitstek karakteristieke veenplassengebied.

Zooals van zelf spreekt ontbrak de snor, *Locustella l. luscinioides* (Savi), ook nu niet op het appel. Op verschillende plaatsen drong de eigenaardige langgerekte triller tot ons door en verschillende leden hebben dit vogeltje, dat zoo'n verborgen leven leidt, ook duidelijk kunnen waarnemen.