

⁵⁾ Ridder G. VAN HAVRE, Sur la migration des Grands Motteux cendrés et sur leur passage en Belgique, Le Gerfaut, 1933, p. 1—10.

⁶⁾ E. D. VAN OORT, Ornithologia Neerlandica, DL IV (waarin voor beide rassen de broedgebieden in Groenland verward worden).

⁷⁾ H. GROTE, Wanderungen und Winterquartiere der paläarktischen Zugvögel in Afrika, 1930, p. 41.

⁸⁾ J. VERWEY, Über Vorkommen und Biologie des Grönländischen Steinschmätzers in Holland, Ardea, 15, 1926, p. 74.

⁹⁾ J. C. KOCH, mededeelingen ter Clubvergadering 20 September 1930, Org. Cl. Nederl. Vogelk., 3, 1930, p. 65.

Naschrift van de Redactie.

Reeds VAN DEN BRINK vestigde (zie dit tijdschrift 2, 1929, p. 114) de aandacht op de mogelijkheid dat ook *schtiöleri* in ons land zou voorkomen. Vandaar dat de forsche vogels, door hem op Schokland waargenomen, werden benaamd: „*Oenanthe oenanthe* ?*oenanthe* (Gmel.) — Noord-westelijke tapuit”, terwijl hij iets verder schrijft: „Het is derhalve zoo goed als zeker, dat we hier met, hetzij *leucorrhoea* (Gmel.), hetzij *schtiöleri* Salomonsen te doen hadden.....”.

En TEN KATE gebruikte reeds (dit tijdschrift 3, 1931, p. 149) voor voorwerpen, die wat de maten betreft tot *leucorrhoea* behooren, de naam west-groenlandsche tapuit en bezigde die ook steeds voor positieve *leucorrhoea* exemplaren in de volgende jaargangen (4, 1931, p. 58; 5, 1932, p. 34).

Miscellanea oölogica et nidologica, IX,

DOOR

TSJEARD GS. DE VRIES.

Een merkwaardig legsel van de wilde eend.

Op 31 Maart van dit jaar werd, in de purperreigerkolonie, in het land van Vollenhove, een legsel van 7 eieren van de wilde eend, *Anas pl. platyrhynchos* L. gevonden, dat door Dr TEN KATE ter algemeene vergadering in Hulst is gedemonstreerd en zeer welwillend voor mijne collectie werd afgestaan.

De afmetingen en het gewicht der eieren, die van normale schaaltextuur zijn, bedragen resp.:

45.6 × 29.1 mm en 2555 mgr.

41.2 × 30.2 mm en 2681 mgr.

32.9 × 27.3 mm en 1766 mgr.

29.7 × 24.8 mm en 1552 mgr.

29.3 × 24.3 mm en 1307 mgr.

26.8 × 21.9 mm en 843 mgr.

28.5 × 18.7 mm en 764 mgr.

gemiddeld
33.42 × 25.2 mm
en 1638 mgr.

totaal 234.0 × 176.3 mm en 11468 mgr.

JOURDAIN geeft, P. H. II, p. 272, als minimum-afmetingen, 50.5×39.3 mm en REY, p. 645, voor het laagste gewicht, 3150 mgr.

In een enkel exemplaar zat — volgens TEN KATE, die ze prepareerde — een weinig dooier.

Ik kan niet nalaten hem, te dezer plaatse, nogmaals mijn oprechten dank te betuigen voor zijn bijzondere welwillendheid.

Nog een abnormaal groot legsel van de torenvalk.

Ook door mij werd dit voorjaar (zie hetgeen TEN KATE mededeelt op p. 55 van dit nummer) een legsel van 7 eieren van de torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L., gevonden, eveneens in een „eendenkorf”.

Op 26 April vonden we, bij het nakijken van een twintigtal broednesten voor *Anas platyrhynchos*, die aan de boomen eener friesche buitenplaats zijn opgehangen, in 5 korven torenvalk-eieren, waaronder het bovenbedoelde 7-tal, waarvan het ♀ afvloog. Bij het prepareeren bleken alle ova volkomen onbebroed.

Naar aanleiding van hetgeen JOURDAIN zegt, P. H. II, p. 123: „Eggs laid at intervals of about two days. Incubation by both sexes, but chiefly by female, beginning with first egg laid”, meen ik te moeten opmerken, dat deze bebroeding van het eerste ei af, nog nimmer door mij is waargenomen. Ik prepareerde, in den loop der jaren, een 15-tal legsels van *tinnunculus*. Steeds waren de eieren òf totaal versch òf gelijkmatig bebroed! Wel werd de oude vogel (meestal het ♀) „tusschentijds” herhaaldelijk op het nest aangetroffen, maar als het voltallige legsel werd weggenomen¹⁾, was van bebroeding nimmer sprake.

Zoo vond ik o.a. op 11 Mei 1929 twee torenvalk-eieren in zoo'n eendenkorf. Het ♀ kwam er af. Op 17/5 waren er 3 eieren, weer zat het ♀ in de korf; op 23/5 was het aantal ova tot 4 aangegroeid, werd weer het ♀ van de eieren gejaagd en toch bleken deze, hoewel ze warm aanvoelden, nog totaal onbebroed te zijn.

Tegelijk met het bovenbedoelde legsel van 7 stuks vond ik, op 26/4 in een andere eendenkorf, twee torenvalk-ova. Het ♀ zat in de korf. Op 30/4 eveneens, het aantal eieren was echter gelijk gebleven. Op 19/5 bevatte deze „korf” 5 eieren, die alle twee of drie dagen bebroed bleken te zijn.

¹⁾ Er broeden daar, op ± 25 ha, ongeveer 10 paar torenvalken, 1 à 2 paar ransuilen, één paar steenuiltjes en één paar boomvalken. Waar in de naaste omgeving ook nog geregeld 1 à 2 paar bruine kiekendieven huizen, is het, in het belang van den vogelstand, gewenscht, jaarlijks enkele broedsels van de torenvalk te verwijderen.