

Korte Mededeelingen.

Kleinste strandlooper, *Calidris temminckii* (Leisl.), bij Amsterdam.

29 Mei 3 ex. dezer soort op opgespoten terrein bij de petroleumhaven, Amsterdam. Determinatie zeer gemakkelijk.

P. G. OP DE COUL.

Late voorjaarswaarneming van de zwartgrauwe vliegenvanger, *Muscicapa h. hypoleuca* (Pall.), bij Amsterdam.

26 Mei een ♂ (trekker) bij de Hemweg te Amsterdam.

P. G. OP DE COUL.

In de lijst van de N.O.V. staat (p. 74): „tot in de tweede helft van en zelfs einde (vooral echter begin) Mei. (t. K.)

Groenlandsche tapuit, *Oenanthe oenanthe leucorrhoa* (Gm.), in het binnenland, voorjaarstrek.

Een ♂ ex. dezer soort, ontving ik uit Warga, Friesland, aldaar dood gevonden op 12 Mei in het land. De balg bevindt zich in collectie JANSEN—OP DE COUL.

Beschrijving: staart afwezig, geheele onderzijde bruin getint (ook de kin), 't sterkst ter hoogte van de krop en voorste borstgedeelte, naar beneden in intensiteit afnemend. Vleugellengte (methode Practical Handbook, dus de vleugel niet uitgerekt!) versch 101 (droog 99 mm.), tarsus 28½ mm.

P. G. OP DE COUL.

Goudvink, *Pyrrhula pyrrhula coccinea* (Gm.), geregelde broedvogel tusschen Putten en Ermelo.

Deze soort broedt sedert eenige jaren naar mijn onder-
vinding, in enkele paren, in de parkachtige bosschen tusschen
Putten en Ermelo (Veluwe). Ook dit jaar kwam ik op 21. Maart

Verder ontving ik uit Limburg twee koekoekseieren bij 2/1 kleine karekiet, een van het normale grijsgroene type, en een op lichtgrijze grond met licht grijsachtig-roodbruine vlekken (lijkt wel iets op dat van de boomleeuwerik).

W. HELLEBREKERS.

Abnormaal groote eieren van de ekster, *Pica pica* subsp.

Op 14 Mei werd een ekster op zijn nest geschoten en bleek een legsel gehad te hebben van 5 zeer lange eieren. Jammer was slechts één ei onbeschadigd: 39.3 × 22.6 mm., gewicht 600 mg. REY geeft aan als maximum 37 × 25 mm. Eieren bovendien groef gevulde als broedertype.

Vaal stormvogeltje, *Oceanodroma l. leucorrhoa* (Vieill.), in Mei.

16 Mei een ♂ dezer soort dood op het strand te Scheveningen. Balg in collectie JANSEN—OP DE COUL.

Zijn er nog andere zomer-waarnemingen bekend?

P. G. OP DE COUL.

VAN OORT (Orn. Neerl. I) schrijft: „Waarnemingen in het zomerhalfjaar aan onze kust behooren tot de uitzonderingen”.

(t. K.)

Legsel met 7 eieren van de torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L.

Op 23 Mei 1934 trof ik in de eendenkooi te Kampernieuwstad, gem. Doornspijk (Vel.), een torenvalk aan, die broedde in een eendenkorf, op z e v e n eieren. Het Pract. Handbook zegt (II, p. 123): „Usually 4—5, sometimes 6, while 7 are rare and there are records of 8 and even 9”. Zie ook dit no., p. 53.

C. G. B. TEN KATE.

Legsel met 10 eieren van de velduil, *Asio fl. flammeus* (Pont.).

Op 23 Mei 1934 werd mij door een landbouwer te Kampernieuwstad, Gem. Doornspijk (Vel.), in een weiland bij de eendenkooi, een nest van een velduil getoond met t i e n eieren. Het Pract. Handbook zegt (II, p. 87): „very variable in number, but generally ranging from 4 to 8, though 9, 10, 11, 12 and even 13 and 14 have been recorded during vole plagues”.

C. G. B. TEN KATE.

Een isabelkleurige zomertaling, *Anas querquedula* L.

Voor mijn collectie ontving ik een totaal isabelkleurige variëteit van de zomertaling, ♂ juv., gevangen te Willemsdorp, 28 Juli 1934.

C. EYKMAN.

Noordsche gele kwikstaart, *Motacilla flava thunbergi* Billberg, in Den Haag gevangen.

Voor mijn collectie ontving ik een ♂ in prachtkleed van de Noordsche gele kwikstaart, met bijna geheel grauwwarten kop (teugel en oorstreek geheel zwart); geen witte bovenoogstreep.

De kropstreek is duidelijk zwartgevekt. De vogel was op 30 Mei 1934 in Den Haag gevangen.

C. EYKMAN.

Wederom een blauw ei van de koekoek, *Cuculus c. canorus* L.

Op 13 Mei 1934 in de duinen bij Wassenaar een blauw koekoeksei bij 1/1 gekraagde roodstaart.

Verder ontving ik uit Limburg twee koekoekseieren bij 2/1 kleine karekiet, een van het normale grijsgroene type, en een op lichtgrijze grond met licht grijsachtig-roodbruine vlekken (lijkt wel iets op dat van de boomleeuwerik).

W. HELLEBREKERS.

Abnormaal groote eieren van de ekster, *Pica pica* subsp.

Op 14 Mei werd een ekster op zijn nest geschoten en bleek een legsel gehad te hebben van 5 zeer lange eieren. Jammer was slechts één ei onbeschadigd: 39.3×22.6 mm., gewicht 600 mg. REY geeft aan als maximum 37×25 mm. Eieren bovendien grof gevlekt als kraaietype.

W. HELLEBREKERS.

Abnormaal groote eieren van de torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L.

Uit Limburg ontving ik een vier-legsel, dat bij nader onderzoek zeer hoge maxima voor maten en gewichten vertoont:

	a) 43.1×31.9	1.910 gram
	b) 43.4×33.7	2.105 gram
	c) 41.9×33.4	1.995 gram
	d) 43.9×32.2	2.040 gram
	gemiddeld 43.1×32.8	2.012 gram
PELT LECHNER	gem. 38.6×30.55	1.5 gram
REY	gem. 38.8×30.6	1.555 gram
	max. $44. \times 30.$ — en $39.5 \times 33.$ —	
Pract. Handb.	gem. 39.7×31.7	
	max. 43.7×33.5 en 41.6×34.2	
KRAUSE	max. 40.8×31.7	2.045 gram max.

De eieren zijn zelfs nog groter en zwaarder dan het gemiddelde der boomvalk, b.v. REY geeft aan: 41.3×33.4 en 1.983 gram.

Vindplaats Beringe (L.), 23 Mei 1934, geheel onbebroed. Mooi legsel, drie eieren eenigszins purperachtig, waarvan dan nog één een groot gedeelte van de witte grondkleur laat zien. Hoewel de datum het niet waarschijnlijk maakt, zou m.i. de mogelijkheid dat het tóch een boomvalk is niet absoluut zijn uitgesloten¹⁾, daar dergelijke typen bij boomvalk voorkomen. Ik stel mij voor ook het oordeel van anderen nog eens in te winnen.

W. HELLEBREKERS.

¹⁾ Daarvoor is de tijd toch wel te vroeg! (DE VRIES).