

wist ik waar moest worden gezocht en in den loop der jaren verkreeg ik nog meerdere nesten en eieren van deze soort, nl.:

14-2-1929	Koeboe	1 nest met ei.	Afm. 30,2 × 21,2 mm
15-1-1930	Batoe Ampar	1 nest met ei.	Afm. 31,9 × 20,3 mm
23-1-1930	Koeboe	1 nest met ei.	Afm. 27,3 × 19,9 mm
23-1-1930	„	2 oude nesten.	
24-1-1931	„	1 nest met ei.	Afm. 31,3 × 19,1 mm
5-3-1931	„	1 nest met ei.	Afm. 28,3 × 19,5 mm
27-2-1934	Montrado	1 nest met ei.	Afm. 30,7 × 19,1 mm
29-3-1934	„	1 nest met ei.	Afm. 30,2 × 19,7 mm

Typisch afwijkend is het nest, afgebeeld op fig. 4, no. III. Zeker is het van een hoornzwaluw, dat bleek uit het embryo, dat uit het sterk bebroedde ei te voorschijn kwam, maar omtrent de soort heb ik geen zekerheid kunnen krijgen, want er komen niet minder dan 6 *Batrachostomus*-soorten in Borneo voor.

Voor deze afwijkende nestbouw heb ik na een bezoek ter plaatse slechts de volgende verklaring kunnen vinden. In de onmiddellijke nabijheid van het terrein, waar de vogel wilde nestelen, waren geen geschikte dikkere horizontale takken te vinden. Het takje was te dun om een nest van het gewone type te dragen en daarom werd vermoedelijk alleen een kommetje van donsveertjes gemaakt en dit om het takje heen gevlochten, waardoor het geheel veel steviger is geworden.

Het op fig. 4, no. II afgebeelde nest is weer van het gewone type, maar het inwendige is meer met donsveertjes bekleed.

De Dajaks gebruiken deze nesten om op etterende wonden te leggen en beschouwen ze als een uitstekend middel om infectie te voorkomen.

Het nieuwe Natuurhistorisch Museum te Rotterdam, en het tweede inlandsche exemplaar van den grooten krekeltzanger, *Locustella fl. fluviatilis* (Wolf),

DOOR

Dr C. EYKMAN.

Een dezer dagen was ik in de gelegenheid een bezoek te brengen aan het nieuwe gebouw, Mathenesserlaan 7, waarin de Natuurhistorische verzamelingen van de Museum-Vereeniging te Rotterdam sedert Juli 1935 zijn ondergebracht.

Tegenover het nieuwe museum BOYMANS staat het keurige

moderne gebouw, dat, dank zij de welwillende medewerking van het Gemeentebestuur van Rotterdam, waardoor de Museum-Vereeniging de beschikking kreeg over de schenking van wijlen Mr N. J. A. C. A. HOFFMANN, in leven wethouder van Rotterdam, eigendom is geworden van bovengenoemde vereeniging. (Het museum is voor het publiek geopend Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag van 10 tot 4 uur, entr  e 10 ct. per persoon).

Ik moet beginnen met te zeggen, dat het ruimschoots de moeite loont een paar uur in dit gebouw door te brengen om er de uitmuntend verzorgde collecties te bezichtigen. In ruime uitstekend verlichte zalen zijn de natuurhistorische preparaten in moderne glazen kasten stof- en motvrij opgeborgen. De benedenverdieping is gereserveerd voor de vogels en de eieren, terwijl de bovenverdieping wordt ingenomen door zoogdieren en de overige *Vertebrata*, en de *Arthropoda*.

De *Mammalia* en de *Aves* hadden bij mijn eerste bezoek aan het gebouw mijn bijzondere belangstelling, zoodat ik hier even bij stil wil staan.

Beide diergroepen zijn door uitsluitend inlandsche, meeren-deels goed opgezette exemplaren vertegenwoordigd. Alle voorwerpen, netjes gemonteerd op uniforme, eikenhouten voetstukjes, zijn nauwkeurig voorzien van etiketten, waarop vermeld Hollandsche- en wetenschappelijke naam, sexe, datum en vindplaats.

Wat de inlandsche zoogdieren betreft, viel mij op, dat die, welke in ons land voorkomen, al vrijwel compleet zijn, uitgezonderd natuurlijk de *Cetacea*.

Slechts een enkele *Sorex*-soort en een paar zeldzame *Microtinae* ontbreken nog. Zelfs de Nederlandsche *Chiroptera* zijn bijna alle aanwezig, geen wonder wanneer men weet, dat de conservator van het museum, de heer H. LANDSMAN, een bijzondere studie van de vleermuizen heeft gemaakt.

Ook de vogelverzameling maakt een zeer gunstigen indruk. Weliswaar ontbreken nog vele Hollandsche soorten, maar men is er toch in geslaagd in betrekkelijk korten tijd meer dan de helft van de hier te lande voorkomende species bijeen te brengen (220 soorten).

Wat mij bijzonder getroffen heeft is, dat er zoovele zeldzaamheden aanwezig zijn. Ik noem o.a.:

Soort:	Sexe:	Datum:	Vindplaats:
1. de raaf, <i>Corvus c. corax</i> L.	♀	11 Oct. 1933	Delden (O.)
2. de haakbek, <i>Pinicola e. enucleator</i> (L.)	♂	3 Mei 1931	Rotterdam
3* en 4* de witkopgors, <i>Emberiza leucocephala</i> S. G. Gm.	♂	8 Nov. 1911	Nunspeet
5* de cirlgors, <i>Emberiza cirlus</i> L.	♀	15 Nov. 1911	Nunspeet
6* de dwergooruil, <i>Otus sc. scops</i> (L.)	♂	23 April 1901	Harderwijk
7. de schreeuwarend, <i>Aquila p. pomarina</i> Brehm.	♀	8 Sept. 1890	Rotterdam
	♀	Febr. 1934	Apeldoorn

Soort:	Sexe:	Datum:	Vindplaats:
8. de ibis, <i>Plegadis f. falcinellus</i> (L.), adult	♂	21 Nov. 1909	Spijkennisse
9. de kwak, <i>Nycticorax n. nycticorax</i> (L.)	♀	Mei 1933	Rotterdam
10* de stekelstaarteend, <i>Oxyura leucocephala</i> (Scop.)	♀	Maart 1859	Nieuwerkerksche Plassen nabij Rotterdam
11. de grauwe pijlstormvogel, <i>Puffinus griseus</i> (Gm.)	♂	15 Febr. 1934	Wijk a. Zee
12. de parelduiker, <i>Colymbus a. arcticus</i> L., in volkomen klee	♂	6 Juni 1935	Wijk a. Zee
13. de groote jager, <i>Stercorarius sk. skua</i> (Brünn.)	♂	15 Dec. 1932	Castricum
14. de groote trap, <i>Otis t. tarda</i> L.	♂	Jan. 1927	Halsteren (N.Br.)

* beteekent: afkomstig van de collectie der Rotterdamsche diergaarde.

In de vitrine, waarin de *Acrocephalus*-soorten staan opgesteld, trof ik een vogel aan, geëtiketteerd: Snor, *Locustella l. luscinioides* (Savi), Gouda, 25 Augustus 1931.

Mijn eerste indruk was: voor een nachtegaalrietzanger veel te groot van afmetingen en veel te sterk gevlekt op de kropstreek. Toen de vogel op mijn verzoek uit de kast was gehaald, vielen onmiddellijk de groote witte punten aan de onderstaartdekveeren op.

Mijn diagnose stond vast: de groote krekeler, die tot nog toe slechts eenmaal in Nederland bemachtigd was, nl. 7/8 September 1924, ♂ juv., vuurtoren Ouddorp (coll. Rijksmuseum, Leiden; „Ardea”, 14, p. 73). De vogel was geleverd door een Haagschen preparateur, die het dier in verschen toestand betrokken had van een vogelvanger, die ongeveer in den zelfden tijd verschillende andere rietzanger-soorten in de omgeving van Gouda had bemachtigd, welke thans ook in het museum aanwezig zijn.

Ik heb den vogel gemeten en hem daarna als volgt beschreven: duidelijk grooter dan de snor; kop, achter- en zijhals, alle bovendeelen (tot en met den staart) en buitenzijde van den vleugel eenkleurig donker grauwbrown; kin en keel witachtig; voorhals en kropstreek op een licht grauwbrown ondergrond donker gestreept; onderborst en buik witachtig, zijkant van het lichaam grauwbrown, evenals de onderstaartdekveeren, die echter groote witachtige punten vertoonen; de derde slagpen zonder vernauwing aan de buitenvlag.

Vleugellengte: 75 (maximum voor *L. luscinioides*, opgegeven in het Practical Handbook: 71).

Snavellengte: 13.

Loopbeenlengte: 22.

DORDRECHT, November 1935.