

da in (P. H. II, p. 664) geeft, als minima 56.2×44.0 en 61.3×43.0 .
(de V.).

Roodbruin gevlekte eieren van de meerkoet, *Fulica a. atra* L.

Zoowel in zijn Opus magnum (Oöl. Neerl., II, t.o. pl. 133) als in „Versl. en Med. der Ned. Orn. Ver.”, 5, p. 62) en in het „Zeitschr. für Oölogie”, 17, p. 59, maakt van Pelt Lechner melding van een legsel van 4 meerkoeteieren, gevonden te Vlijmen 29-5-'06, met abnormaal groote, aan die van het waterhoen, *Gallinula chl. chloropus* (L.), herinnerende, bruin-roode vlekken. Eene aberratie, welke te merkwaardiger is omdat, zooals Lechner (Versl. en Med., 5, p. 62) terecht zegt „onder de vogelsoorten, „die ten opzichte harer eieren, in het bijzonder wat karakter en kleur der „teekening daarvan betreft, tot de constante behooren, vooral de „meerkoet dient genoemd te worden.”

Dr Eugène Rey, aan wien de eieren ter bezichtiging werden gezonden, schreef: „Die gesandten *atra*-Eier sind hochinteressante Stücke. Mit so „grossen und so gefärbten Flecken sind sie mir noch nicht vorgekommen.” Zelf was ik zoo fortuinlijk om, op 27-5-'11, in den „Spiegelpolder” onder Ankeveen (N.H.) een nest met 3 eieren te vinden, die met de drie grootste exemplaren van het Vlijmensche legsel vrijwel congruent zijn.

Sinds dien heb ik nimmer weer dergelijke roodbruin gevlekte *atra*-eieren onder de oogen gehad. Totdat ik, dit voorjaar, op de eierenmarkt te Leeuwarden, twee exemplaren aantrof, die, wel niet in zoo sterke mate als de brabantse en noordhollandsche legsels, beide, naast de bekende zwart-bruine stipjes en puntjes, waterhoen-achtige, roodbruine vlekking vertoonden.
(de V.).

Korte Mededeelingen

Hybride van bonte en zwarte kraai (*Corvus cornix* $\times$ *C. corone*).

Het Museum voor het Onderwijs, te 's-Gravenhage, ontving van den heer C. Bais te Wieringen een hybride van bonte en zwarte kraai. Het ex., een ♂, heeft de habitus van de zwarte kraai. Op de buik is een bonte kraaien-vlekking aanwezig, verder ontbreekt het grijs. Het voorwerp was geschoten in de Wieringermeerpolder, bij de Houkes, op 25 Maart 1938.

A. J. de Lorm.

Zie ook de „Nederl. Vogels”, p. 60.

(t. K.).

Merel, *Turdus m. merula* L., met witten halsring.

Op 28 Maart j.l., nam ik, bij Leeuwarden, een vrouwtjes-merel, *Turdus m. merula* L. met een, ongeveer $1\frac{1}{2}$ cm breedten, witten halsring waar. Op het eerste gezicht deed het beest aan een beflijster, *Turdus t. torquatus* L., denken. De ring liep echter om den g e h e e l e n hals heen. Zouden het soortgelijke exemplaren kunnen zijn, die aanleiding hebben gegeven tot de (m.i. onjuiste) verhalen over het broeden van *torquatus* in ons land?

Tsj. Gs. de Vries.

Vroeg bolderende korhanen, *Lyrurus t. tetricus* L.

Op het bouwland van „Oud-Reemst” onder Otterlo (Veluwe) waren op een der mooie voorjaarsdagen van de eerste Februari-week 1938, na een langdurige gure periode, reeds een achttal korhanen aan het bolderen. Hoewel dit nog niet zoo geprononceerd was als in April of Mei, waren de uitingen toch onmiskenbaar en moet deze tijd als uitermate vroeg gelden.

A. B. Wigman.

Vergadering te Amsterdam in „Artis”,
op 9 Januari 1938

Aanwezig van het Bestuur de heeren: Tsj. Gs. de Vries, J. G. van Marle en Dr C. Eykman; voorts de leden: Dr C. G. B. ten Kate, Dr H. W. van Rhijn, Jb. van de Peppel, Ir H. Adams, F. J. Kuiper, M. Dijkstra, P. L. Steenhuizen, M. G. van Boorn, J. N. vanden Brink, Dr A. A. J. H. Marres, M. J. Tekke, J. P. Bouma, Dr J. C. Koch, W. Hellebrekers, G. A. L. Bisseling, Dr J. R. H. Schaank, Jhr H. van Lennep, G. J. M. de Greef, A. B. Wigman en Dr D. Mac Gillavry. Als introducee de heer F. Niesen.

Afwezig met kennisgeving de heeren: P. A. Hens, Jhr Dr Ir F. C. van Heurn, J. P. Strijbos en A. J. de Lorm.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den heer Tsj. de Vries.

Deze opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De Secretaris leest de notulen voor, die goedgekeurd worden.

Door het Bestuur zijn twee nieuwe leden candidaat gesteld, nl. de heer N. W. Pel te Den Haag (voorgedragen door den heer de Lorm) en de heer F. Niesen te Haarlem (voorgedragen door den heer Strijbos). Beide kandidaten worden met algemeene stemmen benoemd tot lid van de Club.

Besloten wordt de voorjaarsexcursie te houden op Zondag 22 Mei in Friesland, in de kuststrook van Makkum tot Gaasterland. Den vorigen avond zal in Hotel Rijs, Gaasterland, worden vergaderd.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer Koch demonstreert een isabella-verkleurde huid van een vink, *Fringilla coelebs*, vervolgens een nieuw nederlandsch ex. van een ♂ dwerggors, *Emberiza pusilla* L. en tenslotte de huid van een ♀ juv. van de „rosse gors”, *Emberiza rutila* Pall., najaar 1937 te Wassenaar gevangen en ter vergelijking nog huiden van een ♂ ad. en een ♀ ad. dezer soort uit het Leidsch museum, alsmede van een wilgengors, *Emberiza a. aureola* Pall., waarmede het vertoonde ex. eenige gelijkenis vertoont (zie verder p. 1). Voorts merkte spreker op, dat er aan het ringstation Wassenaar in den afgeloopen herfst een overvloedige doortrek van blauwe kuikendieven,