

Vroeg bolderende korhanen, *Lyrurus t. tetricus* L.

Op het bouwland van „Oud-Reemst” onder Otterlo (Veluwe) waren op een der mooie voorjaarsdagen van de eerste Februari-week 1938, na een langdurige gure periode, reeds een achttal korhanen aan het bolderen. Hoewel dit nog niet zoo geprononceerd was als in April of Mei, waren de uitingen toch onmiskenbaar en moet deze tijd als uitermate vroeg gelden.

A. B. Wigman.

Vergadering te Amsterdam in „Artis”,
op 9 Januari 1938

Aanwezig van het Bestuur de heeren: Tsj. Gs. de Vries, J. G. van Marle en Dr C. Eykman; voorts de leden: Dr C. G. B. ten Kate, Dr H. W. van Rhijn, Jb. van de Peppel, Ir H. Adams, F. J. Kuiper, M. Dijkstra, P. L. Steenhuizen, M. G. van Boorn, J. N. vanden Brink, Dr A. A. J. H. Marres, M. J. Tekke, J. P. Bouma, Dr J. C. Koch, W. Hellebrekers, G. A. L. Bisseling, Dr J. R. H. Schaank, Jhr H. van Lennep, G. J. M. de Greef, A. B. Wigman en Dr D. Mac Gillavry. Als introducee de heer F. Niesen.

Afwezig met kennisgeving de heeren: P. A. Hens, Jhr Dr Ir F. C. van Heurn, J. P. Strijbos en A. J. de Lorm.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den heer Tsj. de Vries.

Deze opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De Secretaris leest de notulen voor, die goedgekeurd worden.

Door het Bestuur zijn twee nieuwe leden candidaat gesteld, nl. de heer N. W. Pel te Den Haag (voorgedragen door den heer de Lorm) en de heer F. Niesen te Haarlem (voorgedragen door den heer Strijbos). Beide candidaten worden met algemeene stemmen benoemd tot lid van de Club.

Besloten wordt de voorjaarsexcursie te houden op Zondag 22 Mei in Friesland, in de kuststrook van Makkum tot Gaasterland. Den vorigen avond zal in Hotel Rijs, Gaasterland, worden vergaderd.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer Koch demonstreert een isabella-verkleurde huid van een vink, *Fringilla coelebs*, vervolgens een nieuw nederlandsch ex. van een ♂ dwerggors, *Emberiza pusilla* L. en tenslotte de huid van een ♀ juv. van de „rosse gors”, *Emberiza rutila* Pall., najaar 1937 te Wassenaar gevangen en ter vergelijking nog huiden van een ♂ ad. en een ♀ ad. dezer soort uit het Leidsch museum, alsmede van een wilgengors, *Emberiza a. aureola* Pall., waarmede het vertoonde ex. eenige gelijkenis vertoont (zie verder p. 1). Voorts merkte spreker op, dat er aan het ringstation Wassenaar in den afgeloopen herfst een overvloedige doortrek van blauwe kuikendieven,

Circus c. cyaneus (L.), is waargenomen, die sterk het karakter van een invasie aannam.

De heer Steenhuisen laat een huid rondgaan van de Z.-Amerikaansche Incastern, een groote zwarte stern met lange witte baardveeren, die eenige weken in Artis geleefd heeft en daar een dezer dagen was gestorven. De heer Kuiper demonstreert een 10-legsel van een kwartel van Biliton, *Excalfactoria chinensis palmeri*. De verschillend gekleurde eieren alsmede het groote aantal doen vermoeden, dat het aan twee ♀♀ heeft toebehoord.

De heer ten Kate heeft deze week een ♂ baardmees, *Panurus b. biarmicus* (L.), zonder staart uit IJselmuiden bij Kampen ontvangen, aange troffen in het bezit van een aldaar geschoten torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L.

De heer van de Peppel zag op 5 December te Wageningen nog een ooievaar, *Ciconia c. ciconia* (L.).

De heer Wigman zegt, dat ook op het kasteel Amerongen dezen winter een ooievaar is overgebleven.

De heer Dijkstra heeft in de Haarlemmerhout een bijna zuivere albino merel, *Turdus merula*, waargenomen.

De heer van den Brink vestigt de aandacht op de Staatscourant, waarin alle vogelvangers vermeld staan en oppert de wenschelijkheid deze menschen aan te moedigen om wanneer ze ringen aantreffen, deze naar het betreffende station op te zenden, waarop de heer Koch aanbiedt, dat het ringstation Wassenaar zich hiermede zal belasten. Voorts vertelt spreker van uit het nest gevallen jongen van tortelduiven, *Streptopelia t. turtur* (L.), die na plaatsing in het nest door de ouden verder werden opgevoed.

De heer Mac Gillavry vraagt of de ornithologen gebruik maken van kleurentabellen. Een zeer goede tabel met 700 kleuren van Chevalier wordt tegenwoordig voor f 5.— in den handel gebracht.

De heer Bisseling heeft een paar weken geleden een buizerd, *Buteo buteo*, uit Leidschendam ontvangen, die door den trein was doodgereden en op een treeplank was geworpen. In krop en maag bevonden zich o.a. 8 kikvorschen, een vreemde prooi voor den tijd van het jaar.

Den heer Schaank is het opgevallen, dat de zwanen, *Cygnus* sp., dit jaar zoo laat en slechts in klein aantal aan den Noord-Hollandschen oever van het IJsselmeer zijn aangekomen; pas in het begin van Januari zag hij de eerste. Daarentegen merkt de heer de Vries op, dat ze aan de friesche kust bij duizenden zijn waargenomen.

De heer de Greef heeft op 20 October van vrij dichtbij een griel, *Burhinus o. oedicnemus* (L.), op het strand te Veere geobserveerd.

De heer van Marle ontving half December een vaal stormvogeltje, *Oceanodroma l. leucorrhoa* (Vieill.), van het lichtschip Maas en in het na jaar twee poelsnippen, *Capella media* (Lath.), uit Friesland.

De heer de Vries vestigt er de aandacht op, dat door het verzoeten van de voormalige Zuiderzee langzamerhand in het IJsselmeer een wijziging in de avifauna ontstaat; vooral is dit merkbaar aan sommige eenden-

soorten, die bij tienduizenden het IJsselmeer bevolken en zich daar o.a. te goed doen aan de beruchte muggenlarven *). Nadat spreker namens den heer v a n H e u r n, in verband met het geïllustreerde artikel van den heer H o o g e r w e r f in het laatste no. van „Limosa”, een huid van de witte ibis, *Threskiornis aethiopicus melanocephalus*, had laten rondgaan, sloot de voorzitter te ongeveer 5 uur de vergadering.

De Secretaris, C. E y k m a n.

Literatuur

F. N. Chasen, The Birds of Billiton. Treubia, 16, afl. 2, December 1937, p. 205—238.

Hoe veel er nog te bewerken is op het gebied der systematiek en verbreiding der vogels van onze Oost blijkt weer duidelijk uit deze lijst van Billiton-vogels van de hand van den directeur van het Raffles Museum te Singapore. De heer Chasen stelde deze systematische lijst samen aan de hand van een collectie huiden, door den heer F. J. Kuiper in de jaren 1935—1937 op Billiton samengebracht en hem voor dit doel ter inzage gegeven door het Museum te Buitenzorg, een collectie waarop het Museum trotsch en den heer Kuiper dankbaar mag wezen!

Vorderman beschreef in 1891 91 soorten, Bodenkloss vermeerderde deze lijst met 6 (1931). Chasen brengt thans dit getal op 167, waaronder eenige van een paar eilandjes voor de kust van Billiton. Een deel van dit materiaal is reeds in Chasen's „Handlist of Malaysian Birds” verwerkt.

Zes nieuwe vormen worden op grond van de collectie Kuiper beschreven, terwijl vijf vormen aangeduid worden als nieuw, doch bevestiging door meer uitgebreid materiaal behoeven.

Van de 167 soorten zijn 40 trekvogels, strand- en zeevogels. 82 soorten komen voor op Sumatra en Borneo, 23 op Sumatra en niet op Borneo, 4 op Borneo en niet op Sumatra, 3 op de eilanden tusschen Sumatra en Borneo doch niet op deze twee eilanden, terwijl 8 vormen endemisch zijn. Nieuw beschreven zijn: *Turnix suscitator kuiperi*, *Phodilus badius parvus*, *Chloropsis cochinchinensis billitonis* en *Macronus ptilosus sordidus*, terwijl in Chasen's Handlist reeds uit Kuiper's collectie beschreven werden *Chotorea rafflesii billitonis* en *Eurylaimus javanicus billitonis*.

van Marle.

F. N. Chasen, Vier neue Vogelrassen aus Malaysia. Orn. Monatsber., 46, p. 5—8.

Beschreven worden *Charadrius alexandrinus javanicus* subsp. nova. op grond van eenige huiden, door de heeren Hoogerwerf en Bouma

*) Zie ook „De Vogels van het Zuiderzeegebied”, p. 65 en 1e Aanvulling, Januari 1938 en in het bijzonder „Meded. Club v. Zuiderzeewaarnemers”, 23, Dec. 1937, p. 3—5, waarin uitvoerige gegevens zijn opgenomen van L. Tinbergen, betrekking hebbende op de Veluwekust bij Hoophuizen, tusschen Harderwijk en Nunspeet. (t. K.).