

De heer H o o g l a n d zag op 6 en 7 Mei nog ongeveer 50 kramsvogels, *Turdus pilaris* L., te Zeddam en op 13 Mei nog 4 stuks.

De heer d e G r e e f toont het ei van een waterral, *Rallus a. aquaticus* L., uit een legsel van 8, gevonden in een gevlochten nest op de schorren van het Sloe (dus bij brak water) temidden van een kokmeeuwenkolonie. Ook de dwergstern, *Sterna a. albifrons* Pall., nestelt op deze schorren. Op 16 Mei werd op een buitenplaats bij Koudekerke nog een houtsnip, *Scolopax r. rusticola* L., gezien.

De heer v a n d e n B r i n k zag op 20 Mei bij den afsluitdijk 17 futen, *Podiceps c. cristatus* L., vermoedelijk op laten trek. Op 23 Maart werd in Zuid-Limburg bij Elsloo een zanglijster, *Turdus e. ericetorum* Turton, broedende aangetroffen, die het vorige jaar bij Werkhoven als jonge vogel was geringd. Op 15 Maart was de groote lijster, *Turdus v. viscivorus* L., reeds begonnen met leggen en op 17 Maart reeds de holenduif, *Columba oenas* L. De heer K o c h laat het nest rondgaan van een goudhaantje, *Regulus r. regulus* (L.), met 9 eieren, gevonden te Wolfheze op 18 Mei j.l. Het lag op 9 m hoogte in een spar. Daarna toont hij het nest van een goudvink, *Pyrrhula pyrrhula coccinea* (Gm.), met 5 eieren, gevonden te Keppel, 14 Mei 1938. Spreker demonstreert vervolgens een steppenhoen, *Syrhaptes paradoxus* (Pall.), uit de coll. Eduard B l a u w; volgens hem een authentiek exemplaar uit de omgeving van Lisse (omstreeks 1860). Op 6 Mei werd bij Zwammerdam een vischarend, *Pandion h. haliaetus* L., gezien.

Nadat de heer K l e i j n mededeeling had gedaan van het voorkomen van de zwarte specht, *Dryocopus m. martius* (L.), bij Heeze (N.Br.), sloot de voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. E y k m a n.

## Excursie op 22 Mei 1938 in Gaasterland.

Behalve door de leden, die den vorigen avond ter vergadering aanwezig waren, werd aan deze excursie deelgenomen door het lid, den heer F. J. K u i p e r en diens introduc  , den heer W. J. v. d. V e g t e.

De ochtend werd besteed om een bezoek te brengen aan de Mokkebank bij Laaxum. Op weg daarheen werden op de weilanden en in de slooten de gewone watervogels waargenomen, zooals scholekster, *Haematopus ostralegus*, kieviten, *Vanellus vanellus*, tureluurs, *Tringa totanus*, grutto's, *Limosa limosa*, waterhoentjes, *Gallinula chloropus*, en meerkoeten, *Fulica atra*.

Langs den oever van het IJselmeer werden kemphanen, *Philomachus pugnax*, in bruidstooi gezien, voorts kluiten, *Recurvirostra avosetta*, en bergeenden, *Tadorna tadorna*, benevens een enkele zilverpluvier, *Squatarola squatarola*, zwarte ruiter, *Tringa erythropus*, en rosse grutto, *Limosa lapponica* (de laatste drie in prachtkleed). In het IJselmeer zwommen wilde eenden, *Anas platyrhynchos*, en verschillende duikeenden, in hoofdzaak kuifeenden, *Nyroca fuligula*, terwijl de lucht vervuld was van het

gekrijsch van kapmeeuwen, *Larus ridibundus*, vischdiefjes, *Sterna hirundo*, en groote sterns, *Sterna sandvicensis*, welke vogels in grooten getale naast kluiten, *Recurvirostra avosetta*, en andere waders op de zandplaat „de Mokkebank” broedden. Jammer, dat de deelnemers niet in de gelegenheid waren de honderden nesten daar ter plaatse in oogenschouw te nemen. Met den kijker konden echter de vogels goed broedende worden waargenomen. Ook konden we zien, dat duizenden bonte strandloopers, *Calidris alpina*, de plaat als rustplaats hadden uitverkoren. Na geruimen tijd op dit vogelrijke terrein te hebben doorgebracht, werden de auto's weder opgezocht om een bezoek te gaan brengen aan het Mirdummer klif, waar aan de lijst der waargenomen vogels nog werden toegevoegd twee troepjes regenwulpen, *Numenius phaeopus* (resp. 5 en 3 stuks), enkele lepelaars, *Platalea leucorodia*, vliegende boven het IJsselmeer en een paar oeverzwaluwen, *Riparia riparia*, die hun nesten hadden in de steile afgraving van het klif.

In tegenstelling met den voormiddag, die gewijd was aan de watervogels, werd de namiddag doorgebracht temidden van de boschvogels. Het Rijsterbosch bood alles wat in naald- en loofhout verwacht kan worden. We hoorden er den zang van wielewaal, *Oriolus oriolus*, fluiter, *Phylloscopus sibilatrix*, grasmusch, *Sylvia communis*, zwartkop, *Sylvia atricapilla*, spotvogel, *Hippolais icterina*, tuinfluiter, *Sylvia borin*, gekraagde roodstaart, *Phoenicurus phoenicurus*, merel, *Turdus merula*, zanglijster, *Turdus ericetorum*, nachtegaal, *Luscinia megarhyncha*, roodborstje, *Erithacus rubecula*, fitis, *Phylloscopus trochilus*, tijftjaf, *Phylloscopus collybita*, benevens de roep van de koekoek, *Cuculus canorus*, het snorren van de bonte specht, *Dryobates major*, het koeren van houtduiven, *Columba palumbus*, en tortels, *Streptopelia turtur* en het kraaien van den fazantenhaan, *Phasianus colchicus*. Hoog in de lucht zweefde een paar buizerden, *Buteo buteo*; torenvalken, *Falco tinnunculus*, waren bezig in een verlaten kraaiennest hun jongen te verzorgen en uit de aanwezigheid van een paartje boomvalken, *Falco subbuteo*, kon worden afgeleid, dat ook deze roofvogels hun nest in het bosch hadden. Geruimen tijd werd doorgebracht in een kolonie van blauwe reigers, *Ardea cinerea*, en in een ander gedeelte van het bosch temidden van aalscholvers, *Phalacrocorax carbo*, die in grooten getale hun nesten in de kruinen der dennen hadden gebouwd. Zoowel de eerste als de laatste hadden reeds bijna volwassen jongen.

Een vreemde gewaarwording, toen we aan het einde van een boschpad plotseling voor de zee stonden, waar weer de vogels te zien waren, met welke wij in den voormiddag kennis hadden gemaakt.

Te ongeveer 5 uur eindigde de excursie en gingen de deelnemers uiteen, voldaan over hetgeen ze op dien mooien lentedag in het vogelrijke Zuidwesten van Friesland hadden genoten.

De Secretaris, C. E y k m a n.