

Nadat de aanvang van de excursie op 9 uur gesteld was, sloot de waarnemend-voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. Eijkman.

Excursie op de „Buunderkamp”, 25 Mei 1941.

De meteorologische toestand in de nacht en vroege morgenuren beloofde niet veel goeds, doch tegen half tien klaarde de lucht op en kon een droge excursie van ruim 3½ uur gemaakt worden. Onder leiding van den heer Evers werd een wandeling gemaakt langs diverse nestkastjes in de onmiddellijke omgeving naar het Natuurbosch, de Mechelsche put en de beek, alwaar een bodemnest van de merel (*Turdus merula*) werd aangetroffen. De te verwachten mezen, zoals kool-, pimpel-, zwarte- en kuifmees gedeeltelijk met eieren, doch hoofdzakelijk met jongen, konden worden waargenomen, evenals de holenduif (*Columba oenas*), doch de grote bonte specht (*Dryobates major*) liet zich niet zien, hoewel de boomholte zeer waarschijnlijk toch bewoond was. Een paar leden ontdekten nog een matkopmees (*Parus atricapillus*) met jongen en namen de zwarte specht (*Dryocopus martius*) en buizerd (*Buteo buteo*) waar.

Na de wederom zeer geanimeerde middagmaaltijd vonden enkele leden nog in de omgeving van het huis nesten van de vink (*Fringilla coelebs*) met resp. twee eieren en één ei en drie jongen, braamsluiper (*Sylvia curruca*) met drie, tuinfluiter (*Sylvia borin*) met één ei en een nieuw nest van de staartmees (*Aegithalos caudatus*).

W. Hellebrekers.

Vergadering te Amsterdam in het Paleis-Hotel, op 5 October 1941.

Aanwezig van het Bestuur de heeren Tsj. Gs. de Vries, Dr C. Eijkman, J. G. van Marle, Dr C. G. B. ten Kate en Jhr Dr Ir F. C. van Heurn; voorts de leden: Dr A. A. J. H. Marres, C. J. Margrij, S. Sixma baron van Heemstra, W. F. Sillem, Dr A. Scheygrond, F. Niesen, M. H. Kleyn, W. J. Resoort, A. F. W. van Blijenburg, C. J. Verhey, L. J. Kleyn, Mr E. D. Maaldrink, Mr M. Mees, Jb. van de Peppel, A. H. Sillem, E. Evers, Dr G. C. A. Junge, M. J. Tekke, Dr H. W. van Rhijn, H. Ruiter, A. B. Wigman, W. Hellebrekers, J. F. M. van Malssen, Dr J. R. H. Schaank, A. Moolenburgh, J. P. Bouma, J. P. Strijbos, G. A. L. Bisseling, J. A. Sillem en Dr D. Mac Gillavry. Als introduc  de heeren: L. F. Kleyn en A. van der Most van Spijk.

Afwezig met kennisgeving de heeren: P. A. Hens, Jhr W. C. van Heurn, G. J. M. de Greef en Jhr W. H. de Beaufort.

Wegens afwezigheid van den heer H e n s wordt het voorzitterschap waargenomen door den heer d e V r i e s.

Deze opent de vergadering om 1 uur en heet alle aanwezigen welkom. De Secretaris leest de notulen der vorige vergadering voor, die worden gearresteerd.

Tot nieuwe leden worden met algemeene stemmen benoemd de heeren L. F. K l e y n, W. Pyrmontkade 25, den Haag (voorgesteld door den heer M. H. K l e y n) en A. v a n d e r M o s t v a n S p i j k, B. van Hovenstraat 13, Haarlem (voorgesteld door den heer S t r i j b o s).

De heer v a n M a l s s e n krijgt gelegenheid enige wens en geuit in een ingekomen schrijven, nader toe te lichten. Ter vergadering bleek, dat niemand voor dergelijke maatregelen of moties termen aanwezig achtte.

W e t e n s c h a p p e l i j k e m e d e d e e l i n g e n :

Den heer t e n K a t e is het opgevallen, dat op de Noord-Veluwe dit najaar opvallend veel vlaamsche gaaien (*Garrulus glandarius*) voorkomen. Vele andere leden zeggen dit ook voor andere deelen des lands te kunnen bevestigen. Er is dus weer sprake van een invasie (zie verder p. 119).

De heer S c h a a n k vond op 11 Juli een doode kruisbek (*Loxia curvirostra*). Op 9 Augustus nam hij in de Ooy bij Nijmegen een woudaapje (*Ixobrychus minutus*) waar en dit jaar heeft op een eilandje van het sanatorium te Bloemendaal een vischdief (*Sterna hirundo*) gebroed.

Den heer H e l l e b r e k e r s is het opgevallen, dat in de Wassenaarsche duinen tegenwoordig bijna geen boomleeuweriken (*Lullula arborea*) en groote lijsters (*Turdus viscivorus*) meer voorkomen. Ook de tapuiten (*Oenanthe oenanthe*) en gekraagde roodstaarten (*Phoenicurus phoenicurus*) zijn sterk afgenomen. De sprinkhaanrietzanger (*Locustella naevia*) daarentegen is er veel talrijker dan voorheen, evenals de grauwe klauwier (*Lanius collurio*). Een nest van deze laatste, aldaar gevonden, wordt rondgegeven, de eieren vertoonen een opvallend lichte grondkleur (zie p. 127).

Op 7 Juni nam spreker op het Waschmeer opvallend veel eenden waar, waaronder tafeleenden (*Aythya ferina*), kuifeenden (*Aythya fuligula*) en slobbeenden (*Spatula clypeata*). De geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*) werd er ook in meerdere exemplaren waargenomen; iemand had er zelfs 17 op één ochtend geteld. Bij het onderzoeken van een Eiercollectie van het Leidsch museum uit vroegere tijden trof hij een legsel aan van het kleinste waterhoen (*Porzana pusilla*) van 24 Juni 1909 uit Vlijmen, terwijl verder een 4-legsel van de raaf (*Corvus corax*) uit Roosendaal zijn aandacht trok. De heer W i g m a n zegt, dat op het Loo bij Apeldoorn de wespindief (*Pernis apivorus*) heeft gebroed (zie verder p. 123). Ook is de zeearend (*Haliaeetus albicilla*) op de „Hoge Veluwe” weer present (zie p. 122). In het Otterlosche zand vond spreker op 3 September een doode fuut (*Podiceps cristatus*) (zie p. 125).

De heer R u i t e r vertoont weer een nest van de tortel (*Streptopelia turtur*), samengesteld uit ijzerdraad, dit is reeds het derde nest uit dezelfde omgeving. (In verband hiermede vertelt S t r i j b o s van een nest van de bonte kraai (*Corvus cornix*), vervaardigd uit brilmonturen). Spreker deelt vervolgens een broedgeval mede, bij Alblasterdam, van de kuifeend

(*Aythya fuligula*) (zie verder p. 124) en vermeldt een laat boschuilbroedsel (*Strix aluco*) (zie verder p. 130), alsmede het broeden van de groene specht (*Picus viridis*) te Lekkerkerk (zie verder p. 122).

De heer J u n g e vermeldt de ontvangst door het Leidsch museum van een Noordsche pijlstormvogel (*Puffinus puffinus*) (zie p. 125).

De heer v a n R h i j n vertelt van een aanval in zijn tuin van boerenzwaluwen (*Hirundo rustica*) op een koninginnevvlucht van de kleine zwarte mier.

De heer v a n d e P e p p e l deelt namens den heer Hoogland te Zeddam de terugvangst mede van een in ons land geringde buizerd (*Buteo buteo*) uit Denemarken. Verder vertelt hij van drie haviknesten (*Accipiter gentilis*) boven elkaar in een boom, waarvan het bovenste jongen bevatte, in het middelste lagen eieren, terwijl het onderste leeg was. Spreker vertoont tenslotte fraaie opnamen van grauwe klauwier (*Lanius collurio*), spotvogel (*Hippolais icterina*) en grote bonte specht (*Dryobates major*).

De heer L. K l e y n zegt, dat in het laatst van September op de vinkenbaan te Monster reeds 283 vogels geringd waren, waaronder de vorige week reeds 53 sijsjes (*Carduelis spinus*). Spreker demonstreert een blauw koekoeksei (*Cuculus canorus*) bij een kneu (*Carduelis cannabina*). Vervolgens gewaagt hij van een vruchtbare kwikstaart (*Motacilla alba*), die van 13 Juni tot 19 Juli achtereenvolgens 8, 12, 10 en 5 eieren legde (de heer Bisseling heeft bij een zelfden vogel na elkander 4, 5, 6 en 6 eieren aangetroffen). De groote legsels van 12 en 10 zijn ongetwijfeld van 2 ♀♀ afkomstig.

De heer V e r h e y heeft in de Wassenaarsche duinen 2 grielen (*Burhinus oediconemus*) gezien. In het park te Dordrecht heeft dit jaar een boschuil (*Strix aluco*) gebroed, de jonge vogels zijn door hem waargenomen.

De heer R e s o o r t zegt, dat dit voorjaar de kuifeend (*Aythya fuligula*) in het Waschmeer gebroed heeft.

De heer v a n d e r M o s t v a n S p i j k heeft een zwarte stern (*Chlidonias niger*) een van de eieren uit het nest zien wegdragen om op het overgebleven ei te gaan broeden. Op 9 September nam hij op het Marsdiep een middelste jager (*Stercorarius pomarinus*) waar.

De heer N i e s e n meent dit najaar bij Spaarndam een poelsnip (*Capella media*) te hebben gezien, afgaande op de grootte, het wit in de buitenstaartpennen en het ontbreken van een zig-zag vlucht.

De heer S c h e y g r o n d zegt, dat de woudaapjes (*Ixobrychus minutus*) te Reeuwijk thans zeer talrijk zijn. Begin September heeft hij er een dood porceleinhoentje (*Porzana porzana*) gevonden. Vervolgens spreekt hij zijn waardeering uit over het boek „de Nederlandsche vogels” en wenscht auteurs en uitgever geluk met de uitgave.

De heer W. S i l l e m heeft aan de Lingedijk bij Leerdam een paar zeer makke woudaapjes (*Ixobrychus minutus*) waargenomen.

De heer v a n H e e m s t r a vertelt van een ooievaar (*Ciconia ciconia*) in Friesland, die een ziek jong uit het nest wierp. Later zag men de gezonde jongen met de verstoeteling samenloopen en toen werd deze weer in genade aangenomen en door de ouden gevoerd.