

Korte mededeelingen.

Lang voortleven van embryo's na staking van de bebroeding der eieren.

Op 7 Mei 1942 bevatte een nest van de strandpluvier (*Charadrius alexandrinus*) op het Kampereiland 3 eieren; op 31 Mei was het verlaten. Eerst op 7 Juni, dus minstens een maand na het voltallig zijn, verwijderde ik de eieren, die ik, in watten verpakt, meenam en op 8 Juni, toen het eerstgelegde ei dus al minstens 34 dagen oud was, opende. Tot mijn verbazing gaven de vrij ver ontwikkelde embryo's nog duidelijke tekenen van leven.

Een nest van de kleine pluvier (*Charadrius dubius*) op hetzelfde terrein had op 3 Mei 3 eieren, die op 24 Mei koud waren. Op 7 Juni nam ik ook uit dit nest de 2 nog overgebleven eieren, op dezelfde wijze verpakt, mede. Toen ik deze op 8 Juni eveneens opende — dus in ieder geval 36 dagen na het leggen — toonde ook het embryo in een van deze twee eieren (het andere was schier) nog geringe levenstekenen! In alle vier gevallen roken de eieren dan ook nog volkomen fris.

C. G. B. ten Kate.

Naar muizen stootende sperwer (*Accipiter nisus*).

Op 28 Januari 1942 werd te Sibbe een graanmijt geruimd, waardoor veel muizen voor den dag kwamen. Een sperwer trachtte vlak bij de werklieden muizen te vangen; stiet er herhaaldelijk naar, doch zonder resultaat. Dit werd mij medegedeeld door P. van Pie, veldwachter aldaar, die de soort zeer goed kent en niet verwisselt met de torenvalk.

P. A. Hens.

Musschenvangende zilvermeeuw (*Larus argentatus*).

Op 20 Januari 1942, zag ik, te Leeuwarden in het „Nieuwe kanaal”, waarin wel veel ijsschotsen drevén, maar dat, door het warme afvalwater der daar gevestigde fabrieken niet dicht vroom, hoe een zilvermeeuw op een der schotsen neerstreek, een, zich eveneens op die schots bevindende musch greep, het diertje, door het onder water te houden, verdronk en het daarop verslond.

Tsj. Gs. de Vries.

Vastbroedende grutto's (*Limosa limosa*).

In aansluiting op mijn desbetreffende mededelingen in dit tijdschrift (3, 1930, p. 107—108) zij hier vermeld, dat ik met den bewaker van het Kampereiland op 26 April van dit jaar (1942) een grutto aantrof, die zich van het nest liet pakken, kon worden geringd en weer op de eieren kon worden gezet zonder de geringste poging te doen het nest te verlaten, ook niet toen wij opstonden en kalm weglieden.

C. G. B. ten Kate.

Paringsroep van de boschuil (*Strix aluco*).

In The Handbook of British Birds, II, p. 339, wordt bij de behandeling van het stemgeluid van de boschuil o.a. vermeld, dat duetten tusschen het ♂ en het ♀, waarbij eerstgenoemde zijn huilend geluid laat hooren en

laatstgenoemde antwoordt met „kiwick” en variaties daarop, plaatshebben in het v o o r j a a r.

Dit is wel de regel, doch ook in het begin van het najaar schijnen zulke duetten voor te komen.

In den maannacht (1.kw.) van 2 op 3 September 1942 voerde een paar dezer uilen zulk een duet uit vlak bij mijn huis te Valkenburg-Houthem. Het ♀ zat boven op een schoorsteen van het huis van mijn oostelijken buurman, vol beschenen door de maan. De vogel riep „kieuw, kieuw”. Haar partner antwoordde telkens uit een boom in mijn tuin op ± 15 m afstand. Deze, m.i. het ♂, liet een veel zwaarder en rauwer „kieuw” hooren, telkens afgewisseld door het melodieuze „hoe, hoe... hoehoe hoe” (opgaande en dalende toon) en een schreeuw ongeveer als „kwèèè”. Dit duet duurde ongeveer een minuut.

P. A. H e n s.

Afwijkende methode van voedselzoeken bij kapmeeuwen (*Larus ridibundus*).

Op 4 November 1942 merkte ik bij het poldergemaal „Grootslag” ten W van Broekerhaven een 300-tal kapmeeuwen op, die op vreemde manier aan het voedselzoeken waren. Onophoudelijk doken ze van 1—1½ m hoogte het fel stromende water in, dat door het gemaal op het IJsselmeer werd uitgeslagen. Vaak verdwenen ze geheel onder water, meestal echter waren nog de witte vleugeluiteinden zichtbaar. De buit bestond uit kleine visjes, zeer waarschijnlijk driedoornige stekelbaarsjes (*Gasterosteus aculeatus*), die door het water werden meegesleurd.

A. L. J. v a n I J z e n d o o r n.

Over dit onderduiken door kapmeeuwen is reeds enige malen in ons tijdschrift geschreven: in 1927 door S n o u c k a e r t, die dit waarnam bij Montreux (Jaarbericht, 17, p. 75—77); in 1928 door ondergetekende naar aanleiding van soortgelijke waarnemingen bij Kampen (ibidem, p. 118—119) en in dat zelfde jaar wees S n o u c k a e r t er op, dat prof. P o n c y te Genève dit reeds in 1925 had geconstateerd (ibidem, p. 166). Overigens vermeldde ook C o w a r d (The Birds of the British Isles and their Eggs, 2e dr., 1922) het verschijnsel reeds en citeerde S n o u c k a e r t een waarneming van gedeeltelijk onderduiken, gepubliceerd in „British Birds”, van 1915.

(t. K.).

De kauw (*Coloeus monedula*) en de eikenbladrollerplaag.

Op 7 Juni 1942 zag ik in het park „Rooswijck” in de gemeente Velsen een 7-tal kauwtjes bezig met het verorberen van de rupsjes van de dit jaar zo talrijke eikenbladroller (*Tortrix viridana*). De kauwtjes, die hier al sinds jaren in holle beuken broeden, zochten hoofdzakelijk de toppen der bomen af.

A. L. J. v a n I J z e n d o o r n.

Afwijkend geteekende merel (*Turdus merula*).

Op 20 October 1942 ontving ik een ad. ♂ van de merel, dat aan beide zijden van de kop een witte vlek vertoonde; de veeren, die de oopeningen bedekken, waren volkomen wit. In het geheele vederkleed waren verder geen witte veeren te zien, behalve een groepje donsachtige veeren bij de anus.

G. A. L. Bisseling.

Albinistische spreeuw (*Sturnus vulgaris*).

Op 27 September 1942 zag ik een volkomen witte spreeuw, voedselzoekend op buitendijks land te Scharwoude. Alle veren waren geheel wit; een zeer licht bruin waas lag over de schouderveren. Poten normaal roodbruin, snavel normaal donkerbruin, iris donkerbruin.

A. L. J. van IJzendoorn.

Vergadering te Heeze (bij Eindhoven) in Hotel
„Barendsma”, op 16 Mei 1942.

Aanwezig van het Bestuur de heeren: Tsj. Gs. de Vries, Dr C. Eijkman, J. G. van Marle en Dr C. G. B. ten Kate; voorts de leden: W. Hellebrekers, J. N. van den Brink, M. J. Tekke, W. F. Sillem, J. A. Sillem, Mr M. Mees, Dr J. R. H. Schaank, K. Waldeck, M. H. Kleyn, L. F. Kleyn, L. J. Kleyn, J. P. Bouma, A. van Bleijenburgh, W. F. Hofstede, H. Ruitter, Dr H. W. van Rhijn, Dr A. A. J. H. Marres, E. Evers, F. G. J. Boer, Jhr H. van Lennep en Jb. van de Peppel; als introduc   de heer J. M. Baron van Tuyl van Serooskerken.

Afwezig met kennisgeving de heeren: P. A. Hens, Jhr. W. C. van Heurn, Jhr Dr Ir F. C. van Heurn, Jhr W. H. de Beaufort, A. B. Wigman en J. P. Strijbos.

Wegens afwezigheid van den heer Hens wordt het voorzitterschap waargenomen door den heer de Vries.

Deze opent om 9 uur nm. de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De Secretaris leest de notulen voor, die worden goedgekeurd.

Voor het lidmaatschap heeft bedankt de heer G. Veth, den Haag.

Ballotage van nieuwe leden.

Van de 5 candidaatleden worden met algemeene stemmen benoemd: J. M. baron van Tuyl van Serooskerken, kasteel te Geldrop (voorgesteld door den heer W. Sillem), P. van Vollenhoven, Burg. Knappertlaan 128 te Schiedam (voorgesteld door den heer Marres), H. J. Slijper (Nieuwe Englaan 27 te Bussum (voorgesteld door den heer Resoort) en A. W. F. H. S  nger, van Hogendorplaan 1 te Arnhem (voorgesteld door den heer van den Brink), terwijl de 5e candidaat wegens het verkrijgen van 2 tegenstemmen niet kon worden aangenomen.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer Eijkman doet mededeeling van enkele waarnemingen in de Br. Biesbosch: klapekster (*Lanius excubitor*), zeearend (*Halia  tus albicilla*) en wilde zwaan (*Cygnus cygnus*). (Zie Ornith. v. Nederl., 1942, 1).

De heer ten Kate bericht over late kleine zwanen (*Cygnus bewickii*) op het Kampereiland (zie ibidem) en demonstreert    n tot op den draad versleten ring, afkomstig van een kapmeeuw (*Larus ridibundus*), die 12