

BOER-TEKKE, Wederom broedgeval van de hop (*Upupa e. epops*) [LIMOSA, 17

- Band I, p. 11—15—27—33—190—195—269—271—272—287—314—317.
„ II, p. 55—67—111—117—129—139—140—142—146—147—173—258—
261—263—268—272—350—372—381—472—473—474—483—486—
491.
„ III, p. 79—119—139—142—172—202—213—230—238.
„ IV, p. 238—351—366—369—383—401.

Afbeeldingen. (Opgave van Jourdain).

- Cat. of Eggs of Brit. Museum, IV, pl. VIII, fig. 1, 7, 10, 12, 14.
Dresser, Eggs of the birds of Europe, pl. 2, fig. 5 en 8; pl. 3, fig. 4; pl. 31,
fig. 12, 13, 15, 16, 31, 34.
F. W. Frohawk, British Birds with their Nests and Eggs, pl. 1, fig. 17; pl. 4,
fig. 146, 147; pl. 5, fig. 187, 189; pl. 6, fig. 205, 206, 207; pl. 8, diverse van
koekoek.
Jourdain, Eggs of European birds, pl. 13, fig. 9—11; pl. 39, 40, 41.
A. Koenig, Katalog der Nido-oölogischen Sammlung.
Numann, Band IV, pl. 47, fig. 26.
Öölogists' Record, 1937, p. 89.
Seeböhm, Col. figures, 32, 49, 53, 54.

Wederom een broedgeval van de hop (*Upupa e. epops* L.) in Westelijk Nederland

DOOR

F. G. J. BOER en M. J. TEKKE.

Onder verwijzing naar onze publicatie in dit tijdschrift, 16, p. 112—114, verheugt het ons te kunnen mededeelen, dat het ons wederom gelukt is een broedgeval van de hop te kunnen vaststellen in dezelfde omgeving als in 1943, nl. aan den binnenduinrand tusschen Loosduinen en Monster.

Het thans bereikte resultaat is daarom zoo verblijdend, omdat wij dit jaar meer dan ooit te kampen hebben gehad met terreinmoeilijkheden, daar wij een bewegingsvrijheid genoten, welke nagenoeg beperkt was tot de vangplaats van het Ringstation „Ockenburgh”.

Noodgedwongen is het dus het werk geweest van het gewapend oog, waarnemend op groote afstand, belangrijk aangevuld met detective-werk.

Op 23 April vertoonde de hop zich voor het eerst wederom in de omgeving van het Ringstation, doch er was bij ons geen sprankje hoop te bespeuren, dat hij dit jaar in de buurt zou gaan nestelen. Op dat tijdstip namelijk was het anders zoo verlaten terrein ten prooi aan een druk militair verkeer, dat langzaam overging in een cacophonie van menschelijk geschreeuw en bijslagen.

Met het naderen van het broedseizoen keerde ook de rust in het bosch weer. Onbegrijpelijk genoeg bleven de hoppen „hangen” in een rustiger gedeelte en konden wij weer een serie waarnemingen notceeren, welke hier chronologisch volgen:

23/4	24/4	15/5	16/5	20/5	21/5	22/5	10/6	12/6	14/6	19/6	20/6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

23/6	28/6	1/7	3/7	4/7	6/7	7/7	8/7	10/7	13/7	15/7	16/7
1	1	1	1	2	2	1	4	2	1	1	1
			met voer								
17/7	18/7	19/7	20/7	24/7	25/7						
1	1	1	1	1	1	ex.					

De jachtopziener van „Ockenrode”, de heer v. d. Kooij, vertelde ons op 16 Juli, dat bij hem was geweest een Duitsch soldaat, die hem een vogel toonde, welke hij bemachtigd had. Hij wilde weten wat dit voor een soort was. De jachtopziener herkende hem direct als een hop; aan zijn verzoek om zich hierover met ons in verbinding te stellen, werd geen gevolg gegeven. De vogel was niet „fit” meer, doch de Duitsche soldaat wilde toch trachten hem in leven te houden.

Later vernamen wij, dat hij na twee dagen gestorven was. Pogingen om de huid in handen te krijgen, bleven vruchteloos.

Wij hebben den jachtopziener een beschrijving laten geven van den vogel. Deze kwam zoo treffend overeen met het vederkleed van het jonge exemplaar, dat voor ons elke twijfel was buitengesloten.

Ten overvloede legden wij hem een serie gekleurde vogelplaten voor, waaruit hij zonder aarzelen de hop aanwees. Bovendien vertelde hij dat hij afgezien van de vele malen, dat hij de oude vogels van vrij dichtbij had waargenomen, eenmaal de oude met 2 jongen had gezien.

Hij naderde behoedzaam en zag hoe de jongen werden gevoed met voedsel, dat op den grond werd verzameld en hij bootste op juiste wijze de alarmroep na, als beschreven in „Limosa”, 16, p. 112.

Deze ontmoeting viel na het gesprek met den Duitschen soldaat, zoodat het paartje minstens 3 jongen had grootgebracht.

Daarmede staat dus wederom voor dit jaar een broedgeval vast voor Westelijk Nederland.

In aansluiting hierop kan nog worden medegedeeld, dat van den heer L. Lippens te Knokke—Le Zoute schriftelijk bericht werd ontvangen, dat de hop dit voorjaar in België „in macht” was teruggekomen en broedde op verschillende nieuwe plaatsen, o.a. te Arendonck-Postel ten Noorden van Turnhout, dichtbij de Nederlandsche grens.

Wanneer hooren wij eens van een broedgeval uit Noord-Brabant?

Oölogische en nidologische mededeelingen, 1944, 1

DOOR

Tsj. Gs. DE VRIES.

Kleine eieren van den zwarten kraai, *Corvus c. corone* L.

Op 9 April 1944 vond ik bij Rotterdam in een klein eikenboompje een nest met één ei, tamelijk donker en iets spitsler dan normaal. Op 13 April bevatte het nest 5 eieren, gemiddeld van zeer geringe grootte, welke waarschijnlijk in onderstaande volgorde gelegd zijn: