

Korte mededelingen

(met 1 tekstfiguur)

Nest and eggs of the rufous-bellied Malkoha, *Rhopodytes sumatranus* (Raffles) in Dutch West Borneo

According to "The Birds of the Malay Peninsula", Vol. II, 1928, by the late Herbert C. Robinson, page 81, nothing is known about the nidification of *Rhopodytes sumatranus*. I therefore wrote a short note for "De Tropische Natuur", 1930, 10 page 181, in which I described the nest and eggs of the above mentioned Malkoha. It seems this paper was overlooked by the British ornithologists in Singapore, because I read on page 156 of Vol. IV, 1939, published under the direction of the late Frederic N. Chasen: "there is no record of the nest and eggs from the Peninsula". No mention was made of my discovery in West Borneo.

For that reason I repeat the following details of nest and eggs of the rufous-bellied Malkoha. I found on the 18th of May 1930 at Batoe Ampar, Koeboe, Pontionak. The nest was built in a low shrub (*Allophylus spec.*, native name: mata ketam.) about 5 feet high above the ground, on the border of a small road near the coastline of the Padang Tikar Bay. The foundation consisted of small twigs arranged cross-wise, resembling the nest of the green pigeon (*Treron spec.*). In this case the twigs were placed in such a manner, that there was a nestcup lined with leaves of the "mata ketam". I counted 15 leaves. In the nest were 2 white eggs, not unlike those of the lesser Coucal, *Centropus bengalensis javanensis* (Dumont). The shell was thick and with a rough granulated surface. Dimensions: 27.9 x 23.9 and 27.1 x 23.7 mm. (1.12 by 0.96 and 1.08 by 0.95 in). Incubation: fresh.

The natives called this non-parasitic Cuckoo, which was caught on the nest with a cast-net (djala) "terindak".

Hilversum, the 10th of October 1946.

L. Coomans de Ruiter.


Over een zonderlinge snavelvergroeiing bij het barmsijsje, *Carduelis flammea flammea* (L.)

In de collectie van den Zeereerw. H. Nillesen te „Oud-Ehrenstein", Kerkrade, zag ik een barmsijsje met een allerzonderlingste snavelvergroeiing. De snavel van dit exemplaar was slank en spits en had den vorm aangenomen van een insekteneterssnavel (zie afbeelding). De lengte bedraagt, gemeten vanaf het voorhoofdsbeen, 11 mm. De vleugellengte bedraagt 77 mm.

Het betreft hier een kooivogel; volgens uiterlijk een ♀. Er is geen spoor van rood meer aan het dier te bekennen. Het voorste gedeelte van den bovenkop vertoont een zwakke gele glans. Wel het restant van de roode kleur, welke, gelijk bekend, in de kooi in geel over gaat.

Volgens mededeeling van den Zeereerw. Heer A. Janssen te Sittard, die den vogel destijds als kooivogel in zijn bezit had, is het diertje omstreeks 1939 gevangen te Kerkrade. Hij verkreeg den vogel van iemand aldaar. Het exemplaar had toen reeds een spitsen, abnormalen snavel. De vorige eigenaar had het stuk drie maanden in de kooi gehad nadat het was gevangen. Bij navrage herinnerde hij zich echter niet meer of het dier toen reeds zulk een spitsen bek bezat. Wel wist hij mede te deelen, dat het een gelen bovenkop had!

De bovensnavel loopt regelmatig spits toe en ziet er als 't ware normaal uit, indien het een insektenetenden vogel had betroffen. De ondersnavel is onregelmatig en eenigszins misvormd (zie afbeelding). De punt is schuin afgestompt en aan



Boven : van links naar rechts : kop van het barmsijsje met abnormalen snavel (coll. H. Nillesen, omstreeks 1939, Kerkrade, No. 247) en kop van het barmsijsje met normalen snavel, ♂ ad., 14 November 1931, Breda (coll. P. Hens, No. 2778) ;

Onder : van links naar rechts : 1. bovenaanzicht van den bovensnavel en 2. onderaanzicht van den ondersnavel van het barmsijsje met abnormalen snavel ; 3. en 4. als voren van het barmsijsje met normalen snavel (lengte 10 mm.).

het rechter basisdeel vertoont hij vijf schuin verlopende dwarsgroeven, waarvan men den indruk krijgt, dat deze kunnen zijn ontstaan door het wetten van den snavel tegen een hard voorwerp, bijv. de tralies der kooi.

Ik vermoed, dat de vogel deze misvorming reeds bezat toen hij werd gevangen, aangezien het mij onwaarschijnlijk voorkomt, dat deze in drie maanden tijds in de kooi zou zijn ontstaan, tenzij het hier een vogel betreft, welke als kooivogel ontsnapt, opnieuw werd gevangen. Zou misschien de gele kleur van den bovenkop, welke het dier reeds zou hebben bezeten toen de eerste bezitter het verkreeg, in de richting van het laatste geval wijzen ? Dan blijft de mogelijkheid open, dat de misvorming toch in gevangenschap kan zijn ontstaan. In ieder geval zien wij dat het mogelijk is dat de kegelvormige snavel van een zaadeter kan veranderen in den priemvormigen van een insekteneter. Het zij nog opgemerkt, dat in deze van een z.g. „artefakt” geen sprake is.

Naar ik vernam werd het beestje gevoerd met universeel voer, zoowel als met gewoon vogelzaad.

Valkenburg-Houthem, 11 Maart 1947.

P. Hens.

Jaarverslag over 1946.

In het Clubjaar 1946 kwamen geen wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur en van de Redactie. Aan de beurt van aftreden waren Dr C. G. B. ten Kate en Dr C. Eijkman, ditmaal 2 leden omdat in 1945 niet vergaderd werd. Beide Bestuursleden werden bij acclamatie herbenoemd.

Uitgeschreven werden 4 vergaderingen, die alle druk bezocht waren, n.l. 6 Januari te Amsterdam, 25 Mei te den Haag, 29 September en 22 December te Amsterdam. Aan de Mei-vergadering te den Haag was den vo'genden dag, begunstigd door mooi weer, een excursie verbonden naar het landgoed van H.M. de Koningin „de Raaphorst” te Wassenaar. De oorspronkelijk bedoelde excursie naar het Leersumsche veld kon wegens gebrek aan hotelruimte niet doorgaan.

De plannen tot opheffing van de Club en tot aangaan van een fusie met de