

N.O.V., werden dit jaar verder uitgewerkt. Een Commissie bestaande uit 6 bestuursleden van de N.O.V. en de Club heeft de ontwerp-statuten en huishoudelijk reglement van een Ned. Orn. Unie samengesteld, welke inmiddels aan alle leden der beide vereenigingen zijn toegezonden. In deze Commissie hadden voor de Club zitting de heeren Hens, van Marle en Eijkman.

In de Decembervergadering werd een stemming gehouden over het al of niet opheffen van de Club. Het resultaat van deze stemming was 18 voor en 16 tegen, zoodat de Club blijft voortbestaan.

Van de mededeelingen in de vergaderingen verdient in het bijzonder vermeld te worden de waarneming van Dr ten Kate van een voor de Ned. Avifauna nieuwen vogel nl. *Larus ichthyæetus*, aan de kust bij Kampen.

In het clubjaar 1946 bedankten slechts twee leden voor hun lidmaatschap, waartegenover staat een aanwinst van 24 nieuwe leden. De heer F. G. J. Boer, leider van het trekstation „Ockenburgh” ontviel ons op tragische wijze door den dood.

De Club telt thans 8 eere-leden en 158 gewone leden. De rekening en verantwoording sluit met een voordeelig saldo van f 82.27.

Begin Januari werd het eerste no. van Limosa 1945 verzonden, dat nog in December was gezet; in Mei kwamen no. 2—4 van deze jaargang uit, die totaal slechts 95 pagina's telde, echter met aanzienlijk kleiner lettertype. In September verscheen no. 1—2 van jaargang 1946, groot 64 bladzijden, met 2 platen, waarvan één gekleurde. Momenteel is no. 3—4 ter perse; een gedeelte hiervan is reeds gezet. Dit no. zal een 8-tal platen bevatten, hetgeen groote eischen aan de kas zal stellen.

Van „De Nederlandsche Vogels” is het 1e stuk van afl. 9 sinds begin November ter drukkerij. De nieuwe drukkerij — „Vada” te Wageningen — is echter in de oorlog tweemaal volkomen vernietigd en eerst in November j.l. heropend. In Januari hoopt men met het zetten te beginnen.¹⁾ Dit stuk bevat alle nog niet behandelde soorten, terwijl in het tweede stuk van deze slotaflevering de noodzakelijke Addenda en Corrigenda, alsmede een algemeen register zullen worden opgenomen.

De Secretaris, C. Eijkman.

Vergadering in „Artis” te Amsterdam op 29 September 1946

Aanwezig: van het Bestuur de heeren: P. A. Hens, Dr C. Eijkman, J. G. van Marle, Tsj. Gs. de Vries, Jhr Dr Ir F. C. van Heurn en Dr C. G. B. ten Kate; voorts de leden: Dr A. Scheygrond, K. Waldeck, Dr J. R. H. Schaank, W. Ph. J. Hellebrekers, N. W. Pel, Mr W. Marinkelle, L. Coomans de Ruiter, G. J. M. de Greef, J. E. Sluifers, W. J. Resoort, J. Muller, H. J. Slijper, G. Bos, H. C. Wesseling, R. Stuurman, M. H. Kleyn, J. Lieste, L. Kleyn, J. Feiters, M. J. Tekke, R. Tybout, A. F. W. van Bleyenburgh, Jb. van de Peppel, Dr H. W. van Rhijn, K. H. Voous, M. Dijkstra, Dr G. C. A. Junge, Dr. A. A. J. G. Marres, A. B. Wigman, Dr H. N. Kluyver, J. P. Bouma, G. A. L. Bisseling; als introducee Meij. H. C. Luiting.

Afwezig met kennisgeving: de heeren E. Evers, Dr W. H. van Dobben, J. P. Strijbos en de Ned. Jagersvereeniging.

¹⁾ Door omstandigheden is eerst in Juni met het zetten aangevangen. (t. K.)

De Voorzitter opent om half twee de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De Secretaris leest de notulen der vorige vergadering, welke ongewijzigd worden goedgekeurd.

Als nieuwe leden worden voorgesteld de heeren:

D. T. E. van der Ploeg, Schoolstraat 371 te Bergum (door de Vries) en J. Broerse, Dorpstraat 133, te Wormer (door van den Hoorn). Beiden worden met algemeene stemmen benoemd tot lid van de Club. Vervolgens is aan de orde de bespreking der fusieplannen met de N.O.V.

De voorzitter zet de voornaamste doelpunten der fusie uiteen. De N.O.V. en de C.N.V. vereenigen zich tot de Ned. Ornith. Unie, waarvan lid zijn alle leden der beide vereenigingen. Om nieuw lid te worden is een stemmenmeerderheid van $\frac{3}{4}$ vereischt. De Unie geeft een tijdschrift uit, dat noch Limosa noch Ardea mag heeten. Voorts kunnen in de Unie studiekringen voor speciaal onderzoek gevormd worden, wanneer 10 leden de wensch daartoe te kennen geven. Deze studiekringen vergaderen afzonderlijk en kunnen zich zelf ook ontbinden. Publicaties moeten afgestaan worden aan het gemeenschappelijk tijdschrift. Studiekringen kiezen hun eigen bestuur. Hierin heeft ook een bestuurslid van de Unie zitting. Voorts kunnen deze kringen hun aantal leden beperken. Verschillende leden stellen den inleider vragen, sommigen hebben bezwaren, doch het meerendeel kan zich wel met het beginsel vereenigen. Als bezwaren worden o.a. gevoeld het niet kunnen volgen van meerdere bijeenkomsten van studiekringen, het misschien anders dan op Zondag vergaderen, de overbezette vergaderingen en excursies uitgaande van de Unie, het verloren gaan van de amicale sfeer.

Het voornaamste voordeel van de fusie is, dat men niet van twee vereenigingen, die het zelfde doel nastreven, lid meer behoeft te wezen; verder het combineeren der beide tijdschriften, waardoor het bezwaar van dublures komt te vervallen. Voorts zullen demonstraties op systematisch gebied meer tot hun recht komen wanneer ze in de kleinere vergaderingen der studiekringen ter tafel worden gebracht.

Wetenschappelijke mededeelingen.

De heer ten Kate constateerde bij Kampen weer koloniegewijs broeden van futen (zie Limosa, 19, p. 125). Verder hebben alle drie de pluviersoorten (strand-, bontbek- en kleine) bezuiden de Ketel gebroed (ibidem, p. 126). Mogelijk broedde ook de kuifeend op het Kampereiland (ibidem, p. 125). Dezen zomer werden veel lepelaars aan de kust waargenomen. In Mei waren er reeds ong. 60 aanwezig (ibidem, p. 123). Van krooneenden werden verschillende exemplaren waargenomen (ibidem, p. 125). In den broedtijd werd een roodkeelduiker gezien (ibidem, p. 126), op 24 Juli 6 wilde ganzen in de N.O.-polder (ibidem, p. 124). De belangrijkste waarneming betrof een *Larus ichthyaetus* Pall., de reuzen zwartkopmeeuw, op 16 Juni aan het IJsselmeer, als eerste voorkomen in Nederland. (zie verder Limosa, 19, p. 52—55).

De heer Wigman spreekt over de groote toename van de havik op de Veluwe (ibidem, p. 122). Waarschijnlijk staat de teruggang van de zwarte specht met deze toename in verband. Wat de overige roofvogels betreft noemt spr. 5 buizerdhorsten, benevens een van de wespendif (ibidem, p. 122 en 123). De zeearend was op 31 Maart nog aanwezig en dit jaar op 2 Sept. teruggekomen; drie stuks zijn thans aanwezig. Een vischarend werd op 14 Mei en 6 September waargenomen. $\pm$ 40 kruisbekken werden op 2 Augustus gezien. De korhoenders zijn sterk teruggelooopen (ibidem, p. 129). De houtsnip neemt toe (4 nesten) (ibidem, p. 127) en de duinpieper is in het geheel niet zeldzaam

op de Centrale Veluwe (ibidem, p. 120). Van een groote lijster werden twee legfels in hetzelfde nest uitgebroed (ibidem, p. 144).

De heer Waldeck vond op 1 Mei te Ockenburg een nest van de gekr. roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*) met 3 eieren. Later lag in het nest een koekoeksjong (*Cuculus canorus*), waaruit dus blijkt, dat de koekoek al heel vroeg gelegd heeft. Voorts trof spr. een vl. gaaiennest (*Garulus glandarius*) in een knotwilg aan. In dezelfde rij knotwilgen lag een boschuil (*Strix aluco*), die twee jongen heeft grootgebracht. Te Neerlangbroek werd op 7 Mei een appelvink met 4 vlugge jongen gezien. Wespeneiën kwamen van 16 Mei—1 Juni op de Buunderkamp voor. Op 23 Mei werd te Tongeren een hop waargenomen. Hier broedt vermoedelijk ook de draaihals, die daar herhaaldelijk werd geöbserveerd. Op 26 Mei stond een legfel van de duinpieper reeds op uitkomen. Niet-tegenstaande de koekoek (*Cuculus canorus*) zelden bij Sylviden een ei deponeert, trof spr. op Ockenburg een fluiterslegfel (*Phylloscopus sibilatrix*) aan met een blauw koekoeksei. Spr. is van meening, dat de fluiters slechts zingt tot het vijfde eieren heeft. Deze opvatting wordt door anderen niet gedeeld. In September kwamen bij Vianen overal purperreigers voor, éénmaal tien tegelijk.

De heer Hellebrekers demonstreert verschillende afwijkende legfels van zilvermeeuw, kraai, torenvalk, zw. stern, fitis, tuinfluiters, kneu en zanglijster, benevens een zeer groot ei van de lepelaar. Bij de kl. karekiet trof hij tweemaal een interessant koekoeksei aan. (Zie Limosa, 19, p. 56—58). Een vermoedelijk ei van de ekster was zóó afwijkend, dat het even goed een kraai, zelfs een roek kon wezen.

De heer Sluifers zegt, dat strand- en kleine pluvier dicht bij Rotterdam hebben gebroed.

De heer Muller vermeldt voor de N-O polder talrijke roerdompen, bruine kuikeneiën en baardmeezen. Van de laatste hebben er misschien wel 500 gebroed (zie dit no., p. 166).

De heer Kluiver spreekt over de groote toename van nachtzwaluwen in de omgeving van Wageningen. (Zie Limosa, 19, p. 122).

De heer Hens zegt, dat het omgekeerde het geval is met de Europ. kanarie in Valkenburg (ibidem, p. 120).

De heer Hellebrekers trof een ♂ nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*) op de jongen aan. Vermoed wordt, dat het ♀ intusschen een nieuw legfel begonnen is.

De heer Dijkstra zegt, dat de eksters (*Pica pica*) in de duinstreek zeer sterk in aantal zijn toegenomen.

De heer Bisseling vermeldt vele vondsten van vuurgoudhaantjes (*Regulus ignicapillus*) in de wintermaanden in de omgeving van den Haag in de jaren 1942 en '43.

De heer Marres trof dit jaar een havik broedende aan te Maarn. Ook de appelvink werd hier broedende gevonden. Volgens spr. heeft iemand, die goed op de hoogte van vogels is, een sperwergasmusch (*Sylvia nisoria*) op 4 Sept. onder Heemstede gezien.

De heer Junge vermeldt de vondst van een groote jager, ad. ♂, op 25 Sept. te Reeuwijk.

De heer M. Kleyn heeft te Heeze nog 12 korhoenders in den broedtijd geteld. Te Warmond heeft een ooievaar (*Ciconia ciconia*) getracht om te broeden. De heer Lieste heeft op Terschelling het broeden van tapuiten (*Oenanthe oenanthe*) geconstateerd temidden van bouwland onder de dakpannen van twee verschillende boerderijen. Voorts hebben op de Bosplaat 5 eidereenden en 20 kleine mantelmeeuwen genesteld.

De heer Kleyn Jr. zegt, dat bij Loosduinen een dodaars (*Podiceps ruficollis*)

heeft gebroed; op 20 Juli waren er twee jongen. Misschien betreft dit een tweede broedsel. Vervolgens vond spr. een houtduif (*Columba palumbus*) met 3 eieren. De boomvalk van Oud Eik en Duinen heeft thans zijn horst verplaatst naar Nieuw Eik en Duinen.

Den heer Tekke is de schaarschte aan tapuiten (*Oenanthe oenanthe*) in de duinstreek opgevallen.

De heer van Bleyenburgh heeft in de omgeving van Enschede een buizerdhorst ontdekt, bewoond door een paartje van de donkere en de lichte phase. Onder Hengelo werd medio Juli een vischarend gezien.

De heer van de Peppel trof op 26 Sept. nog zingende boomleeuweriken (*Lullula arborea*) aan. Op 13 Sept. was een vischarend onder Wageningen waargenomen. Spr. vertoont verder een foto van een nestjong van de bonte kraai (*Corvus cornix*) (2 Juni), die dit jaar op Texel gebroed heeft (zie ook Limosa, 19, p. 119).

De heer van Rhijn vraagt of het aantal lepelaars en roode reigers den laatsten tijd is afgenomen. Antwoord: ontkennend.

De heer de Vries vertoont verschillende abnormaal geteekende eieren van de Kievit (*Vanellus vanellus*). Volgens hem zingt de fluitier (*Phylloscopus sibilatrix*) wel degelijk als het legsel compleet is. Te Olterterp heeft een buizerd gebroed; op 17 April lagen 3 eieren in het nest. Verder broedt te Leeuwarden weer de boomvalk, evenals de ransuil (*Asio otus*).

De heer Hens zag op 14 September bij Houthem 10 duinpiepers.

De heer Pel heeft gelezen, dat op sommige Zuidzee-eilanden de vogels sterk verminderd zijn omdat hun, uit insecten bestaand, voedsel door het gebruik van D.D.T. poeder belangrijk is achteruit gegaan.

De heer Coomans de Ruiter demonstreert eenige huiden van door hem in de jaren 1938—1940 in de Minahasa (N-Celebes) verzamelde vogels, t.w. 2 exemplaren van „der Vogel Schnarch“, *Aramidopsis plateni* (W. Blasius), vervolgens één adult en een voor de wetenschap nog onbekend juveniel exemplaar van *Gymnocrex rosenbergii* (Schlegel). Beide rallen behoorden tot 1938 tot de groote zoölogische rariteiten. (zie verder Limosa, 19, p. 65—75).

Om circa 5 uur sloot de Voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. Eijkman.

Literatuur.

Oologists' Record, March 1946. Het broeden van *Puffinus p. mauretanicus* (nu Balearic Shearwater i.p.v. Western Mediterranean Manx) op het eiland Pobreten N. van Cabrera in 1935 en 1941; 18 eieren meten 61 x 42.5, dus groter dan van *P. p. puffinus* en *P. p. yelkouan* en kleiner dan van *P. k. kuhli*. (Vóór 1935 was slechts één ei bekend van Conejera in 1933).

Idem, June 1946. The dusky Redshank in Norway; The Eleonora Falcon.

Idem, September 1946. The dusky Redshank in Norway; The eggs of the Red-backed Shrike, by J. H. Owen en David Lack. Zeer uitvoerige gegevens over neststand, aantal eieren en kleurpatroon. On the nesting of *Emberiza cioides castaneiceps* Moore in China.

Idem, December 1946. The eggs of the Redbacked Shrike (vervolg): Aantal eieren in eerste, tweede, derde en vierde vervolglegel.

On the breeding of the Redbr. Flycatcher, by Major W. M. Congreve. Variations in the eggs of British birds, Part I. W. Hobson. Erythrisme: Family Corvidae, Fringillidae, Alaudidae, Motacillidae, Laniidae, Muscipidae, Sylviidae.
(W. Hellebrekers).