

heeft gebroed; op 20 Juli waren er twee jongen. Misschien betreft dit een tweede broedsel. Vervolgens vond spr. een houtduif (*Columba palumbus*) met 3 eieren. De boomvalk van Oud Eik en Duinen heeft thans zijn horst verplaatst naar Nieuw Eik en Duinen.

Den heer Tekke is de schaarschte aan tapuiten (*Oenanthe oenanthe*) in de duinstreek opgevallen.

De heer van Bleyenburgh heeft in de omgeving van Enschede een buizerdhorst ontdekt, bewoond door een paartje van de donkere en de lichte phase. Onder Hengelo werd medio Juli een vischarend gezien.

De heer van de Peppel trof op 26 Sept. nog zingende boomleeuweriken (*Lullula arborea*) aan. Op 13 Sept. was een vischarend onder Wageningen waargenomen. Spr. vertoont verder een foto van een nestjong van de bonte kraai (*Corvus cornix*) (2 Juni), die dit jaar op Texel gebroed heeft (zie ook Limosa, 19, p. 119).

De heer van Rhijn vraagt of het aantal lepelaars en roode reigers den laatsten tijd is afgenomen. Antwoord: ontkennend.

De heer de Vries vertoont verschillende abnormaal geteekende eieren van de Kievit (*Vanellus vanellus*). Volgens hem zingt de fluitier (*Phylloscopus sibilatrix*) wel degelijk als het legsel compleet is. Te Olterterp heeft een buizerd gebroed; op 17 April lagen 3 eieren in het nest. Verder broedt te Leeuwarden weer de boomvalk, evenals de ransuil (*Asio otus*).

De heer Hens zag op 14 September bij Houthem 10 duinpiepers.

De heer Pel heeft gelezen, dat op sommige Zuidzee-eilanden de vogels sterk verminderd zijn omdat hun, uit insecten bestaand, voedsel door het gebruik van D.D.T. poeder belangrijk is achteruit gegaan.

De heer Coomans de Ruiter demonstreert eenige huiden van door hem in de jaren 1938—1940 in de Minahasa (N-Celebes) verzamelde vogels, t.w. 2 exemplaren van „der Vogel Schnarch“, *Aramidopsis plateni* (W. Blasius), vervolgens één adult en een voor de wetenschap nog onbekend juveniel exemplaar van *Gymnocrex rosenbergii* (Schlegel). Beide rallen behoorden tot 1938 tot de groote zoölogische rariteiten. (zie verder Limosa, 19, p. 65—75).

Om circa 5 uur sloot de Voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. Eijkman.

Literatuur.

Oologists' Record, March 1946. Het broeden van *Puffinus p. mauretanicus* (nu Balearic Shearwater i.p.v. Western Mediterranean Manx) op het eiland Pobreten N. van Cabrera in 1935 en 1941; 18 eieren meten 61 x 42.5, dus groter dan van *P. p. puffinus* en *P. p. yelkouan* en kleiner dan van *P. k. kuhli*. (Vóór 1935 was slechts één ei bekend van Conejera in 1933).

Idem, June 1946. The dusky Redshank in Norway; The Eleonora Falcon.

Idem, September 1946. The dusky Redshank in Norway; The eggs of the Red-backed Shrike, by J. H. Owen en David Lack. Zeer uitvoerige gegevens over neststand, aantal eieren en kleurpatroon. On the nesting of *Emberiza cioides castaneiceps* Moore in China.

Idem, December 1946. The eggs of the Redbacked Shrike (vervolg): Aantal eieren in eerste, tweede, derde en vierde vervolglegel.

On the breeding of the Redbr. Flycatcher, by Major W. M. Congreve. Variations in the eggs of British birds, Part I. W. Hobson. Erythrisme: Family Corvidae, Fringillidae, Alaudidae, Motacillidae, Laniidae, Muscipidae, Sylviidae. (W. Hellebrekers).