

dion door *Haliastur* achtervolgd, die het hem zoo lastig maakte, dat eerstgenoemde een luid „klieu-uw” uitstootte en met snelle vleugelslagen vluchtte. Dien dag kwamen 2 vischarenden boven het kamp zweven. 1 *Milvus* vloog de arenden achterna, maar de wouw deed geen rechtstreeksche aanvallen.

Vliegbeeld: vleugels iets opgetrokken, in het midden van de vleugels een lichtere vlek, staart langer dan van *Haliaetus*.

12 Februari werd een vischarend door 2 kraaien lastig gevallen; 4 dagen later zag ik weer een dergelijke achtervolging (de kraaien hadden een nest in een boom op den heuvel).

1 Maart zagen wij 3 vischarenden, 1 exemplaar werd door een wouw geplaagd, de beide anderen vertoonden een baltsvlucht, roepend „hak-hak-hak” (als een verkouden gans). Op 22 Maart zag ik hoog in de lucht een exemplaar lastig gevallen door 2 wouwen. Voorts nog enkele malen waargenomen in Mei, Juni en Augustus. Den 7en Augustus werd *Pandion* door *Haliastur* (waarschijnlijk het mannetje van het broedpaar) aangevallen en verjaagd.

Bodjo. Enkele malen in het dal waargenomen, ook zittend in een boom langs het riviertje. Ook hier werd de vischarend regelmatig lastig gevallen door wouwen. 4 Februari 1945 hoorde ik van *Pandion* een mij nog onbekend geluid: „koeluuiek”, langgerekt en klagend, vele malen herhaald. In Februari en Maart nog enkele malen in het dal gezien.

Op 12 Maart vielen meerdere wouwen 1 vischarend aan; *Pandion* werd uiteindelijk verdreven door rechtstreeksche stootaanvallen.

Hilversum, 25 September 1946.

On the Races of the Bean Goose in the Netherlands

BY

R. A. H. COOMBES.

In *Limosa* (17, 1944, pp. 41—55) Dr. K. H. Voous discusses two races of the Bean Goose found in Holland under the names *Anser fabalis arvensis* and *Anser fabalis segetum*, and also describes a specimen (Zoological Museum Amsterdam. Coll. No. 2841) which he identifies as *Anser fabalis rossicus* Buturlin and claims it as the first specimen of that form obtained in Holland or recorded for Europe outside Russia. I have examined this specimen and while I agree with him that it is an undoubted example of *Anser fabalis rossicus* Buturlin, I think he is mistaken concerning the status of this form and in thinking that it differs in any way from *segetum*. Buturlin makes it quite clear in his paper „A Survey of the Bean Goose Races” (*Aquila* 38—41, 1931—34) that when he bestowed the name *rossicus* (Key to Game Birds and Waterfowl, Moscow, p. 60, 1933) he was renaming the goose which up to that time had been known almost universally as *Anser segetum*, and was not describing a new sub-species. Buturlin states that his *Anser serrirostris rossicus* is the *Melanonyx segetum* of Alpheraky 1904 and the *Anser segetum* of his own writings prior to 1933, but not the *Anser segetum* of Gmelin. Gmelin's name *segetum* has been used for many years and by many authors for a European form of Bean Goose distinguished from the typical race *fabalis* by having a longer oval nail.

deeper lower mandible, etc.; but it is unfortunate that it has been used in this way because Gmelin's name *segetum* (1789) is definitely a synonym for Latham's name *fabalis* (1787), both having been founded on Pennant's description (1776) which was published without a Latin name. It was to correct this misuse of the name *segetum* that Buturlin bestowed the new name *rossicus*. It has recently been shown (Ibis, 89, pp. 272—275) that Pennant's original description (1776) is a composite description of Bean and Pink-footed Geese, and therefore that the name *fabalis* (Latham) is indeterminate. The B.O.U. List Committee have adopted for the Bean Goose the next available name *Anser arvensis*, Brehm (Vög. Deutschl., 1832, p. 839). The races of the Bean Goose on the Netherlands list should therefore be:

Anser arvensis arvensis Brehm.

Anser arvensis rossicus Buturlin.

Through the kindness of many Dutch friends I have watched and hunted geese in several parts of the Netherlands and have examined the material preserved in museums and collections; from this it is evident that both these races of the Bean Goose are common migrants and winter residents in the Netherlands.

I have also examined the specimen (Coll. Ten Kate No. 31) described by Mr. Voous as *Anser fabalis fabalis* $\approx$ *sibiricus*, „new in the avifauna of the Netherlands.” I cannot agree however, as all its measurements and characteristics fall within the range of variation displayed by a series of specimens of *Anser f. fabalis* (Latham) in my collection, and all shot by me in the type locality. The rest of Mr. Voous's paper can be summed up in his own words „the problem is approached from a different angle and seems to be still further removed from a solution than ever before”! The geese are a difficult group, and our knowledge of them will only be advanced by more fieldwork combined with the collection of large series of skins, more study and less speculation.

Bolton-le-Sands, England.

Puffinus kuhlii borealis Cory, een nieuwe vogel voor Nederland

door

G. BOS

(met 2 tekstfiguren)

Op 26 October 1947 vonden twee jeugdige natuurliefhebbers een pijlstormvogel op het strand ten Zuiden van Zandvoort, bij paal 73. Nadat de vogel mij ter hand was gesteld, viel de grootte en de dikke geelachtige snavel op en bleek het een nieuwe soort voor Nederland te zijn, nl. *Puffinus kuhlii borealis* Cory. Enige dagen later kon dr. Junge te Leiden, na vergelijking met balgen, mijn determinatie bevestigen. Deze vogel behoort tot de zeldzaamste van West-Europa, werd in Duitsland tweemaal en in Engeland eenmaal aangetroffen. Het best kennen de Amerikanen deze vogel; die zij Cory's Shearwater noemen. Ten einde een naam met lelijke adjectieven te vermijden, lijkt mij Cory pijlstormvogel nog de beste nederlandse naam.

Interessant is ook, dat deze vogel in de rui was, iets waarover zeer weinig bekend is. De eerste 5 slagpennen waren nog niet geruid, de zesde was zeer klein, terwijl de zevende en achtste ook nog tekenen van onvolgroeid zijn vertoonden. De maten waren: vleugel: 358 mm; snavel 57.5 mm en loopbeen: 54 mm. Heemstede, 8 Nov. 1947.