

De vogels van Curaçao, Aruba en Bonaire

(met plaat 1 en 4 tekstfiguren)

door

M. DE JONG.

Inleiding: Over de vogels van Curaçao, Aruba en Bonaire is nog slechts weinig geschreven. Na de publicaties van Hartert in „Ibis” (1893) en van C. B. Cory „Birds of the Leeward Islands, Caribbean Sea”, Chicago, Field Mus. Hist. Publ. 137, Ornith. Series. Vol. I, no. 5 (1909) verscheen er slechts één belangrijk artikel in de Nederlandse taal over de avifauna van deze drie eilanden van de hand van M. G. Rutten: „Over de Vogels van de Hollandse Benedenwindsche Eilanden (Antillen)” (Ardea, 20, 1931, p. 91—143), met korte aanvullingen in Ardea, 21, 1932 (p. 73—74), 23, 1934 (p. 214—215) en 24, 1935 (p. 204—205).

Wel verscheen er een werkje in de Duitse taal „Tschogogo. Aus dem Leben der Flamingos” door Alfons Gabriel, doch dit was, voor zover het de vogels betreft, vrij onbelangrijk. Voorts verscheen in Ardea, 32, 1943 (p. 163—179) een verhandeling van Prof. Dr A. E. H. Swaen, getiteld: „De Flamingo's van Bonaire” met 2 foto's, nadat in Ardea, 31, 1942 op plaat III en IV ook reeds een drietal foto's over de flamingo's op dit eiland waren opgenomen, met kort bijschrift van Fr. Haverschmidt.

Een korte verhandeling over de vogelbescherming werd door Dr J. H. Westermann gepubliceerd in het Jaarboek 1945—1946 van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en Curaçao: „Bird Preservation in the Territory of Curaçao”.

Behalve de bovengenoemde publicaties stonden mij nog ter beschikking:

James Bond, 1936. „Birds of the West Indies”.

Leon Augustus Hausman, Ph. D., 1944. „The Illustrated Encyclopedia of American Birds”, Halcyon House, New York.

„The Book of Birds”, Vol. I and II. National Geographic Society, Washington, D.C. (2nd Ed. 1939).

Bij mijn onderzoekingen mocht ik veel medewerking ondervinden van de heer R. F. de Jong. Ik dank hem op deze plaats voor de welwillendheid waarmee hij steeds zijn auto te mijner beschikking stelde en voor zijn hulp op mijn-of onze gezamenlijke tochten door de „koeoekoe” of „mondi”¹⁾

Evenzo de Eerw. Fr. M. Realino van het Sint Thomas College, die mij menige vogel ter hand stelde en mij steeds met raad en daad terzijde stond.

* * *

Curaçao, Aruba en Bonaire liggen in een gebied met geringe regenval. Er valt gemiddeld per jaar respectievelijk 551, 450 en 510 mm. De begroeiing heeft

¹⁾ Op Curaçao is het woord „koeoekoe” of „knoek” een algemeen gebezigde uitdrukking om het ruige binnenland aan te duiden. Onder „mondi” wordt meer verstaan de „ongerepte wildernis”.

De Club van Nederlandsche Vogelkundigen ontvangt momenteel in ruil voor haar Orgaan:

Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Proceedings en Notulae Naturae)
Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici (Warschau).
Acta Societatis Zoologicae Cechoslovenicae.
Alauda, Revue trimestrielle d'Ornithologie (Parijs).
American Museum Novitates (New York City) (voor zoover ornithol.).
Annals of the Transvaal Museum (Pretoria).
Aquila (Budapest).
Ardea (Leiden).
Bird-Banding (Chicago, Illinois, U. S. A.).
British Birds (Londen).
Bulletin de la Ligue Luxembourgeoise pour la Protection des Oiseaux. Publications pour l'étude et la protection des oiseaux (Luxembourg).
Bulletin of the American Museum of Natural History (New York).
California Fish and Game (San Francisco, Calif.).
Ceskoslovensky Ornitholog (Prerov).
Chicago Natural History Museum, Annual Report en Fieldiana, Zoology (Chicago).
The Condor (Berkeley, Calif.).
Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift (Kopenhagen).
Fauna och Flora (Stockholm).
Le Gerfaut (Brussel).
The Ibis (Londen).
International Office for the Protection of Nature, publicaties.
Natuurhistorisch Maandblad Limburg (Maastricht).
Nos Oiseaux (Neuchâtel, Zwitserland).
Ornis Fennica (Helsingfors).
Ornithologische Berichte (Berlijn).
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Philadelphia).
Ricerche di Zoologia applicata alla Caccia (Bologna, Italië).
Smithsonian Institution, United States National Museum (Washington).
Proceedings en Bulletin (voor zoover ornithol.).
Var Fagelvärld (Stockholm).
Die Vögel der Heimat (Rothrist, Zwitserland).
The Wilson Bulletin (Sioux City, Iowa, U.S.A.).
Zoologiska Bidrag fran Uppsala (Uppsala, Zweden).

Leden, die tijdschriften in bruikleen wensen te ontvangen, gelieven zich te wenden tot den voorzitter, P. A. HENS te Valkenburg (L.), ten wiens huize de bibliotheek is gevestigd.

een uitgesproken xerofytisch karakter; doornig struikgewas en cactussen hebben de overhand.

De plantengroei op de eilanden is armoedig. Vooral de regenschaarste en daarbij nog de ongunstige invloed, die de passaat uitoefent, hebben hun stempel op de vegetatie gedrukt.

Op sommige plaatsen is echter een samenhangend plantendek ontstaan, doordat de mens de helpende hand kwam bieden, door kunstmatige bevoeiing. Deze plekken zijn de z.g. „hofjes”, ook wel eens betiteld als plantages; zij zijn her meest geschikt om de „landvogels” te observeren. Hier vinden deze drinkgelegenheden, waar ze vooral 's avonds een druk gebruik van maken.

Om de strandlopers, pluvieren, enz. te bestuderen doet men het beste door rustig bij een slikvlakte post te vatten.

Mijn waarnemingsperiode was van Juni 1939—Juni 1945.

Verreweg de meeste tijd bracht ik door op het eiland Curaçao. In October van het jaar 1939 vertoefde ik enige tijd op Bonaire. Op Aruba was ik ieder jaar een paar weken, doorgaans in de maand Augustus.

Rutten vermeldt in zijn boven aangehaald artikel 84 soorten en ondersoorten, in de aanvullingen nog vier nieuwe soorten. Door mij werden daarboven nog de volgende vogels gedetermineerd, hetzij tijdens eigen waarnemingen of aan de hand van foto's van exemplaren, die gedurende de laatste jaren gevangen waren: *Sula leucogaster* — Bruinbonte Rotspelikaan. (Zie no. 2 van onderstaande lijst.) *Ardea occidentalis* — Grote Witte Reiger. (Zie no. 6.)

Rutten schrijft: „Op Curaçao op het terreintje van de C.P.I.M. aan den weg naar Rooi Canarie zag ik begin April ook een witten reiger met gelen snavel en donkere pooten. Toen was ik nog niet aan het land gewend en kon me later de grootte niet voorstellen, zoodat dat net zoo goed *Ardea occidentalis* geweest kan zijn.”

Querquedula discors — Blauwvleugeltaling. (Zie no. 18.)

Buteo albonotatus — „Zwarte Buizerd”. (Zie no. 20.)

Rutten schrijft: „.....zagen wij nog..... een heelemaal zwarten Buizerd. Grootte en vliegbeeld precies als van den Witstaartbuizerd. Alleen op den staart een aantal leigrijze dwarsstrepen. Dit dier zagen wij vrij veel in de buurt van den Christoffel op Curaçao, waar het met de Witstaartbuizerden om den top rondzeilde en ook met hen „speelde”. Wij zagen er nog een op Rooi Lamoenchi in oostelijk Bonaire.”

Haliaeetus leucocephalus — Witkop(pige) Zeeadelaar. (Zie no. 24.)

Over deze vogel zegt Rutten: „Groote roofvogels langs de zee kust. Een Curaçaoënaar, die goed uit zijn oogen keek, vertelde me, dat er voor kwamen een „Vischadelaar” met heel lange, smalle vleugels en een „Vischarend” met stompe vleugels. Dat hij den Valk of de Warawara bedoelde, is uitgesloten.”

Forpus passerinus — Bergparkietje? (Zie no. 65.)

Setophaga ruticilla — Amerikaanse Roodstaart. (Zie no. 87.)

Hedymeles ludovicianus — Roodborstkardinaal. (Zie no. 93.)

* * *

VOLLEDIGE LIJST VAN WAARGENOMEN VOGELS.

De namen tussen haakjes zijn plaatselijke. De Nederlandse namen achter de Nos 17, 28, 30, 32, 40, 44, 47, 58, 59, 79 en 88 zijn ontleend aan P é n a r d, „De Vogels van Guyana.

Pelecanidae

1. *Pelecanus occidentalis* — Bruine Pelikaan, Brown Pelican (Gansji).

Algemeen voor de kusten, meestal juv. ex. Vermoedelijk broedvogel op het rif voor Aruba.

Wij hebben meermalen een pelikaan gevangen, die zat te slapen op een meerpaal bij het Waterfort. Steeds zaten deze vogels vol met volgelluis.

Sulidae

2. *Sula leucogaster* — Bruinbonte Rotspelikaan, Brown Booby (Boebie).
Vrij dikwijls te zien voor de kusten. Soms schieten ze als een torpedo enige meters onder water door. Meest juv. ex. Tweemaal een oude vogel gevangen vlak buiten de muur van het Waterfort (stookolieslachtoffer). Vroeger hebben deze vogels in een groot aantal gebroed op Klein Curaçao.

Phalacrocoracidae

3. *Phalacrocorax olivaceus* — Aalscholver, Bigua cormorant (Dékla).
Wordt ook wel „duikla” genoemd, hetgeen vermoedelijk afgeleid is van duikelaar of duiker. Algemeen op de drie eilanden. Soms slapen grote troepen in het Schottegat (Curaçao). Niet broedend.

Fregatidae

4. *Fregata magnificens* — Fregatvogel, Man o' war Bird (Schertjie).
Wordt op Bonaire „mennowar” genoemd. Zeer algemeen op alle drie eilanden. Volgens mededelingen broedt deze vogel op het eilandje in de Sint Jorisbaai (Curaçao), maar ik heb daar nimmer een nest kunnen vinden. Wel vliegen er nu en dan ♂ ex. rond met een rode keelzak, het z.g. „broedsymbool.”

Ardeidae¹⁾

5. *Ardea herodias adoxa* — Grote Blauwe Reiger, Great blue Heron (Garza grandi). Komt voor op alle drie eilanden in gering aantal. Niet broedend.
6. *Ardea occidentalis* — Grote Witte Reiger, Great white Heron (Garza blanca grandi). Enige malen op Curaçao waargenomen. Van de andere twee eilanden zijn mij geen waarnemingen bekend.
James Bond beschouwt deze vogel als een witte phase van de Grote blauwe Reiger. Hij zegt: "There is what the author considers to be a white phase, *Ardea occidentalis repens* Auct., of the Great Blue Heron in the West Indies, the bird being entirely white; intermediates also occur in this region", met een noot: "The Great Blue and Great White Herons behave as one species in the West Indies and also in Yucatan (See American Mus. Novitates No. 235, 1926)".
7. *Casmerodius albus* — Grote Zilverreiger, Egret (Garza blanca).
Komt voor op alle drie eilanden. Niet broedend.
8. *Egretta thula* — Kleine Zilverreiger, Snowy Egret (Garza blanca chikitoe).
Deze is veel algemener dan de vorige soort. Bij Playa Abau (Cur.) telde ik eenmaal een troep van ruim 70 vogels (Sept. '39). Niet broedend.
9. *Dichromanassa rufescens* — Rode Aigrette, Reddish Egret.
Waargenomen op Curaçao (en Bonaire?) in gering aantal.
10. *Hydranassa tricolor* — Witbuikreiger, White-bellied Heron. Algemeen op de drie eilanden. Broedvogel op Curaçao en Aruba. Waarschijnlijk ook op Bonaire, maar daarvan zijn mij geen waarnemingen bekend.
- 10a. *Hydranassa tricolor ruficollis* — Louisiana Reiger, Louisiana Heron. Subspecies van de vorige soort. Hartert vermeldt ze van Aruba en Bonaire. (Ibis. 1893). Ik weet niet zeker of ze nu nog op de eilanden voorkomen.
11. *Florida caerulea* — Kleine Blauwe Reiger, Little Blue Heron (Garza azul).
Vrij algemeen op Curaçao en Aruba. Misschien hier en daar broedvogel??
12. *Butorides virescens* — Kleine Groene Reiger, Little green Heron (Galinja di Awa.) „Woudaapje”. Algemene broedvogel op de drie eilanden. De naam „Galinja di Awa” betekent „Waterkip”.

¹⁾ Zie over de hier volgende vogels, voor zover ook voorkomend in Suriname dit tijdschrift II (1912), p. 84 en volgende. Red.

13. *Nycticorax n. naevius* — Kwak, Black Crowned Heron. Niet algemeen op de drie eilanden. Niet broedend.



Fig. 1. *Nycticorax violacea*.



Fig. 2. *Ajaja ajaja*.




Fig. 3. *Phoenicopterus ruber*.

14. *Nyctanassa violacea* — Geelkruinkwak, Yellow-crowned Night Heron. Als de vorige soort. Op Curaçao echter veel algemener. (Fig. 1). De reigers worden ook wel aangeduid als „Grabete”, dat misschien een verbastering is van „krabbenbijter”.

Plataleidae.

15. *Ajaja ajaja* — Rozerode Lepelaar, Roseate Spoonbill. Een melding van Aruba (Cory, 1909). (Fig. 2.)

Phoenicopteridae.

16. *Phoenicopterus ruber* — Flamingo, Roseate Flamingo. (Sjogogo). Broedde tot voor kort regelmatig in het Pekelmeer en Gotó op Bonaire (zie de foto's in Ardea, 31, plaat III en IV en 32, plaat IX). Is door de Amerikaanse strijdkrachten gedurende de oorlog verjaagd. In 1947 is een grote troep teruggekeerd, maar of ze er reeds weer gebroed hebben, is nog niet bekend. — Zeldzame bezoekers op Curaçao en Aruba. (Fig. 3).

Anatidae

17. *Dafila bahamensis* — Bahamataling, Pijlstaartend, Bahama Pintail (Patoe morekè). Gedurende de wintermaanden zeer algemeen op Bonaire. Komt zo nu en dan ook voor op de andere twee eilanden, echter in lang niet zo'n groot aantal. Deze eend niet verwarren met de Europese pijlstaart: *Anas acuta*.

18. *Querquedula discors* — Blauwvleugeltaling, Blue-winged Teal. Enige malen op Curaçao waargenomen. Jagers van Aruba vertelden mij, dat ze wel eens talingen schoten en volgens hun beschrijving, waren het ook blauwvleugels.

Falconidae

19. *Buteo albicaudatus* — Witstaartbuizerd, White-tailed Hawk (Valk, Valki). Broedt op alle drie eilanden, echter niet

- in groot aantal. Op Curaçao in de buurt van de Sint Christoffel.
20. *Buteo albonotatus* — „Zwarte Buizerd”, Zone-tailed Hawk. Dikwijls op Curaçao waargenomen. Geen broedgegevens.
21. *Polyborus cheriway* — (Amerikaanse) Gierbuizerd, Caracara (Warawara). Algemene broedvogel op Curaçao en Aruba. (*Falco sparverius brevipennis*).
22. *Falco sparverius* — Dwerghavik, Sparrow-hawk (Kinikini). Algemene broedvogel op Curaçao en Aruba. (*Falco sparverius brevipennis*). Op Bonaire komen volgens mijn beste weten geen Kinikini's voor. Als trekvogels komen op Curaçao en Aruba nog andere subspecies voor.
23. *Pandion haliaetus* — Visarend, Osprey (Sp.: Gabilán piscadó). Vrij dikwijls gezien voor de kust van Curaçao. In Dec. 1934 werd een ex. bemachtigd bij Willemstad (Ardea, 24, p. 204).
24. *Haliaetus leucocephalus* — Witkop Zeeadelaar, Bald Eagle. In Januari 1942 en December 1944 een ex. voor de kust van Curaçao gezien.

P e r d i c i d a e.

25. *Eupsychortix cristatus* — Patrijsje. (Cocoi, Socklé, soms ook Patroesji). Zeer algemene broedvogel op Curaçao en Aruba. Op deze vogels wordt veel jacht gemaakt.

R a l l i d a e.

26. *Porzana carolina* — Sora Ral (?). Half October 1934 werd een ex. op Curaçao gevangen in Knoek Blauw, waarvan een zeer duidelijke foto verkregen is. Dit is de Sora der Amerikanen. (zie ook Ardea, 24, p. 204).

H a e m a t o p o d i d a e.

27. *Haematopus palliatus* — Scholekster, American Oystercatcher. Deze bezoekt zo nu en dan de drie eilanden in gering aantal.

C h a r a d r i i d a e.

28. *Charadrius collaris* — Azara's Pluvier, South American Ring Plover (Snepi). Als de vorige soort.
29. *Charadrius nivosus tenuirostris* — „Strandpluvier”, Cuban Snowy Plover (Snepi). Broedt op Bonaire, bezoekt geregeld Curaçao, misschien ook Aruba (?).
30. *Charadrius wilsonia cinnamomus* — Wilson's Pluvier, Wilsons Plover (Snepi). Broedt op Bonaire. Algemeen op Curaçao en Aruba.
31. *Charadrius semipalmatus* — Bontbekje, Ring-neck Plover (Snepi). In gering aantal op de drie eilanden. Broedgegevens ontbreken.
32. *Squatarola squatarola* — Zilverpluvier, Black-bellied Plover (Snepi). Zilverpluvieren bezoeken de drie eilanden zo nu en dan. De meesten zag ik aan de noordkust van Curaçao (Plaja- en Boca grandi).
33. *Arenaria interpres* — Steenloper, Ruddy Turnstone (Snepi). Steenlopers bezoeken de eilanden zo nu en dan in gering aantal.

S c o l o p a c i d a e.

34. *Phaeopus hudsonicus* — Wulp, Hudsonian Curlew. Zeldzaam op Curaçao, algemener op Aruba.
35. *Actitis macularia* — Gevlekte Strandloper, Spotted Sandpiper, (Snepi, Loo-pie).¹⁾
36. *Tringa solitaria* — Bosruiter, Solitary Sandpiper. Eén melding van Curaçao (Cory, 1909).
37. *Totanus flavipes*²⁾ — Kleine Geelpootruiter, Lesser Yellow-legs. Bezoekt geregeld de drie eilanden.

¹⁾ Op Curaçao en Aruba worden de Pluvieren doorgaans betiteld met Snepi; hetzelfde geldt voor de Strandlopers. Op Bonaire maakt men wel eens verschil: een Pluvier is een „snepi”, een strandloper een „loope”. Het juiste verschil weet men echter niet.

²⁾ Zie ook dit tijdschrift VII (1917), p. 30. Red.

38. *Totanus melanoleucus* — Grote Geelpootruiter, Greater Yellowlegs. Als vorige soort.
39. *Calidris alba* — Drieteenzandloper, Sanderling (Snepi, Loopie). Als vorige soort, doch in geringer aantal.
40. *Ereunetes pusillus* — Wilson's Zandsnip. Semipalmated Sandpiper. Als 39.
41. *Pisobia minutilla* — Kleinste Strandloper, Least Sandpiper. Niet de Europese „Kleinste Strandloper”. Hartert (1893) vermeldt ze van Bonaire. Cory (1909) van Aruba. Ik zag ze enige malen op Curaçao, o.a. in October 1943 op de slikvlakte bij Plaja Abau.
42. *Pisobia melanotos* — Pectoral Sandpiper, Kriekers. Eén melding van Aruba. (Cory, 1909).

Fig. 4. *Himantopus h. mexicanus*.



Recurvirostridae.

43. *Himantopus h. mexicanus* — Mexicaanse Steltkluit, Black-necked (Snepi sabana, Snepi hoedieuw.¹) Algemeen op Bonaire en waarschijnlijk aldaar broedend. Ik zag tweemaal een steltkluit op Curaçao, één bij de Sint Jorisbaai en één bij Plaja Abau, resp. in September en October, 1943. (Fig. 4).

Burhinidae.

44. *Burhinus bistriatus* — Griel. Amerikaanse dikknieplevier. Thick-knee, Door Frater Realino werd mij een foto ter hand gesteld van een voorwerp, dat einde Juli 1934 op Curaçao gevangen was en waarover hij ook reeds aan Rutten rapporteerde (zie Ardea, 23, p. 214). Als gegevens werden vermeld:

„Jonge vogel (Tara, Krabetsj?) Op de weg naar Piscadera Baai, nog al een eind van de zee af, in struikgewas. Zo nu en dan geeft de vogel een korte schreeuw. Lengte 185 cm., staart 11,5 cm., snavel 5 cm., loopbeen 12 cm. Drie tenen aan elke poot; alleen tussen de buitenten een klein vlies.” (Zie Plaat 1, fig. 3). Meerdere malen werd mij verteld, dat reizigers, die 's nachts reisden van Willemstad naar Westpunt of omgekeerd, vogels voor de auto hadden gehad, die groter waren dan patrijzen en veel hoger op de poten stonden. Ze vlogen nooit op maar repten zich altijd onmiddellijk tussen het struikgewas. Vermoedelijk werden hier ook grielen bedoeld.

Laridae.

45. *Larus atricilla* — Lachmeeuw, Laughing Gull (Meeuwtjie).² Veelvuldig voor de kusten van de drie eilanden, zowel in jeugd-, overgangs- als volwassen kled. Misschien (?) broedvogel op Bonaire.
46. *Thalasseus maximus* — Ned. benaming? Royal Tern. Zo nu en dan voor de kust van de drie eilanden.
47. *Thalasseus eurygnathus* — Geelsnavel Zeezwaluw, Amazone Tern. Algemeen op Bonaire. Misschien broedend aldaar? Dikwijls voor de kusten van de drie eilanden.
48. *Sterna hirundo* — Visdiefje, Common Tern (Meeuwtjie). Algemeen op de drie eilanden, broedend op Bonaire.
49. *Sterna dougalli* — Dougalls Stern, Roseate Tern. Deze heeft vroeger op

¹) Rutten geeft als plaatselijke naam op: „Kaweta di Patoe”, hetgeen „waarschuwer van eenden” betekent. Misschien dat deze benaming specifiek Bonaireaans is, want op Curaçao kent men alleen de namen „Snepi sabana” en „Snepi hoedieuw”.

²) De Meeuwen en Sterns worden op de eilanden allemaal betiteld met „meeuwtjie” of „meeuwtsjie”.

Aruba gebroed. (Hartert, 1893). Nadien geen waarnemingen meer.

50. *Sterna anaethetus* — Panayaanse Stern, Sooty Tern. Als 49.
 51. *Sterna fuscata* — Bruinzwarte Stern, Sooty Tern. Eén waarneming van Aruba (Cory, 1909).
 52. *Sterna antillarum* — Dwergstern, Least Tern (Meeuwttje). Algemeen en broedvogel op Bonaire en Aruba. Algemeen voor de kust van Curaçao, maar niet broedend op dit eiland.
 53. *Anous stolidus* — Witschedelstern, Noddy Tern. Gedurende de oorlog zag ik ieder jaar in de maanden October en November 1 of 2 ex. Zij waren altijd buitengewoon „mak”. Ik kon ze soms naderen tot op 1 m. afstand. Op 20 Sept. 1934 werd een voorwerp bemachtigd op Curaçao (Ardea, 23, p. 214).
 54. *Phaetusa simplex* — Grootshnavel Stern, Great billed Tern. Eén melding van Aruba (Cory, 1909).

Columbidae.

55. *Columba squamosa* — Blauwduif, Scaly-necked Pigeon (Blauwduifi.) Niet te verwarren met no. 59: Boela duifi. De blauwduif is met zekerheid broedvogel op Curaçao en Bonaire, vermoedelijk eveneens op Aruba. Ze komt namelijk voor op Aruba, maar er zijn op dat eiland geen broedgegevens bekend.
 56. *Columba gymnoptalma* — Witvleugelduif (Ala blanca). Zeer algemeen op Curaçao en Bonaire, minder op Aruba. Broedvogel op alle drie eilanden.
 57. *Columbigallina passerina albivitta* — Steenduijfe, Ground Dove (Tortolica, Totalica). Verreweg de meest algemeen voorkomende duif en broedvogel op alle drie de eilanden. Zij broedt zowel in struikgewas als in vrij hoge bomen. Ook werd enige malen een nest op de grond gevonden.
 58. *Zenaida ruficauda* — Bruinhals Grondduif (Ala doero). Deze naam betekent „Hardvleugel”. Algemeen en broedvogel op alle drie eilanden, het minst algemeen op Aruba.
 59. *Leptoptila verreauxi* — Roestbruine- of roodkop loopduif (Boela duifi). Zeer algemeen op Curaçao en Bonaire, minder algemeen op Aruba. Broedt op alle drie eilanden. Op deze duifjes wordt veel jacht gemaakt. Op Curaçao komen enige subspecies voor!!

Psittacidae.

60. *Aratinga pertinax pertinax* — (Curaçaoose) Parkiet, Curaçao Peroquet (Prikietsjie). Zeer algemene broedvogel op Curaçao. Uiterst schadelijk!
 61. *Aratinga pertinax arubensis* — (Arubaanse) Parkiet. Als 60, maar op Aruba.
 62. *Aratinga pertinax xanthogenus* — (Bonaireaanse) Parkiet. Als 60, maar op Bonaire.
 63. *Amazona barbadensis barbadensis* — Geelvleugelpapegaai. Yellowwinged Parrot (Lorre, Lore). Er broeden nog enkele paren op Aruba.
 64. *Amazona barbadensis rothschildi* — Bonaire Parrot (Lore, Lorre). Vrij algemene broedvogel op Bonaire.
 Op Curaçao komen geen papegaaien voor.
 65. *Forpus passerinus* — Bergparkietje? Guiana Parrotlet. In Februari 1943 ving ik een exemplaar, dat volkomen uitgeput op de muur van het „Waterfort” zat. Ik vermoed, dat het beestje uit Venezuela was over komen vliegen.

Cuculidae.

66. *Crotophaga ani* — Zwarte Tsjoetsjoebi, Gewone Anie (Chuchubi pretu, uit te spreken als „Tsjoetsjoebi pretoe). Deze koekoeken komen voor op Curaçao en Bonaire. Men heeft mij verteld, dat er broedgevallen zijn geconstateerd op Curaçao. O.a. had een jongen in 1939 een nest in de koenkoe gevonden met 17 eieren.

67. *Coccyzus minor* — Geelbuik Koekoek, Mangrove Cuckoo. Trekkers uit Noord-Amerika bezoeken de eilanden zo nu en dan.
68. *Coccyzus americanus* — Geelsnavel Koekoek, Yellow-billed Cuckoo. Als de vorige soort. De laatste waarneming is van September 1940, toen enige exemplaren geschoten werden bij de Sint Christoffel op Curaçao. Op 15 Oct. 1934 werd een ex. gevangen op de heuvels achter San Mateo aldaar. Ook werd eens een voorwerp verzameld op Aruba (zie Ardea, 24, p. 204).

Tytonidae.

69. *Tyto bargei* — Kerkuil, Barn Owl (Palabroea). (Zie 83). Ik weet niet of deze uil op Aruba en Bonaire voorkomt, maar op Curaçao is hij vrij algemeen. Broedt hoofdzakelijk in het rotsachtige gedeelte van het eiland. Hij komt echter ook veelvuldig in Willemstad voor. Ik zag meermalen een exemplaar bij het Sint Elizabeth Gasthuis.

Strigidae.

70. *Speotyto cunicularia arubensis* — Holenuil, Burrowing Owl. Wordt gemeld als broedend op Aruba in gering aantal.

Caprimulgidae.

71. *Thermochalcis cayennensis insularis* — Nachtzwaluw, Night-Hawk (Paracarpinteer, Para carpintee). Broedt in gering aantal op Curaçao en Bonaire. Waarschijnlijk eveneens op Aruba.

Trochilidae.

72. *Chlorostilbon caribaeus* — Groene Blinks, Tiny Greenlet (Blenchi berde). (berde = groen). Algemene broedvogel op de drie eilanden.
73. *Chrysolampis elatus* — Bruine Blinks, Rub and Topaz Hummer (Blenchi dornasol). Als 72, doch minder algemeen. (Dornasol betekent „iriserend“.)
74. *Florisuga mellivora* — Witnek Kolibrie, White-necked Hummingbird. Schijnt, volgens mededelingen, nog wel eens op Curaçao voor te komen, zij het dan ook sporadisch. Zelf heb ik er nimmer een gezien.

Alcedinidae.

75. *Megaceryle alcyon* — Amerikaanse Band-IJsvogel, Belted Kingfisher. Een trekker uit Noord Amerika, die geregeld de eilanden bezoekt.

Tyrannidae.

76. *Tyrannus melancholicus despotus* — Geelbuikvliegenvanger, Yellow Kingbird. Cory (1909) vermeldt ze van Aruba en Curaçao. Ik heb deze vliegenvanger enige malen op Curaçao gezien. Omtrent het broeden ontbreken mij gegevens.
77. *Tyrannus dominicensis* — Grijze Vliegenvanger, Gray Kingbird. Broedvogel op de drie eilanden.
78. *Myiarchus tyrannulus* — Venezolaanse Vogel, Crested Flycatcher (Pipiripie, Pimpiri). Als no. 77 doch algemener.
79. *Elainea martinica riisei* — Tjietjarie, Caribbean Elainea. Als vorige soort.
80. *Sublegatus modestus* — Kleine Geelbuik Vliegenvanger (?), Smooth Flycatcher. Als vorige soort.

Hirundinidae.

81. *Hirundo erythrogaster* — Schuurzwaluw, Barn Swallow (Zouwchie). Omstreeks April en September vertoeven er duizenden van deze zwaluwen gedurende enige dagen op de drie eilanden. Trekkers uit Noord-Amerika.

Mimidae.

82. *Mimus gilvus* — Grijze Zanger, Mockingthrush (Chuchubi, spreek uit: Tsjoetsjoebie). Zeer algemene broedvogel op alle drie de eilanden.
83. *Margarops fuscatus* — Ned. benaming? Pearly-eyed Thrasher. Broedvogel op Bonaire. Heet aldaar „Palabroea“. Zie ook no. 69.

Vireonidae.

84. *Vireosylva chivi* — Vireo. Eén melding van Bonaire (Cory, 1909).



Fig. 1. Mangrove vegetatie op Curaçao.

Foto fr. Arnoldo




Foto de Jong

Fig. 2. Rotskust bij Boca Ascension: loodrechte wand van kalksteen. De afsluiting van de baai vormen de lage zandduinen op de achtergrond.



Foto fr. Realino

Fig. 3. *Burhinus bistratus* subsp., Amerikaanse dikkniepluvier of griel, gevangen op Curaçao. Zie afbeelding van kop in „Pénard”.




Fig. 1. Legsel van de Indische griel, *Esacus magnirostris scommophorus* (Vieill.), op Java. Foto Hoogerwerf Oedjoeng-Koelon, Oct. 1941.




Fig. 2. Jonge Indische griel, *Esacus magnirostris scommophorus* (Vieill.), op het strand van Java, zich verbergend. Foto Hoogerwerf Oedjoeng-Koelon, 18 Sept. 1940.