

Speciaal moet ik Jaap Taapken bedanken voor de grote ijver waarmee hij mij gegevens hielp verzamelen.

Amsterdam, Oct. 1947.

Literatuur:

- Albarda, H., 1897: Aves Neerlandicae.
 Beaufort, L. F. de, 1912: Over de verspreiding van het Korhoen (*Lyrurus tetrrix* (L.)) in Nederland. *Ardea*, 1, p. 50—54.
 Eijkman, C., c.s., (1947): De Nederlandsche Vogels, afl. 9 (ter perse).
 Haverschmidt, Fr., 1942: Faunistisch overzicht van de Nederlandsche broedvogels.
 Kraak, W. K., c.s.: Vogelwaarnemingen Gooi (gestencild maandbericht).
 *) Lonkhuyzen, J. P. van, 1906: Schade veroorzaakt door het Korhoen. *Tijdschr. Ned. Heidemij*, 18.
 Niethammer, G., 1942: Handbuch der Deutschen Vogelkunde, III.
 Oordt, G. J. van en Jan Verwey, 1925: Voorkomen en trek der in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten.
 Oort, E. D. van, 1926: Ornithologia Neerlandica, II.
 *) Poulton, E. B., 1907: Insect and other foods of Blackgrouse (*Tetrao tetrrix* L.). *Tr. Ent. Soc., Proc.* 88.
 *) Ritzema Bos, J., 1897: De schadelijkheid van het Korhoen. *Tijdschr. over plantenziekten*, 9.
 Schlegel, H., 1878: De Vogels van Nederland, (met de „kopjes", II).
 Snouckaert van Schauburg, R. C. E. G. J., 1908: Avifauna Neerlandica.
 Witherby, H. F., c.s., 1941: The Handbook of British Birds, V.
 *) Niet zelf geraadpleegd.

Jaarverslag 1947 van het Ringstation „Ockenburgh"

DOOR

M. J. TEKKE

(met 1 tabel en 1 tekstfiguur)

Bij het beoordelen van de resultaten van 1947 moet men rekening houden met de omstandigheid dat, in tegenstelling met vorige jaren, niet het gehele jaar door kon worden gewerkt door het overlijden van de heer F. G. J. Boer, die practisch dagelijks aanwezig was. Vooral de vangstcijfers der insectenetende vogels en jonge spreeuwen vertonen daardoor een sterke daling. Een vergunning op naam van onze vanger, de heer J. Huntink, werd door de autoriteiten geweigerd. Dat wij ondanks deze handicap toch nog een gunstig resultaat verkregen, danken wij aan de belangeloze medewerking van de heer P. J. D. Reinier op wiens naam een vangvergunning werd verleend en die zoveel mogelijk op het station aanwezig was.

Wederom ontvingen wij dit jaar subsidie van de Maatschappij „Diligentia" en de Alg. Ver. v. Natuurbescherming v. 's-Gravenhage en omstreken, waarvoor wij deze instellingen nogmaals op deze plaats onze erkentelijkheid betuigen. Ter wille van de hoge zetkosten werd de tabel van de gevangen soorten vereenvoudigd; de daarop voorkomende nestjongen werden hoofdzakelijk geringd op de Veluwe en bij Vianen.

Op 18 October ontvingen wij bezoek van de Engelse sectie van de C.I.P.O. (Comité international pour protection des oiseaux).

Verloop van de trek. Ondanks de langaanhoudende winter (eerst op 13 Maart zette de dooi in) werden toch opmerkelijk vroege aankomsten genoteerd: fitis, 18 Maart; tapuit, 19 Maart en boompieper, 28 Maart (zie Phaenologie en Limosa 20, p. 232, 234 en 235).

Op 2 en 3 Maart werd een sterke trek in zuidelijke richting van akkerleeuweriken waargenomen, waarbij troepen van honderden ex. bij temperaturen van resp. -7°C en -3°C . Ook op 4 Maart ging dit nog voort, hoewel in mindere mate. Alleen in de trektijden werden tapuiten waargenomen; broedvogels in het duin zijn sterk achteruitgegaan; in de verre omtrek van het ringstation was geen enkel paartje te ontdekken.

Op de najaarstrek werden zo goed als geen kramsvogels gezien; op plaatsen waar zij anders talrijk zijn, werden zij deze winter ook gemist.

Begin October werd in het duingebied en in de stad een matige trek van vlaamse gaaien waargenomen.

Uit de beschikbare gegevens volgt hieronder een karakteristiek van de treksterkte van 4 soorten.

	Vink	Sijs	Akker- leeuwerik	Spreeuw
zwak	Oct. 7, 9, 10, 11	Oct. 8, Nov. 1.		Nov. 2, 6, 21, 23, 26.
matig	Oct. 4, 8, 15, 18, 19, 20	Oct. 6, Nov. 2.	Oct. 18.	Oct. 4, 19, 20, 26, 28, Nov. 7.
stevig	Oct. 6, 13, Nov. 7,	Oct. 13.	Oct. 12, 13,	Oct. 21, 22. Nov. 8, 18, 20, 22.
sterk	Oct. 17.	Oct. 4.	Oct. 19.	Nov. 19.

Van 9 t/m 17 November lag de trek practisch stil door slecht weer.



Buizerd (*Buteo buteo*), lichte phase
gevangen 3 Oct. 1947

Bijzondere vogels.

Hop (*Upupa epops*). Op 5 en 6 Mei werd telkens 1 ex. gezien en op 7 t/m 10 Mei elke dag 2 ex. Het broeden kon echter dit jaar niet geconstateerd worden.

Bastaard putter $\times$ groenling (*Carduelis carduelis* $\times$ *Chloris chloris*). Op 13 April werd een δ gevangen, dat geen tekenen van een kooivogel vertoonde. Het werd afgestaan voor de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. In Avifauna Neerlandica (1908, p. 140) wordt een dergelijke exemplaar vermeld: δ 7/10 1879 bij Den Haag, Collectie Snouckaert van Schaumburg.

Duinpieper (*Anthus campestris*). Wederom trekkers waargenomen op 3 September en 20 October. Volgens de Ned. Vogels (p. 160) is de laatst bekende datum 11 October.

Klapekster (*Lanius excubitor*). Op 20 October 1 ex. een tijdlang in de omgeving.

Buizerd (*Buteo buteo*). Een op 7/9'47 te Loosduinen geringd exemplaar van de lichte phase werd op 3/10'47 teruggevangen en weer in vrijheid gesteld. (Zie foto).

Beflijster (*Turdus torquatus*). Op de voorjaars trek waargenomen op 25 Maart en 14 April telkens een ex.

Phaenologie.

Maart (eerste data): 5, witte kwikstaart (*Motacilla alba*); 17, lepelaar (*Platalea leucorodia*); 18, fitis (*Phylloscopus trochilus*); 19, tapuit (*Oenanthe oenanthe*); 25, beflijster (*Turdus torquatus*); 26, zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochrurus*); 27, putter (*Carduelis carduelis*); 28, boompieper (*Anthus trivialis*).

April (eerste data): 13, gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*), bergeend (*Tadorna tadorna*), sijsje (*Carduelis spinus*), kleine barmsijs (*Carduelis flammea cabaret*); 16, nachtegaal (*Luscinia megarhyncha*); 17, sprinkhaanrietzanger (*Locustella naevia*); 19, boerenzwaluw (*Hirundo rustica*); 20, koekoek (*Cuculus canorus*); 21, braamsluiper (*Sylvia curruca*), zwartkopgrasmus (*Sylvia atricapilla*); 25, tortel (*Streptopelia turtur*); 27, grasmus (*Sylvia communis*).

Mei (eerste data): 5, wielewaal (*Oriolus oriolus*); 7, gierzwaluw (*Apus apus*); 8, tuinfluitier (*Sylvia borin*).

Augustus (eerste data): 17, buizerd (*Buteo buteo*); 19, ortolaan (*Emberiza hortulana*); 23, lepelaar (*Platalea leucorodia*).

September (eerste data): 3, duinpieper (*Anthus campestris*).

October (eerste data): 5, putter (*Carduelis carduelis*), kleine barmsijs (*Carduelis flammea cabaret*); 9, bonte kraai (*Corvus cornix*); (laatste datum): 20, duinpieper (*Anthus campestris*).

Terugmeldingen

Ekster (*Pica pica*).

185481 (juv.) ○ 25/7'43, + ?/6'47. Bakkum (N.H.)

Spreeuw (*Sturnus vulgaris*).

D 60092 (juv.) ○ 15/6'46, + 15/9'47, Rotterdam

D 50183 ○ 15/7'44, + 31/1'47, Porfodes, Finistère (Fr.)

D 60440 ○ 2/7'46, + 10/4'47, South-end on Sea, Essex, (Eng.)

D 60710 ○ 21/10'46, + ± 10/3'47, Broomhall, Worc., Eng.

D 59448 ○ 4/11'45, + 26/4'47, Penkridge, Staffs, Eng.

D 60649 ○ 6/11'46, + 6/3'47, Stellendam

D 60390 ○ 1/7'46, + ± 25/2'47, Seaton, Cornwall, Eng.

D 49301 (♀) ○ 18/11'43, + 23/1'47, Zwartewaal

D 59304 ○ 30/10'45, + 1/2'47, Cherbourg, (Fr.)

D 49822 (juv.) ○ 7/7'44 + ?/10'46, Kiel (Antw.), België

Groenling (*Chloris chloris*).

F 21285 (juv. ♂) ○ 19/8'46, + 30/10'47, Loosduinen

F 26990 (♂) ○ 31/3'46, + 9/2'47, bij Cape Gris-Nez (Fr.)

F 26632 (♂) ○ 7/11'45, + ?/3'46, Kollum (Fr.)

F 17399 (♀) ○ 18/10'45, + 24/6'47, Voorburg (Z.H.)

Sijs (*Carduelis spinus*).

F 35448 (♀) ○ 6/10'47, + 12/10'47, Zandvliet, Antw. België

Kleine barmsijs (*Carduelis flammea cabaret*).

F 21068 ○ 5/4'46, + ± 21/10'46, Koolskamp, België

Kneu (*Carduelis cannabina*).

F 35302 (♂) ○ 25/9'47, + 1/10'47, Harelbeke, België

VANGSTEN VAN HET RINGSTATION „OCKENBURGH” in 1947.	AANTALLEN							
SOORTNAAM	♂	♀	?	juv.	♂ j.	♀ j.	Nest- j.	To- taal
Spreeuw, <i>Sturnus vulgaris</i>	373	347			3	4		727
Groenling, <i>Chloris chloris</i>	67	51						118
Putter, <i>Carduelis carduelis</i>	5	2						7
Sijs, <i>Carduelis spinus</i>	140	113						253
Barmsijs, <i>Carduelis fl. flammea</i>	1							1
Kl. barmsijs, <i>Carduelis fl. cabaret</i>		2						2
Kneu, <i>Carduelis cannabina</i>	99	101		62				262
Vink, <i>Fringilla coelebs</i>	252	161						413
Keep, <i>Fringilla montifringilla</i>	21	18						39
Ringmus, <i>Passer montanus</i>			12					12
Geelgors, <i>Emberiza citrinella</i>	25	23						48
Ortolaan, <i>Emberiza hortulana</i>	1							1
Rietgors, <i>Emberiza schoeniclus</i>	10	7						17
Leeuwerik, <i>Alauda arvensis</i>			8					8
Boompieper, <i>Anthus trivialis</i>			4				5	9
Graspieper, <i>Anthus pratensis</i>			38					38
Gele kwikstaart, <i>Motacilla flava</i>			2					2
Witte kwikstaart, <i>Motacilla alba</i>			2				8	10
Gr. vliegenvanger, <i>Muscicapa striata</i>			1				5	6
Tijftjaf, <i>Phylloscopus collybita</i>							6	6
Fitis, <i>Phylloscopus trochilus</i>			18					18
Grasmus, <i>Sylvia communis</i>			3					3
Zanglijster, <i>Turdus philomelos</i>							4	4
Gr. lijster, <i>Turdus viscivorus</i>			2				4	6
Tapuit, <i>Oenanthe oenanthe</i>	2							2
Roodborsttapuit, <i>Saxicola torquata</i>	1							1
Gekr. roodstaart, <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	5	4			5	2	12	28
Nachtegaal, <i>Luscinia megarhyncha</i>			3					3
Roodborst, <i>Erithacus rubecula</i>			1				16	17
Bastaard nachtegaal, <i>Prunella modularis</i>							3	3
Boerenwaluw, <i>Hirundo rustica</i>			1					1
Groene specht, <i>Picus viridis</i>	1							1
Gr. b. specht, <i>Dryobates major</i>	1							1
Ransuil, <i>Asio otus</i>							4	4
Smelleken, <i>Falco columbarius</i>		1						1
Boomvalk, <i>Falco subbuteo</i>	1							1
Torenvalk, <i>Falco tinnunculus</i>	3	3						6
Sperwer, <i>Accipiter nisus</i>	5	5						10
Bergeend, <i>Tadorna tadorna</i>							5	5
Scholekster, <i>Haematopus ostralegus</i>				1				1
Patrijs, <i>Perdix perdix</i>	1	1		3				5
	1014	839	95	66	8	6	72	2100

Vink (*Fringilla coelebs*).

F 11229 (♀) ○ 8/4'44, + 25/4'46, Ockenburgh en losgelaten; 1/2'47, dood-
gevonden te Négreville, Manche, (Fr.)

F 17318 (♂) ○ 16/10'45, + 13/6'47, Grundsunda, Vester Norrland, Zw.

Ringmus (*Passer montanus*).

F 21969 ○ 26/3'47, + 5/10'47, Kalloopolder, Antwerpen, België

Graspieper (*Anthus pratensis*)

F 21548 ○ 1/10'46, + 15/12'46, Guriezo, Santander, Sp.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

F 21211 ○ 10/7'46, + 5/5'47, Ockenburgh, in braakbal van ransuil.

Gierzwaluw (*Apus apus*).

D 49535 ○ 26/6'44, + 16/6'47, Den Haag

Torenvalk (*Falco tinnunculus*).

196709 (♀) ○ 21/10'46 + 2/1'48, Den Haag

196776 ○ 14/7'44 + 17/2'47, Dordrecht

Kapmeeuw (*Larus ridibundus*).

187739 ○ 15/1'41 + 6/6'46, Kaparen, Esbo, Schärenhof

Terugvangsten

Kneu (*Carduelis cannabina*)

F 23391 ○ 13/7'47, Hoek v. Holland, + 5/10'47, Ockenburgh

Vink (*Fringilla coelebs*).

F 41296 (♂ ad.) ○ 15/11'47, Loosduinen, + 18/11'47, Ockenburgh

Keep (*Fringilla montifringilla*).

F 46240 (♀ juv.) ○ 18/10'47, Loosduinen, + 18/10'47, Ockenburgh

Buizerd (*Buteo buteo*) lichte phase.

102529 ○ 7/9'47, Loosduinen, + 3/10'47, Ockenburgh

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 21

DOOR

C. G. B. TEN KATE

***Corvus cornix* — Bonte kraai.**

Met zweedse ring, in Noord-Holland.

Stockholm, T.A. 6201, ○ ad. 29 April '46, Klastorp, kerspel Nydala, Småland,
± 49 km Z. van Jönköping, + 18 Febr. '47, Zwaagdijk. (Museum Leiden)

***Sturnus vulgaris* — Spreeuw.**

Duitse, in Gelderland.

Helgoland, 612 1217, ○ juv. 23 Mei '44, Beckum, Westfalen, + (geschoten)
22 Juli '44, Elst. (Museum Leiden).

Met engelse ring, in Friesland.

London, X, 5071, ○ ad. 21 Febr. 47, Shrewsbury, + 2 April '47, Welsrijp. (3)

***Carduelis spinus* — Sijsje.**

Met belgische ring, in Noord-Brabant.

Bruxelles, 13A.9927, ○ ad. 20 Oct. '46, Wortel, prov. Antwerpen, + (gevangen)
23 Oct. '46, Baarle-Nassau. (1)