

In 1948 geringde vogels en hun aantal*)

(samengesteld door H. W. C. COSSEE)

Woudaapje	42		Draaihals	1	
Roerdomp	1		Groene specht	2	
Ooievaar	5		Grote bonte specht	3	
Bergeend	1		Kleine bonte specht	1	
Wilde eend	201	(3)	Boerenzwaluw	247	(9)
Krakeend	6		Huiszwaluw	8	
Wintertaling	375		Oeverzwaluw	64	(79)
Zomertaling	67		Zwaluw (spec ?)		(1)
Taling (spec?)	1		Grote lijster	122	(3)
Smient	74	(1)	Zanglijster	91	(3)
Pijlstaart	2		Koperwiek	3	
Slobeend	15	(1)	Merel	222	
Bruine kuikendief	25		Tapuit	3	
Havik	6	(17)	Paapje	281	
Sperwer	43	(6)	Roodborsttapuit	27	
Buizerd	7	(1)	Gekraagde roodstaart	318	(6)
Slechtvalk	2		Zwarte roodstaart	38	(1)
Boomvalk	3		Nachtegaal	77	(5)
Smelleken	2		Blauwborst		(1)
Torenvalk	67	(16)	Roodborst	54	(7)
Patrijs	8		Heggemus	61	(5)
Fazant	1		Grasmus	94	
Waterhoen	7		Braamsluiper	14	
Meerkoet	1		Tuinfluit	57	
Strandpluvier	20		Zwartkop	12	
Bontbekpluvier	3		Tjiftjaf	23	(2)
Kleine pluvier	6		Fitis	144	
Kievit	845	(7)	Sprinkhaanrietzanger	8	
Scholekster	164	(2)	Grote karekiet	42	
Kluut	45		Kleine karekiet	76	
Bonte strandloper	1		Karekiet (spec ?)	12	
Kemphaan	8		Bosrietzanger	5	
Oeverloper	1		Rietzanger	23	
Tureluur	28	(1)	Spotvogel	71	
Grutto	39	(1)	Winterkoning	40	(1)
Wulp	21		Grauwe vliegenvanger	139	
Kleine mantelmeeuw	2		Bonte vliegenvanger	209	
Zilvermeeuw	43		Kuifleeuwerik	13	(4)
Stormmeeuw	12		Boomleeuwerik	43	
Kapmeeuw	519	(14)	Leeuwerik	101	(50)
Visdiefje	308		Boompieper	68	(7)
Grote stern	20		Graspieper	64	(40)
Dwergstern	14		Gele kwikstaart	40	(6)
Zwarte stern	84		Witte kwikstaart	61	(17)
Houtduif	48	(2)	Rouwkwikstaart	1	
Kleine bosduif	15	(3)	Pestvogel		(2)
Tortelduif	10		Roodkopklauwier	8	
Koekoek	10	(1)	Grauwe klauwier	13	(2)
Kerkuil	6	(2)	Baardmannetje	1	
Ransuil	9	(1)	Koolmees	903	(22)
Velduil	1		Pimpelmees	115	(13)
Steenuil	2	(1)	Kuifmees	9	
Nachtzwaluw	2		Matkop	8	
Gierzwaluw	10	(1)	Zwartkopmees (spec?)	3	

*) De tussen haakjes geplaatste getallen betreffen nagekomen opgaven.

Staartmees	16		Huismus	7	(2)
Mees (spec ?)	24		Ringmus	670	(54)
Boomkruiper	8		Europ. kanarie	5	(76)
Boomklever	14		Goudvink	11	
Goudhaantje	4		Groenling	822	(78)
Vuurgoudhaantje	1		Geelgors	177	(41)
Bonte kraai	1		Ortolaan	4	(1)
Zwarte kraai	10		Rietgors	96	(1)
Roek	4		Sneeuwgors	29	
Kauw	26	(8)	Onbekend	20	(1)
Ekster	17		<i>Puffinus gravis</i> ¹⁾	2	
Vlaamse gaai	5	(1)	<i>Pterodroma mollis</i> ¹⁾	1	
Spreeuw	11354	(51)	<i>Pachyptila vittata</i> ¹⁾	3	
Wielewaal	30		<i>Fregetta grallaria</i> ¹⁾	2	
Vink	3202	(395)			
Keep	226	(48)	Totaal	26115	(1752)
Putter	62	(47)			
Sijs	926	(5)			
Frater	51	(1)			
Barmsijs	275	(1)			
Kleine barsijs	4				
Kneu	717	(575)			

¹⁾ Geringd door Dr G. J. BROEK-
HUISEN op de Tristan da Cunha-
groep.

A new race of *Turdus viscivorus* Linnaeus from the western Palaearctic

BY

P. A. CLANCEY

(Glasgow)

Writing in the 'Bulletin of the British Ornithologists' Club', vol. 66, 1946, pp. 28—29, I drew the attention of other workers to the fact that certain differences exist between Scottish Mistle Thrushes and topotypical *Turdus viscivorus viscivorus* Linnaeus, 1758: Essex, England. Recently, additional material from many other parts of the British Isles has been examined and it is now evident that the populations of western Ireland, Scotland, Isle of Man, and, perhaps, the mountainous regions of Wales and north-western England, form a reasonably homogeneous racial unit deserving of recognition as a new subspecies.

Turdus viscivorus precentor subsp. nov.

Description: Similar to *T. v. viscivorus* but separable in series by the darker, more greyish brown, tone of the upper-parts; under-parts generally noticeably more densely spotted with appreciably blacker spots; ground-colour of under-parts variable, but frequently deeper in tone on the breast; wings and tail darker.

Distribution: At present only known from western, central and southern Scotland, western Ireland, and Isle of Man (1 only).

Type: Male, adult. Darnley, East Renfrewshire, S.W. Scotland. 15 October, 1937. In the CLANCEY collection.