

- p. 318: *Anas crecca* 207167, geschoten 24-2-1949 en niet 24-2-1948.
 p. 320: *Anas crecca* 213412, geschoten te Brideswell, Co. Roscommon, Ierland en niet Somerset, Engeland.
 p. 321: *Anas crecca* 209808, geringd op 1-8-1947 en niet 1-8-1947.
 p. 323: *Falco subbuteo* 229791, betreft vermoedelijk *Falco columbarius*.
 p. 324: *Fulica atra* 138420, geringd te Hemelum Fr. en niet te Hemelen Fr.
 p. 325: *Vanellus vanellus* 191749, 23-6-1946 geringd te Jisp en ca 23-12-1948 gevonden te Taza, Fr. Marokko vervalt.
 p. 329: *Sturnus vulgaris* D 40220, dood gevonden te Cardiff en niet te Barcliff.

Ringverslag XXXVI (Limosa 24, 1951):

- p. 27: *Ardea cinerea* 222798, geringd 20-5-1949 en niet 20-5-1948.
Ardea cinerea 122731, moet zijn: 222731.
 p. 30: *Anas crecca* 182768, toevoegen Tralee 52° 13' N; 10° 8' W.
Anas crecca 178705, toevoegen Philipstown.
Anas crecca 210793, toevoegen Borrisokane, 52° 59' N.; 8° 7' W.
 p. 31: *Anas crecca* 213431, Knowsthorpe, 2 mijl ten ZO. van Leeds geschoten en niet Knostrop.
 p. 33: *Anas querquedula* 227086, geschoten te Portlaoghise, Maryborough en niet te Portlaoize.
 p. 41: *Phoenicurus ochrurus gibraltariensis* F 30566, moet zijn *Carduelis cannabina* (L.) ♀ ad.
 p. 45: *Sturnus vulgaris* D 75324, dood gevonden te Nupend en niet te Nufend.
 p. 46: *Sturnus vulgaris* D 74570, dood gevonden te Troon en niet te Iroon.
 p. 47: *Fringilla coelebs* F 59034, teruggemeld als *Carduelis spinus*.
 p. 48: *Fringilla montifringilla* F 30967, moet zijn *Carduelis cannabina* (L.) ♂ ad.

Ringverslag XXXVII (Limosa 24, 1951):

- p. 114: *Anas platyrhynchos* 21917, moet zijn 219174.
 p. 125: *Anas querquedula* 206074, geschoten in Mei 1948 en niet in Mei 1947.
 p. 128: *Vanellus vanellus* 217417, geringd te Reeuwijk en niet te Oudwoude.
 p. 129: *Vanellus vanellus* 192046, geringd op 7-6-1949 en niet op 7-6-1950.
Vanellus vanellus 217364, geringd op 27-11-1949 en niet op 27-11-1950.

Korte mededelingen

Halfvolgroeide waterrat, opgespietst door grauwe klauwier (*Lanius collurio*).

Naast mijn tuin (in Edegem-Antwerpen) broedt regelmatig de grauwe klauwier. Toen ik op 7 Augustus 1951 's namiddags in mijn tuin kwam, vond ik een halfvolgroeide waterrat vastgespietst aan een droge twijg van een ligusterstruik. De scherpe punt van de droge twijg was diep in de keel van het slachtoffer gedrongen, dat levend aan de spits geregen werd, gezien het feit dat er een bloedige streep overlangs op de keel van het slachtoffer te zien was, waarbij het bewezen was dat het dier, na aan de spits gehecht geweest te zijn, nog over en weer moet gekronkeld hebben. Het lichaam van de waterrat was nog gans slap en warm toen ik het vond, terwijl het bloed nog uit de keelwonde vloeide en de waterrat nog maar pas dood kon zijn. Het dier hing ongeveer een meter boven de grond. Het is volstrekt uitgesloten dat de waterrat door iets of iemand anders dan de grauwe klauwier aan de tak gespeten

werd. Het nest van deze laatste, met vlugge jongen, bevond zich slechts op een vijftal meters afstand van de ligusterstruik. Dat een grauwe klauwier zich durfde vergrijpen aan een prooi van zulk formaat en het feit, dat hij de overhand hield in een gevecht dat onvermijdelijk moet plaats gehad hebben, daar de waterrat er absoluut niet ziek uit zag, verwondert mij ten zeerste en stellig moet het de vogel grote moeite gekost hebben om het dier op de plaats te brengen waar het hing. Dat de grauwe klauwier kleine prooien, zoals kevers en libellen, vast hecht, is bekend, maar nooit heb ik gehoord van een prooi van zulke grootte.

Edegem-Antwerpen, 19 Febr. 1952.

A. VAN DER AA.

[In WITHERBY, Handbook, I, p. 294, worden als zoogdieren-prooi vermeld: veldmuizen, spitsmuizen, jonge rosse woelmuizen en een vleermuissoort (t. K.).]

Winter-broedgevallen van de velduil (*Asio flammeus*).

De jachtopziener C. SPAANS vond tijdens het jagen op 18 December 1951 in de Noordoostpolder het nest van een velduil met 7 eieren en 1 pas geboren kuiken. Een der zeven eieren was ook reeds aangepikt. Het nest lag in een lucernestoppelveld en is later verlaten.

Op 28 December vond hij een ander nest op dezelfde kavel, met 2 dode kuikens en 2 eieren. Daar de uilen nog erg druk waren, ging hij in de omtrek zoeken en vond toen 2 donsjongen van circa 14 dagen oud.

Bergen, N.H., 8 Maart 1952.

A. ERIKS.

[In de mij ter beschikking staande recente handboeken en verdere ornithologische werken uit ons eigen land, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Engeland, Denemarken, Zweden en Noorwegen wordt geen enkel winterbroedgeval vermeld. Maart is de vroegste maand (WITHERBY, Handbook, II, p. 333: "exceptionally early April or even end of March"), terwijl één Engelse auteur ook Februari noemt (T. A. COWARD, The birds of the British Isles and their eggs, 1921, 3e druk, I, p. 295: "Nests were also found so early as February though April is the usual time of laying"), maar dit werd niet overgenomen in het Handbook, l.c.

De sindsdien verschenen ornithologische tijdschriften werden hierop niet door mij geraadpleegd. Beide winterbroedgevallen werden mij ook bevestigd door Dr D. BAKKER, chef van de Plantkundige afdeling van het N.O. Polder Laboratorium te Kampen, die door een buitenlandse studiereis verhinderd is zelf over deze aangelegenheid te schrijven. (t.K.).]

Albino kleinste strandloper (*Calidris temminckii*).

Op 17 Mei 1952 zag ik aan een poeltje op een opspuitveld in de Amsterdampolder een vrijwel witte kleinste strandloper; slechts de kleine vleugeldekveren waren normaal gekleurd. De snavel was rood, de ogen echter donker.

De vogel was in gezelschap van een achttal andere kleinste strandlopers. Bij het opstoten daarvan sloot hij zich echter daarbij niet aan, maar drukte zich, waarbij het loopbeen op de bodem komt te rusten. Het geluid was zuiver van een kleinste strandloper. Tijdens het voedselzoeken hield de vogel zich eveneens afzijdig van zijn soortgenoten.

Waarschijnlijk hield hij zich hier al langer op en werd volgens mededelingen van N.J.N.-ers ook in de Sloterdijkmeerpolder waargenomen.

Amsterdam, Juni 1952.

J. E. SLUITERS.

Summary of Short Notes.

1. Half full-grown water-vole pinned up by Red-backed Shrike (*Lanius collurio*).

On 7 Aug. 1951 a half full-grown water-vole, still, fresh, was found pinned up on a privet-bush in a garden at Edegem-Antwerpen, Belgium. The nest of a Red-backed Shrike with grown-up young ones was at only 5 meters' distance.

2. Winter-breeding cases of Short-eared Owl (*Asio flammeus*) in the Netherlands.

On 18 December 1951 a nest of *Asio flammeus* with 7 eggs and 1 newly hatched young one was found in the "Noordoostpolder", a reclaimed part of the former Zuiderzee. On 28 December 1951 a second nest was found in the same surroundings, with 2 dead young ones and 2 eggs; in the neighbourhood 2 young ones of about 14 days of age, still alive, were found.

3. Albino Temminck's Stint (*Calidris temminckii*) near Amsterdam.

On 17 Mei 1952 near Amsterdam a practically white Temminck's Stint was seen; only the small wings-coverts were of normal colour. The bill was red, the eyes however dark.

Necrologie

In memoriam H. C. SIEBERS.

In den laten avond van 8 October 1949 overleed te Bussum, waar hij als gepensionneerd Oost-Indisch Ambtenaar woonde, geheel onverwachts ons vroegere mede-lid H. C. SIEBERS, die destijds reeds zeer kort na de oprichting in 1911 tot de Club van Vogelkundigen was toegetreden.

Hendrik Cornelis SIEBERS werd 6 Januari 1890 te Soerabaja geboren, waar zijn vader Hoofdingenieur aan de Marinewerf was, en reisde als 6-jarig kind naar Nederland, waar hij in 1907 zijn eind-examen H.B.S. en in 1909 het Staats-examen behaalde, dat hem