

Korte Mededelingen

Aanvullingen op het artikel van Dr. J. VERWEY over vogels in de Waddenzee bij strenge vorst (Ardea 44, p. 218—224).

Waarnemingsgebied : Waddenzee bezuiden Hoorn tot Boschplaat. In dit gebied maakte ik gedurende de vorstperiode van februari 1956 verscheidene tochten langs de kust en over het ijs voor waarnemingen in een grote strook open water die zich tot het eind van de vriestijd handhaafde.

Vóór half februari wijzigde de vogelbevolking zich steeds. De vorst viel op Terschelling in op 28 januari, maar de steltlopers namen al vanaf 25 januari opvallend af en verdwenen vóór 12 februari bijna geheel. Na de inval van de dooi op 28 februari duurde het nog tot 20 maart voordat het aantal steltlopers weer normaal was.

Meeuwen bleven er gedurende de vorst veel, zowel bij het water als op de ijsvlakten en op het eiland. Het waren vooral Zilvermeeuwen en Stormmeeuwen. De laatste waren belangrijk talrijker dan Kokmeeuwen. Tegen eind februari trokken alle meeuwensoorten steeds meer naar het eiland.

Het aantal eenden nam eerst gestadig af, maar werd na 16 februari vrij plotseling aangevuld met zoetwatereenden, zeeëenden en Eiders. De temperatuur was van 13—15 februari zeer laag, het weer was ruw en van 12—16 februari viel iets minder dan 60 cm sneeuw. Hierdoor was nergens op het land meer voedsel te krijgen. De Smienten verdwenen in deze tijd bijna geheel.

Vanaf 19 februari tot het einde van de vorstperiode bleef het totaal aantal vogels in het open water vrijwel constant, met dien verstande dat het aantal Eidereenden wisselend was ; de Zwarte Zeeëenden namen gestadig toe en in de laatste vorstweek stierven veel Toppers en Kuifeenden. Op de Noordzee zag ik in die tijd geen Eiders meer voor de kust, zeeëenden waren er echter veel, ze zaten veel dichter onder de kust dan gewoonlijk.

Tellingen voor het open water bezuiden Hoorn tot de Rimkerkooi tussen 15 en 28 februari gaven het volgende resultaat :

Eidereend	1800	Zwarte Zeeëend	tot 2000
Topper	1600	Grote Zeeëend	50
Kuifeend	300	Middelste Zaagbek	200
Tafeleend	150	Bergeend	200
Brilduiker	100		

Verder enkele Wintertalingen, Wilde Eenden, Smienten en Pijlstaarten.

Af en toe werden enkele Scholeksters gezien.

Toen het ging dooien, kwamen vele Toppers, Kuifeenden en Zwarte Zeeëenden en enkele Zaagbekken en Tafeleenden bijeen in de binnendijkse smeltwaterplassen. Naderhand in het ijs gevonden vogels bleken vooral Toppers te zijn.

J. TANIS.