

Verslag van de Wetenschappelijke Vergadering van de
Nederlandse Ornithologische Unie in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen te Amsterdam op 19 januari 1957
te 15.30 uur

Aanwezig zijn dezelfde personen als tijdens de onmiddellijk hieraan voorafgegane huishoudelijke vergadering, alsmede minstens 21 later aangekomen leden en 17 genodigden en introducés, in totaal minstens 170 personen.

De voorzitter, Prof. Dr. L. F. DE BEAUFORT, opent de vergadering en geeft direct het woord aan de heer J. P. STRIJOS voor het vertonen van kleurenprojectie en een kleurenfilm van een in de zomer van 1956 gehouden tocht naar Spitsbergen. Tot de meest boeiende gedeelten behoren de opnamen van een paar broedende Kleine Rietganzen (*Anser fabalis brachyrhynchus*) tegen een imposant gletscher-landschap, een paar Rotganzen (*Branta bernicla hrota*) met jongen aan een ruwe, verbrokkelde rotskust, het eerste op Spitsbergen gevonden nest van de Bontbekpluvier (*Charadrius hiaticula* subsp.) met eieren en volwassen vogels, alsmede de op Spitsbergen zeer zeldzame Kleinste Jagers (*Stercorarius longicauda*). De vertoning ondervindt veel bijval en wordt met een dankwoord door de voorzitter gesloten. Na afloop van de vergadering wordt in de grote hal van het instituut door het bestuur een thee aangeboden.

K. H. VOOS, secretaris.

Verslag van de vergadering van de Oekologische Sectie
op zaterdag 9 maart 1957 in het Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie te Leiden

Wanneer de voorzitter (Dr. H. KLOMP) om 11.30 uur de vergadering opent, zijn ongeveer 40 leden aanwezig. Er blijkt enige verwarring te bestaan over de vraag of de Oekologische sectie nu een onderdeel is van de Nederlandse Ornithologische Vereniging of van de Nederlandse Ornithologische Unie.

Als eerste spreker treedt op Dr. H. N. KLUYVER met een voordracht over: De slaappleatskeuze en de mortaliteit van de Koolmees. Koolmezen slapen in de winter veel in nestkasten. Het blijkt nu, dat men bij avondcontroles altijd meer slapende ♂♂ dan ♀♀ vindt. Dit verschil is zo groot, dat het niet alleen het gevolg kan zijn van een eventueel overwegen der ♂♂ in de populatie. De Koolmezen kabbelen om de beste slaappleatsen, en hierbij domineren de ♂♂. Spreker vermoedt, dat dit één van de factoren is, die het verschil in de gemiddelde levensduur der sexen, dat in het nadeel