

richting over land aan kwam vliegen en zich onder de Zwarte Sterns in genoemd reservaat voegde.

Op 24 juni werd opnieuw een Witvleugelstern waargenomen op dezelfde plaats. Nu vertoefde de vogel boven de broedkolonie van de Zwarte Sterns, waar de vogel meedeed aan de schijnaanvallen van de aldaar broedende sterns. De roep was duidelijk te horen en week opnieuw zeer af van die der Zwarte Sterns. De vogel riep namelijk herhaaldelijk: rap... rup! Na 24 juni werd de vogel niet meer waargenomen.

Mededeling van het R.I.V.O.N. (Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud).

Zomerwaarneming van Witvleugelstern (*Chlidonias leucopterus*) aan de Maas bij Venlo.

Toen wij op zondag 26 mei 1957, na een bezoek aan „De Hamert” 14 km ten Noorden van Venlo, om ca 9 uur 's morgens aan de Maas kwamen, zagen we daar 4 sterns, die met de stroom mee, dus in Noordelijke richting, vlogen. Door onze kijkers konden we hen zeer goed waarnemen en hoewel we eerst aan Zwarte Sterns dachten, vielen ons in tegenstelling met de zwarte romp toch duidelijk de witte stuit en lichte vleugels op. Na de Vogelgids geraadpleegd te hebben, bleek ons, dat het vliegbeeld zuiver overeenkwam met de afbeelding van de Witvleugelstern.

L. GEERAEDTS en L. VAN DEN HOMBERGH,
Controleurs Vogelwet.

Summary: New summer-records of the White-winged Black Tern (*Chlidonias leucopterus*) in the Netherlands.

On May 21st and June 24th, 1957 a specimen of the White-winged Black Tern was seen in the Zwartemeer-reserve, Province of Overijssel, Netherlands. The second time the bird was attacking above a colony of Black Terns together with the inhabitants of this colony. On May 26th, 1957 a couple of 4 specimens was seen above the river Meuse in the Northern part of the Province of Limbourg, Netherlands, flying in a Northern direction.

Verslag van de N.O.V.-excursie naar Harderwijk en omgeving op 11 mei 1957

In de middag verzamelden zich 30 leden voor het station Harderwijk om per bus en onder leiding van de heer A. A. TJITTES een excursie te maken naar de bossen van Leuvenum en Drie. Op enige plaatsen werd de bus verlaten en achtereenvolgens bezocht men de horst van een Buizerd (*Buteo buteo*) en een Havik (*Accipiter gentilis*). De Buizerd werd even gezien, maar verdween als een schim. De Havik liet zich beter zien en kwam alarmerend tegelijkertijd met een ♀ Torenavalk (*Falco tinnunculus*) over. Aardig was het nest van een Bosuil (*Strix aluco*) in een holle boom op slechts

1 m hoogte, zodat men het vrij grote jong bijzonder goed kon observeren. Nu en dan regende het flink, maar tijdens de korte wandelingen lieten zich toch de verschillende mezensoorten [o.a. Glanskop (*Parus palustris*)] en ook zingende Goudhaantjes (*Regulus regulus*) horen. Een bijzondere attractie was voor het laatst bewaard. In de tuin van mevrouw HENKES te Harderwijk konden de deelnemers prachtig een broedende Turkse Tortel (*Streptopelia decaocto*) bewonderen, die vlak bij het huis zijn nest in een spar had gebouwd. Merkwaardig was dat in dezelfde boom een paartje Witte Kwikstaarten (*Motacilla alba*) druk bezig was met het bouwen van een nest. Ten overvloede zaten vlak bij op een lichtmast nog 2 Turkse Tortels, zodat ieder deze soort zeer grondig kon bekijken.

Verslag N.O.V.-excursie naar Delden op 12 mei 1957.

Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag een excursie te maken naar het randmeer aan de noordzijde van de Veluwe, was op het laatste ogenblik hiervan afgezien, daar er hier ditmaal weinig op ornithologisch gebied te beleven viel. In plaats daarvan ging de tocht naar Delden, waar een groep bekende avifaunisten niet minder dan 3 paren van de Middelste Bonte Specht (*Dendrocopos medius*) had geconstateerd. Een bus met 26 leden vertrok om half negen uit Harderwijk, nadat een matineuze voorzitter in alle vroegte o.a. een Noordse Gele Kwikstaart (*Motacilla flava thunbergi*), een ♀ Nonnetje (*Mergus albellus*) en een Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) bij de Knardijk had waargenomen.

Direkt na aankomst in Delden liet een paartje Goudvinken (*Pyrhula pyrrhula*) zich prachtig zien. Later op de dag werd door één van de leden het nest met 5 eieren gevonden en kon men het ♂ waarnemen dat het ♀ voerde. Een eerder gevonden nest van de Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) bleek helaas te zijn uitgehaald. Later werd echter een Appelvink betrapt, bezig zijn nestjongen te voeren. Bij de eerste nestholte van de Middelste Bonte Specht stelde het gezelschap zich vol verwachting op, maar slechts om een Spreeuw uit de nestholte te zien komen. Ook in het tweede en derde territorium lieten de Middelste Bonte Spechten zich niet zien, hetgeen uiteraard aanleiding gaf tot enig commentaar op de bekende avifaunisten. De wandeling door het prachtige bos van Twickel en de omgeving van Delden was een genot. Gezien en gehoord werden o.a. Gekraagde en Zwarte Roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus* en *Ph. ochrurus*), Nachtegaal (*Luscinia megarhynchos*), Wielewaal (*Oriolus oriolus*), Zwartkop (*Sylvia atricapilla*), veel Fluïters (*Phylloscopus sibilatrix*), Tuinfluiter (*Sylvia borin*), Fitis (*Phylloscopus trochilus*), Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*), Grauwe en veel zingende Bonte Vliegenvangers (*Muscicapa striata* en *M. hypoleuca*), Boomklever (*Sitta europaea*), Ook enkele hollen van Zwarte Spechten (*Dryocopus martius*) werden bezocht, maar de vogels niet gezien. Het viel op, dat in de Twickelse bossen zich veel Kauwen (*Corvus monedula*) en Spreeuwen (*Sturnus vulgaris*) op-