

hielden. Een Grote Gele Kwikstaart (*Motacilla cinerea*) met vliegvlugge jongen was voor velen een niet alledaagse waarneming. In de tuin van de familie VAN ECK werd het nest van een Vuurgoudhaantje (*Regulus ignicapillus*) bewonderd, het lukte echter niet de oude vogels te zien te krijgen, hoewel de zang door enige leden werd gehoord. In dezelfde tuin bevond zich een mooi nest van de Staartmees (*Aegithalos caudatus*) in een takvork en eveneens het nest van een Vink (*Fringilla coelebs*) met 7 eieren. In de namiddag vertrok het gezelschap, uiterst voldaan over het vele, dat men gezien en gehoord had, weer per bus naar Harderwijk.

B. VAN KOERSVELD

Excursie van de afdeling Club van Nederlandse Vogelkundigen, in de omgeving van Weert op 25 en 26 Mei 1957.

Zaterdag 25 mei 1957 om 14 uur namiddag verzamelden enige leden zich in hotel Juliana te Weert voor een excursie in de omgeving dier stad. Weliswaar stond de zon die dag stralend aan de hemel, maar een straffe noordwestwind werd toch minder geapprecieerd en bemoeilijkte de waarnemingen toch zeer.

De tocht, waaraan door een twaalfstal leden werd deelgenomen, ging allereerst naar het „Areven”, een uitgestrekt complex eikebomen, hakhout en weiland onder de gemeente Stamproy.

Reeds onmiddellijk bij onze aankomst zagen wij er de Torenvalk (*Falco tinnunculus*), die in dit gebied reeds jaren geregelde broedvogel is. Bij onze wandeling door dit fraaie landschap hoorden we er vrijwel onophoudelijk de Wielewaal (*Oriolus oriolus*) en de roep van de Koekoek (*Cuculus canorus*) was er ook niet van de lucht. Hoewel dit gebied een prachtig zangvogeloorde is, kwam tengevolge van de harde wind de soortenrijkdom van dit terrein niet tot zijn volle recht. Wel liet de Spotvogel (*Hippolais icterina*) zich horen, zong er de Merel (*Turdus merula*) en zagen we er o.m. de Koolmees (*Parus major*), Pimpelmees (*Parus caeruleus*), Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*), Braamsluiper (*Sylvia curruca*) en Grasmus (*Sylvia communis*), alsook Gaaien (*Garrulus glandarius*), Geelgorzen (*Emberiza citrinella*) en een Boompieper (*Anthus trivialis*).

Na het beëindigen van onze tocht door deze dreven werd een bezoek gebracht aan het landgoed „De Krang” te Weert, Zwartbroek, om te trachten er de Fluiter en de Ortolaan waar te nemen. De gezochte vogels lieten echter verstek gaan, zodat we ons vervolgens naar Elburg begaven, een enige hectaren groot eikebos, broedplaats van de Groene en de Grote Bonte Specht, Bosuil, Goudvink, Nachtegaal en tal van andere vogels.

Al dadelijk toen wij bij dit landgoed aankwamen, vloog er een Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*) over. De Grote Karekiet, die we langs de oevers van het kanaal Nederweert—Wessem zochten, kregen we tengevolge van de felle wind niet te zien. Wel vloog er een

Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) over de vaart. Tijdgebrek maakte het noodzakelijk voor die dag de excursie te beëindigen.

Zondag 26 mei daaropvolgende trad ook in het weer geen verbetering op. Om half negen verzamelden zich $\pm$ 30 deelnemers op het oude marktplein van Weert, de z.g. „Korenmarkt”, waar zich reeds in de middeleeuwen, toen deze plaats een vestingstad was, de herbergen bevonden, waar de vreemdelingen op hun tocht door Kempen en Peel „uitspanden”.

Allereerst werd die morgen een bezoek gebracht aan een der broedplaatsen van de Turkse Tortel (*Streptopelia decaocto*) in een der wijken van de stad. In een in de vroege ochtenduren nog stille straat werden de auto's geparkeerd. We behoeften hier niet lang op de gezochte soort te wachten. Al dra streek een exemplaar, hetwelk uit een park in de omgeving kwam gevlogen, neer op een televisie-antenne van een woning in onze onmiddellijke nabijheid. Het liet zich keurig observeren tot een tweede duif ter plaatse verscheen, waarna beide weer wegvlogen, hetgeen echter niet verhinderde, dat we ze daarna nog meermalen tussen de beuken en langs de gebouwen van het aangrenzende gebied zagen rondvliegen.

Aangezien het een uitgesproken wens van sommige deelnemers was het Blauwborstje te kunnen waarnemen, werd de tocht voortgezet naar het zuidelijk van Weert, langs de Zuid Willemsvaart gelegen landgoed „Beauchamp”, een prachtig park met hoge forse bruine beuken, populieren, eiken, berken en coniferen. Hier hoorden we het gekoer van Houtduif (*Columba palumbus*), Holenduif (*Columba oenas*) en Tortel (*Streptopelia turtur*), zodat we in een korte spanne tijds al onze inlandse duivensoorten hadden ontmoet. In een tuinvaas werd het nest van een Koolmees (*Parus major*) ontdekt, propvol met jongen. Ook hier hoorden we de zang van de Wielewaal (*Oriolus oriolus*). Matkopmezen (*Parus atricapillus*) lieten zich horen, terwijl een Staartmezenfamilie (*Aegithalos caudatus*) roepend tussen de heesters rondvloog. Merels (*Turdus merula*) zagen we er betrekkelijk veel en we hoorden er verder o.m. nog de Zanglijster (*Turdus philomelos*), Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*), Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*) en Fitit (*Ph. trochilus*).

Op zoek naar het Blauwborstje werd nog een eindweegs langs de Zuid Willemsvaart in zuidelijke richting gewandeld tot nabij een moerassig perceel, dicht begroeid met gagel en vuilboom. Hier zagen we wel de Rietgors (*Emberiza schoeniclus*) en de Kleine Karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*), maar de gezochte, die hier dit terrein toch steeds als broedplaats koos, vertoonde zich niet.

Onder deze bedrijven door ontdekte men plotseling hoog in de lucht een Roerdomp (*Botaurus stellaris*), die langzaam vliegend in zuid-oostelijke richting verdween. De hoge vlucht van deze vogel, laat in de voormiddag, trok wel zeer de aandacht. Later kwam er nog een Blauwe Reiger (*Ardea cinerea*) overvliegen, evenals Kieviten (*Vanellus vanellus*), Wulpen (*Numenius arquata*) en Grutto's (*Limosa limosa*).

Het Blauwborstje (*Luscinia svecica*) stelde ons echter niet helemaal teleur, want aan de overzijde van de vaart zagen we een exemplaar vanuit de top van een berkje opvliegen om met een boog telkens daarna weer terug te keren.

Vervolgens begaven we ons naar de terreinen van de N.V. Kempensche Zinkmaatschappij te Dorplein-Budel, een zeer mooi gebied met een viertal vennen, afgewisseld met drassige heiden, bossen en weiden.

Boven het ringselven zeilde een Bruine Kuikendief (*Circus aeruginosus*). Links en rechts van de weg naar de fabrieksgebouwen broedden talrijk Kokmeeuwen (*Larus ridibundus*) en aan de rand van een der kolonies broedde nu voor de tweede maal in opeenvolgende jaren de Zilvermeeuw (*Larus argentatus*), een merkwaardig broedgeval zover in het binnenland. In 1955 broedde deze soort voor het eerst in de Ospeler Peel, daarna in 1956 en 1957 in deze omgeving. Hier was ook een broedplaats van Visdiefjes (*Sterna hirundo*), die we reeds tijdens onze tocht langs de Zuid Willemsvaart boven dit kanaal hadden waargenomen.

Daarna begaven we ons naar het Choorven, hetwelk in de nabijheid van de Belgische grens is gelegen. Een Boomvalk (*Falco subbuteo*), die aan de rand van een dennebos was gezeten, vloog haastig weg. Ook hier hoorden we de roep van Wulp (*Numenius arquata*) en Grutto (*Limosa limosa*) en zagen we de rode vorm van de Koekoek (*Cuculus canorus*). En weer was het het Witgesterd Blauwborstje (*Luscinia svecica*), dat aller belangstelling vroeg. Uit de rietborder langs het ven klonk de zang van de Sprinkhaanrietzanger (*Locustella naevia*) terwijl ook het geluid van de Snor (*L. lusciniioides*) werd gehoord. Op het ven zwom een Fuut (*Podiceps cristatus*) met dons-jongen en werd ook een Sperwer (*Accipiter nisus*) waargenomen. Na al deze belevenissen reden we naar de foyer van het ontspanningsgebouw der N.V. Kempensche Zinkmaatschappij, waar ons namens de Directie een door allen zeer gewaardeerde kop koffie werd geoffreerd.

Het middaguur was inmiddels gepasseerd en ter verdere afwerking van het excursie-programma begaven we ons naar Roggel voor een bezoek aan de broedplaats van de Draaihals. Nabij Nederweert kwam de autokaravaan plotseling tot stilstand toen men een vliegende Ooievaar (*Ciconia ciconia*) had waargenomen, welke langzaam cirkelend in oostelijke richting verdween. Te Roggel liet de in een nestkastje broedende Draaihals (*Jynx torquilla*) zich wel horen, maar ondanks veel geduld mocht het gezelschap er niet in slagen deze vogel te observeren. Daarop zetten we de tocht voort naar de Ospeler-Peel, een schitterend landschap met duizenden broedende Kokmeeuwen (*Larus ridibundus*) en verder Visdiefjes (*Sterna hirundo*), Zwarte Sterns (*Chlidonias niger*), Zomer- en Wintertalingen (*Anas crecca* en *querquedula*), Slobeenden (*Spatula clypeata*) en Wilde Eenden (*Anas platyrhynchos*), Graspiepers (*Anthus pratensis*) en Rietgorzen (*Emberiza schoeniclus*). De Peel had zich prachtig getooid met uitgestrekte velden van wollegras,

die nu zo ver als het oog reikte, golfd en onder invloed van de krachtige wind.

Een jonge Ransuil (*Asio otus*), welke men tussen de berken had weten op te sporen, werd geringd. Dan passeerden we in de Peel de Noord Brabants-Limburgse grens en betraden het gebied van de gemeente Asten. Ook daar strekte zich een uitgebreid plassen-complex voor ons uit, met ook hier weer een zeer levendige broedplaats van Kokmeeuwen (*Larus ridibundus*), Vissdieven (*Sterna hirundo*), Zwarte Sterns (*Chlidonias niger*) en Wilde Eenden (*Anas platyrhynchos*), alsmede enkele Tureluurs (*Tringa totanus*). Als een waardig slot van deze excursie ontdekte men in deze broedplaats tussen de daar rondvliegende Kokmeeuwen een jonge Dwergmeeuw (*Larus minutus*), die op de voor deze soort zo karakteristieke manier al vliegend bezig was voedsel uit het water op te nemen.

Zo kwam er dan een einde aan een zeer interessante excursie in de op ornithologisch gebied zo merkwaardige omgeving van Weert. Zoals gemeld bemoeilijkte het winderig weer de waarnemingen zeer, maar de deelnemers vonden hun moeiten toch wel beloond. Meer dan 80 soorten konden worden waargenomen.

J. H. H. DE HAAN.

Verslag van de N.O.U.-excursie naar Texel op 20 okt. 1957.

Op zondag 20 oktober 1957 hield de N.O.U. haar eerste excursie, op Texel. De belangstelling daarvoor was groot: 30 leden, waaronder zelfs Limburg vertegenwoordigd was, meldden zich aan; voorts werden 6 personen geïntroduceerd.

Vrijwel alle deelnemers logeerden zaterdag in het zelfde hotel in Den Burg, waar zij gezamenlijk dineerden. Tijdens dit langdurige diner heerste er een voortreffelijke stemming.

's Zondagsmorgens werd om 8 uur het sein van vertrek gegeven aan niet minder dan 14 auto's, zodat het vervoer der deelnemers geen probleem was.

Het eiland Texel liet zich op deze dag van zijn beste zijde zien want het weer was uitgezocht mooi. Eerst stond een wandeling langs de NW-rand van de Slufter op het programma. Onderweg werden in de polder Eijerland ca. 300 Goudpluvieren (*Charadrius apricarius*) waargenomen. Enige leden zagen nog een late Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*). Het bezoek aan de Slufter was ornithologisch niet zo belangrijk, doch men kan nu eenmaal Texel niet verlaten zonder genoten te hebben van dit uitzonderlijk mooie landschap. Een troep trekkende Pimpelmezen (*Parus caeruleus*) en Ringmussen (*Passer montanus*) trok de aandacht en twee leden waren zo gelukkig een ex. van de zeldzame Grote Pieper (*Anthus richardi*) waar te nemen. Vervolgens werd gereden naar De Cocksdorp waar een wandeling werd gemaakt langs de dijk. De Bonte Strandloper (*Calidris alpina*) was hier het sterkst vertegenwoordigd, doch ook grote hoeveelheden Scholeksters (*Haematopus ostralegus*) stonden op het wad. Steen-