

## Verslag van de wetenschappelijke vergadering van de afdeling Nederlandse Ornithologische Vereniging in het Zoologisch Laboratorium te Utrecht, 13 april 1957.

Direct aansluitend op de korte huishoudelijke vergadering van de Nederlandse Ornithologische Unie opent de voorzitter van de afd. Ned. Ornithologische Vereniging, de heer BIERMAN, de wetenschappelijke vergadering van deze afd. met een welkomstwoord aan de spreker van deze bijeenkomst, de heer HOOGERWERF. Deze houdt een inleiding tot zijn kleurenfilm, die is opgenomen op het 8 ha grote eiland Pulu Dua, gelegen in de baai van Bantam, Java. Op dit eiland broeden gedurende 8 à 12 maanden 20 tot 25000 reiger- en ooievaarachtigen. Zij worden er door roofvijanden, o.a. waranen, gebrandschat. Zij hebben ook enorm geleden onder de oorlogsomstandigheden. Thans broeden er 14 soorten en wel de Grote, Middelste en Kleine Zilverreiger, de Sawahreiger, de Koereiger, de Nachtreiger, Blauwe Reiger, Purperreiger, Grote en Kleine Aalscholver, Witte en Zwarte Ibis, de Nimmerzat en de Lepelaar. Vele soorten hebben een zeer verschillende balts, waardoor ook geen bastaardering mogelijk is, alleen de Lepelaar en Ibis vertonen wel vele overeenkomsten in de balts. De enkele Lepelaar broedt dan ook in de kolonie van de Witte Ibis. Terwijl de jongen van het ene broed nog door de ouden gevoederd worden, komen nieuwe vogels op het eiland aan om de nesten te bezetten. Er bestaat een groot verschil in snavekleur, in iriskleur en in pootkleur, al naar de vogel in het baltsstadium, in de broedtijd of buiten de broedtijd verkeert. Alleen de ♂♂ baltsen. Een aantal soorten komt over het gehele eiland verspreid voor, andere zijn echter tot zeer bepaalde delen van het eiland beperkt. Hierna vertoonde de heer HOOGERWERF zijn prachtige kleurenfilm. Omstreeks 5 uur sloot de heer BIERMAN de vergadering onder dankzegging aan de spreker voor diens buitengewoon mooie film en zijn uitermate belangrijk werk op vogelbeschermingsgebied in Indonesië.

E. VAN KOERSVELD.

## Verslag van de vergadering van de afdeling Club van Nederlandse Vogelkundigen in hotel Juliana te Weert, op 25 mei 1957.

Aanwezig van het Bestuur de heren: J. G. VAN MARLE (wnd. voorzitter), M. J. TEKKE, Dr. K. WALDECK en Mr. J. KIST; voorts de leden Dr. N. J. BAKKER, H. BARTELS, pastoor J. N. VAN DEN BRINK, C. J. COLDEWEY JR., W. M. DIEDRICH, H. M. VAN ECK, E. EVERS, J. H. H. DE HAAN, A. HOOGERWERF, Mr. J. H. KLATTE (met als introducée zijn echtgenote), Mr. L. F. KLEYN, Dr. E. VAN KOERSVELD, L. L. A. MAURENBRECHER, H. NUIJEN, J. PRINS, J. SWAAB, J. H. J. M. VALLEN, A. B. WIGMAN, Mevr. Ir. E. A. DE WILJES-HISSINK en A. B. H. WOLFF.

Opening. Om omstreeks 21.00 uur opent de wnd.-voorzitter de vergadering en heet hij de aanwezigen welkom. Hij deelt mede, dat de heer HENS tot zijn spijt verhinderd is aanwezig te zijn.

Goedkeuring notulen. De secretaris leest de notulen voor van de op 17 maart 1957 te Amsterdam gehouden vergadering. Zij worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en door de voorzitter gearresteerd.

Binnengekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat bericht van verhindering is binnengekomen van de heren E. HUIJGEN en H. J. VERMEULEN. Voorts brengt hij ter kennis, dat de in de vorige ledenvergadering tot lid der Afdeling benoemde heren Mr. E. D. MAALDRINK en A. A. TJITTES hun benoeming schriftelijk hebben aanvaard.

Bespreking excursie. De voorzitter geeft het woord aan de heer DE HAAN, die hierop het plan de campagne voor de excursie van de volgende dag

uiteenzet. Hierbij geeft hij een gedetailleerd overzicht van de verschillende soorten, welke in de omgeving van Weert kunnen worden waargenomen.

Wetenschappelijke mededelingen. WOLFF deelt mede, dat hij op 4 en 5 mei 1957 bij de Eempolderkust een Kleine Zilverreiger (*Egretta garzetta*) heeft waargenomen. Op 19 mei bevonden zich bij het Wasmeer 3 Steltkluten (*Himantopus himantopus*). Tenslotte vermeldt hij, dat de Bergeend (*Tadorna tadorna*) in de Eempolder vooruit gaat; hij schat het aantal broedparen op  $\pm 25$ . HOOGERWERF nam in de tweede helft van april 1957 in een bos tussen Bussum en 's-Graveland een Draaihals (*Jynx torquilla*) waar. Op 2 mei trof hij 2 Bergeenden (*Tadorna tadorna*) met resp. 7 en 11 jongen aan nabij de Hondsbossezeewering.

EVERS maakt melding van een te Wolfheze aangetroffen legsel van de Boomklever (*Sitta europaea*) in een nestkast, waarvan het vlieggaat gedeeltelijk dichtgemetseld werd. De jongen vlogen op 25 mei 1957 uit.

PRINS zag op 21 oktober 1956 een troep van  $\pm 60$  Kraanvogels (*Grus grus*) in het Beuven. Op 28 april en 12 mei 1957 nam hij enkele Blauwborsten (*Cyanosylvia svecica*) waar in de Biesbos.

VAN ECK nam op 18 oktober 1956 56 Kraanvogels (*Grus grus*) in het Beuven waar.

KLATTE deelt mede, dat hij in mei 1957 in het Zwanenwater  $\pm 50$  nesten van de Kauw (*Corvus monedula*) in konijnenholen aantrof. Naar aanleiding hiervan vermeldt WALDECK, dat hij op 20 april 1957 in het Twickelse bos bij Delden een Kauw nestmateriaal zag slepen naar een oud Kraaiennest. COLDEWEY deelt mede, dat hij zulks in het Oosten des lands meermalen heeft geconstateerd.

COLDEWEY geeft een uitvoerig verslag van de vondst op 30 maart 1957 op de Voorster Klei van een legsel van de Pijlstaart (*Anas acuta*) in ruw, ongeploegd bouwland. Het legsel bevatte 7 eieren en is het eerste broedgeval voor Oost-Nederland. WOLFF deelt naar aanleiding van deze vondst mede, dat TJITTES hem op 12 mei 1957 een 10-legsel van de Pijlstaart toonde in een aan de kust tussen Harderwijk en Hooghuizen gelegen grasland.

WALDECK vond reeds op 30 maart 1957 onder Vianen een 2-legsel van de Grutto (*Limosa limosa*). Op die datum was de Boompieper (*Anthus trivialis*) reeds teruggekeerd. Op 14 april 1957 zag hij met enige vrienden op het eiland Rozenburg nabij De Beer een paartje Witte Kwikstaarten (*Motacilla alba*) baltsen, waarvan er één een Rouwkwikstaart (*garrellii*) was. Op 20 april nam hij tussen Terborg en Zeddam een paar Scholeksters (*Haematopus ostralegus*) waar, die daar kennelijk wilden broeden. VALLEN deelt in dit verband mede, dat de Scholekster vermoedelijk ook langs de Maas broedt. Tenslotte vermeldt WALDECK, dat hij en enige vogelvrienden op 19 en 20 april 1957 in het Twickelse bos 2 in aanbouw zijnde nesten van de Middelste Bonte Specht (*Dendrocopos medius*) vonden. Er waren voorts aanwijzingen, dat zich daar nog een derde broedpaar bevond, waarvan echter de nestholte niet werd gevonden. KLATTE deelt hierop mede, dat op de N.O.V.-excursie van 12 mei 1957 deze beide nesten waren verlaten; één was door een Spreeuw in bezit genomen.

DE HAAN deelt mede, dat in Weert 8 paar Turkse Tortels (*Streptopelia decaocto*) broeden. Tot 7 januari 1957 bleef een groepje van  $\pm 45$  vogels bij elkaar, doch daarna losten zij zich paarsgewijs op. De Turkse Tortel broedt ook in Venlo en Maastricht.

VALLEN vermeldt een broedgeval van de Turkse Tortel in Blerick, waar de jongen uit dezelfde nestplaats uitvlogen op 4 maart en 28 april 1957.

VAN MARLE vond op 15 maart 1957 een 4-legsel van de Houtsnip (*Scolopax rusticola*) op de Hoge Veluwe.

Om omstreeks 22.45 uur sluit de wnd.-voorzitter de vergadering.

De secretaris, J. KIST.