

Naamlijst van de Nederlandse Vogelsoorten
Mededeling 1
van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna.
(With summary)

De Commissie voor de Nederlandse Avifauna werd begin 1957 door het bestuur van de Nederlandse Ornithologische Unie ingesteld met de opdracht een naamlijst van de Nederlandse avifauna in zijn meest uitgebreide zin samen te stellen en deze lijst bij te houden. Gedacht werd aan een gedocumenteerde „checklist”, met opgaven over broedvoorkomen en mate van zeldzaamheid. De Commissie, waarvan de samenstelling hieronder wordt medegedeeld, ging terstond aan het werk, doch realiseerde zich al spoedig, dat de publicatie van een uitvoerig overzicht van de Nederlandse avifauna op korte termijn niet te verwezenlijken is. De Commissie besloot tot de uitvoering van een aantal voorbereidende werkzaamheden en tot tussentijdse publicatie van de bereikte resultaten.

Hierbij wordt het eerste rapport aangeboden.

Het is een lijst van de Nederlandse en wetenschappelijke namen van de soorten, waarvan het voorkomen in Nederland als bewezen kan worden beschouwd.

Met betrekking tot een aantal moeilijke beslissingen inzake de opname van vogelsoorten in de Nederlandse lijst stelde de Commissie de volgende criteria vast:

1. Onder *N e d e r l a n d* wordt verstaan het grondgebied in Europa, alsmede de wateren langs de Nederlandse kust tot aan de verbindingslijn van de ligplaatsen van de Nederlandse lichtscheepen.
2. Ten aanzien van soorten, waarvan een *d o o d g e v o n d e n* exemplaar het enige bewijsstuk is, zal van geval tot geval worden beoordeeld, of de vogel als een Nederlandse vogel beschouwd kan worden.
3. Ten aanzien van soorten, waarvan het enige bewijs op een veldwaarneming berust, geldt de regel, dat één getuige als géén getuige wordt opgevat, terwijl voorts van geval tot geval zal worden beoordeeld of een door meer dan één waarnemer vermelde vogel als een Nederlandse vogel beschouwd kan worden. De Commissie meende met betrekking tot deze beoordeling de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid te moeten betrachten, teneinde de betrouwbaarheid van de lijst te verzekeren.

Er is allereerst naar gestreefd een bruikbare *s o o r t e n l i j s t* samen te stellen. Pas in een later stadium van voorbereiding zullen de in Nederland voorkomende ondersoorten door de Commissie worden onderzocht. Op deze wijze wil de Commissie trachten het zwaartepunt van het avifaunistisch onderzoek op de *s o o r t e n* te leggen en niet op het veel misbruikte begrip der ondersoorten. In overeenstemming met deze zienswijze worden ook uitsluitend voor de soorten en *n i e t* voor de ondersoorten Nederlandse namen voor-

gesteld. In een beperkt aantal gevallen, waarin een Nederlandse naam voor bepaalde ondersoorten door veelvuldig gebruik een zeker burgerrecht heeft verkregen, worden één of meer Nederlandse namen voor deze ondersoorten tussen haakjes aan de soortnaam toegevoegd. De eerste, niet tussen haakjes geplaatste naam, geldt ook in deze gevallen als de soortnaam. Het standpunt, dat de Zwarte Kraai en de Bonte Kraai onderscheidbare geographische vertegenwoordigers van één soort vormen (namelijk van de soort: Kraai) is in Nederland niet nieuw.

Bij de vaststelling van de wetenschappelijke namen heeft de Commissie de beslissingen van de „International Commission on Zoological Nomenclature” gevolgd. Het gebruik van o.a. de geslachtsnamen *Gavia* (duikers) en *Gallinago* (snippen) in plaats van de vroeger gebruikte namen *Colymbus* en *Capella* wordt op deze wijze verantwoord, evenals dat van de soortnamen *philomelos* (Zanglijster) en *iliacus* (Koperwiek) in plaats van *ericetorum* en *musicus*. In gevallen, waarbij het gebruik van wetenschappelijke namen direct samenhangt met een bepaald wetenschappelijk inzicht, heeft de Commissie als regel een standpunt ingenomen, dat gematigd-conservatief genoemd kan worden. Volgens dit standpunt is bijv. de soortnaam van de Kleine Zwaan (*bewickii*) gehandhaafd en is niet het voorbeeld gevolgd van een aantal moderne onderzoekers volgens welke de Kleine Zwaan in één soort moet worden samengevoegd met een N. Amerikaanse Zwaan (*Cygnus columbianus*). Daarentegen zijn enkele uitzonderlijk goed gefundeerde voorstellen op het gebied van de systematiek, zoals de splitsing van het vliegenvangergeslacht *Muscicapa* in *Muscicapa* en *Ficedula* (C. VAURIE, Bull. American Museum Natural History, 100 (4), 1953) wel in deze lijst nagevolgd en verschijnen aldus hier voor het eerst in de Nederlandse literatuur.

Bij de vaststelling van de Nederlandse namen heeft de Commissie een uitgebreid en dankbaar gebruik gemaakt van het laatste rapport van de door de besturen van de oude Nederlandse Ornithologische Vereniging en de Club van Nederlandsche Vogelkundigen ingestelde Commissie Naamlijst Nederlandsche Vogels, die aanvankelijk bestond uit de heren Prof. Dr. L. F. DE BEAUFORT (voorzitter), Dr. G. C. A. JUNGE (secretaris), P. A. HENS, J. G. VAN MARLE en Prof. A. E. H. SWAEN; later werd in de plaats van de in 1947 overleden Prof. SWAEN Dr. K. H. VOOUS tot lid benoemd. Na publicatie van de als bijlage bij *Ardea*, 34, 1946, gevoegde voorlopige lijst van Nederlandse namen, heeft de Commissie Naamlijst in 1957 een eindrapport opgemaakt en dit in handen van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna gesteld. In grote lijnen heeft de Commissie het advies van de Commissie Naamlijst gevolgd en zich evenals deze op het standpunt gesteld, dat de lijst in het algemeen geen nieuwe Nederlandse namen diende in te voeren, doch het bestaande taalgebruik diende te volgen. Slechts in enkele gevallen, zoals in die met betrekking tot de namen van Kuhls Pijl-

stormvogel en Temmincks Strandloper, meende de Commissie een voorzichtig richting geven aan het taalgebruik niet achterwege te mogen laten.

De Commissie stelt een *volg o r d e* van families en soorten voor, die in overeenstemming is met de door het XI Internationale Ornithologische Congres te Bazel in 1954 aangenomen aanbeveling voor de volgorde van avifaunistische lijsten. Wat betreft de niet-zangvogels is deze volgorde in grote trekken die van J. L. PETERS in de „Check-list of birds of the world” (1931—1948) en van A. WETMORE in „A revised classification for the birds of the world” (Smithsonian Misc. Coll., 117 (4), 1951, p. 1—22). De volgorde van de families van de zangvogels is dezelfde als die welke door een speciale commissie onder voorzitterschap van G. C. A. JUNGE vanwege het genoemde Internationale Ornithologische Congres werd vastgesteld en door E. MAYR en J. C. GREENWAY in 1956 gepubliceerd (Breviora, 58, 1956, p. 1—11). Met uitzondering van de volgorde der zangvogelfamilies komt de hieronder aangehouden volgorde grotendeels overeen met die in de door J. KIST voor Nederland bewerkte uitgave van R. T. PETERSON, G. MOUNTFORT en P. A. D. HOLLOM „A field guide to the birds of Britain and Europe” („Vogelgids”, Elsevier, Amsterdam, 1e dr. 1954, 4e dr. 1958). De Commissie vertrouwt op deze wijze de bruikbaarheid van de lijst te hebben bevorderd.

Met een * zijn aangegeven de soorten, waarvan het broeden in Nederland na 1900 door de Commissie als voldoende gedocumenteerd en bewezen wordt beschouwd.

De Commissie voor de Nederlandse Avifauna:

Dr. W. H. BIERMAN

Dr. G. A. BROUWER

P. A. HENS

Dr. G. C. A. JUNGE

Dr. C. G. B. TEN KATE

Mr. J. KIST (*secretaris*)

J. G. VAN MARLE

Dr. M. F. MÖRZER BRUYNIS

J. SWAAB

Prof. Dr. K. H. VOOUS (*voorzitter*)

Dr. K. WALDECK

Familie *Gaviidae*

- 1 *Gavia immer* (Brünnich) — IJsduiker
- 2 *Gavia adamsii* (Gray) — Geelsnavelduiker
- 3 *Gavia arctica* (Linnaeus) — Parelduiker
- 4 *Gavia stellata* (Pontoppidan) — Roodkeelduiker

Familie *Podicipidae*

- * 5 *Podiceps cristatus* (Linnaeus) — Fuut
- * 6 *Podiceps griseigena* (Boddaert) — Roodhalsfuut

- 7 *Podiceps auritus* (Linnaeus) — Kuifduiker
- * 8 *Podiceps nigricollis* Brehm — Geoorde Fuut
- * 9 *Podiceps ruficollis* (Pallas) — Dodaars

Familie Procellariidae

- 10 *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot) — Vaal Stormvogeltje
- 11 *Hydrobates pelagicus* (Linnaeus) — Stormvogeltje
- 12 *Puffinus puffinus* (Brünnich) — Noordse Pijlstormvogel
- 13 *Puffinus gravis* (O'Reilly) — Grote Pijlstormvogel
- 14 *Puffinus diomedea* (Scopoli) — Kuhls Pijlstormvogel
- 15 *Puffinus griseus* (Gmelin) — Grauwe Pijlstormvogel
- 16 *Fulmarus glacialis* (Linnaeus) — Noordse Stormvogel

Familie Sulidae

- 17 *Sula bassana* (Linnaeus) — Jan van Gent

Familie Phalacrocoracidae

- * 18 *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus) — Aalscholver
- 19 *Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus) — Kuifaalscholver

Familie Ardeidae

- * 20 *Ardea cinerea* Linnaeus — Blauwe Reiger
- * 21 *Ardea purpurea* Linnaeus — Purperreiger
- 22 *Egretta alba* (Linnaeus) — Grote Zilverreiger
- 23 *Egretta garzetta* (Linnaeus) — Kleine Zilverreiger
- 24 *Ardeola ralloides* (Scopoli) — Ralreiger
- * 25 *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus) — Kwak
- * 26 *Ixobrychus minutus* (Linnaeus) — Woudaapje
- * 27 *Botaurus stellaris* (Linnaeus) — Roerdomp

Familie Ciconiidae

- * 28 *Ciconia ciconia* (Linnaeus) — Ooievaar
- 29 *Ciconia nigra* (Linnaeus) — Zwarte Ooievaar

Familie Plataleidae

- * 30 *Platalea leucorodia* Linnaeus — Lepelaar
- 31 *Plegadis falcinellus* (Linnaeus) — Zwarte Ibis

Familie Phoenicopteridae

- 32 *Phoenicopiterus ruber* Linnaeus — Flamingo

Familie Anatidae

- * 33 *Anas platyrhynchos* Linnaeus — Wilde Eend
- * 34 *Anas crecca* Linnaeus — Wintertaling
- 35 *Anas formosa* Georgi — Siberische Taling
- * 36 *Anas querquedula* Linnaeus — Zomertaling
- 37 *Anas discors* Linnaeus — Blauwvleugeltaling
- * 38 *Anas strepera* Linnaeus — Krakeend

- * 39 *Anas penelope* Linnaeus — Smient
- * 40 *Anas acuta* Linnaeus — Pijlstaart
- * 41 *Anas clypeata* Linnaeus — Slobeend
- * 42 *Netta rufina* (Pallas) — Krooneend
- 43 *Aythya marila* (Linnaeus) — Toppereend
- * 44 *Aythya fuligula* (Linnaeus) — Kuifeend
- * 45 *Aythya ferina* (Linnaeus) — Tafeleend
- * 46 *Aythya nyroca* (Güldenstädt) — Witoogeend
- 47 *Bucephala clangula* (Linnaeus) — Brilduiker
- 48 *Clangula hyemalis* (Linnaeus) — IJseend
- 49 *Melanitta fusca* (Linnaeus) — Grote Zeeëend
- 50 *Melanitta perspicillata* (Linnaeus) — Brilzeeëend
- 51 *Melanitta nigra* (Linnaeus) — Zwarte Zeeëend
- * 52 *Somateria mollissima* (Linnaeus) — Eidereend
- 53 *Oxyura leucocephala* (Scopoli) — Witkopeend
- 54 *Mergus merganser* Linnaeus — Grote Zaagbek
- * 55 *Mergus serrator* Linnaeus — Middelste Zaagbek
- 56 *Mergus albellus* Linnaeus — Nonnetje
- * 57 *Tadorna tadorna* (Linnaeus) — Bergeend
- 58 *Tadorna ferruginea* (Pallas) — Casarca
- * 59 *Anser anser* (Linnaeus) — Grauwe Gans
- 60 *Anser albifrons* (Scopoli) — Kolgans
- 61 *Anser erythropus* (Linnaeus) — Dwerggans
- 62 *Anser fabalis* Latham — Rietgans (en Kleine Rietgans)
- 63 *Anser hyperboreus* Pallas — Sneeuwgans
- 64 *Branta bernicla* (Linnaeus) — Rotgans
- 65 *Branta leucopsis* (Bechstein) — Brandgans
- 66 *Branta canadensis* (Linnaeus) — Canadese Gans
- 67 *Branta ruficollis* (Pallas) — Roodhalsgans
- * 68 *Cygnus olor* (Gmelin) — Knobbelzwaan
- 69 *Cygnus cygnus* (Linnaeus) — Wilde Zwaan
- 70 *Cygnus bewickii* Yarrell — Kleine Zwaan

Familie Accipitridae

- 71 *Gyps fulvus* (Hablizl) — Vale Gier
- 72 *Aegypius monachus* (Linnaeus) — Monniksgier
- 73 *Aquila chrysaëtos* (Linnaeus) — Steenarend
- 74 *Aquila clanga* Pallas — Bastaardarend
- 75 *Aquila pomarina* Brehm — Schreeuwarend
- * 76 *Buteo buteo* (Linnaeus) — Buizerd (en Steppenbuizerd)
- 77 *Buteo rufinus* (Cretzschmar) — Arendbuizerd
- 78 *Buteo lagopus* (Pontoppidan) — Ruigpootbuizerd
- * 79 *Accipiter nisus* (Linnaeus) — Sperwer
- * 80 *Accipiter gentilis* (Linnaeus) — Havik
- 81 *Milvus milvus* (Linnaeus) — Rode Wouw
- 82 *Milvus migrans* (Boddaert) — Zwarte Wouw
- 83 *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus) — Zeearend
- * 84 *Pernis apivorus* (Linnaeus) — Wespendif

- * 85 *Circus aeruginosus* (Linnaeus) — Bruine Kiekendief
- * 86 *Circus cyaneus* (Linnaeus) — Blauwe Kiekendief
- 87 *Circus macrourus* (Linnaeus) — Steppenkiekendief
- * 88 *Circus pygargus* (Linnaeus) — Grauwe Kiekendief
- 89 *Circaetus gallicus* (Gmelin) — Slangenarend

Familie Pandionidae

- 90 *Pandion haliaetus* (Linnaeus) — Visarend

Familie Falconidae

- * 91 *Falco peregrinus* Tunstall — Slechtvalk
- 92 *Falco rusticolus* Linnaeus — Giervalk
- 93 *Falco columbarius* Linnaeus — Smelleken
- * 94 *Falco subbuteo* Linnaeus — Boomvalk
- 95 *Falco vespertinus* Linnaeus — Roodpootvalk
- * 96 *Falco tinnunculus* Linnaeus — Torenvalk

Familie Tetraonidae

- * 97 *Lyrurus tetrix* (Linnaeus) — Korhoen
- 98 *Tetrastes bonasia* (Linnaeus) — Hazelhoen

Familie Phasianidae

- 99 *Alectoris rufa* (Linnaeus) — Rode Patrijs
- * 100 *Perdix perdix* (Linnaeus) — Patrijs
- * 101 *Coturnix coturnix* (Linnaeus) — Kwartel
- * 102 *Phasianus colchicus* Linnaeus — Fazant

Familie Gruidae

- 103 *Grus grus* (Linnaeus) — Kraanvogel

Familie Rallidae

- * 104 *Rallus aquaticus* Linnaeus — Waterral
- * 105 *Porzana porzana* (Linnaeus) — Porseleinhoen
- * 106 *Porzana parva* (Scopoli) — Klein Waterhoen
- * 107 *Porzana pusilla* (Pallas) — Kleinst Waterhoen
- * 108 *Crex crex* (Linnaeus) — Kwartelkoning
- * 109 *Gallinula chloropus* (Linnaeus) — Waterhoen
- * 110 *Fulica atra* Linnaeus — Meerkoet

Familie Otidae

- 111 *Otis tarda* Linnaeus — Grote Trap
- 112 *Otis tetrax* Linnaeus — Kleine Trap
- 113 *Chlamydotis undulata* (Jacquin) — Kraagtrap

Familie Haematopodidae

- * 114 *Haematopus ostralegus* Linnaeus — Scholekster

Familie Charadriidae

- 115 *Chettusia gregaria* (Pallas) — Steppenkievit
- *116 *Vanellus vanellus* (Linnaeus) — Kievit
- 117 *Pluvialis squatarola* (Linnaeus) — Zilverplevier
- *118 *Pluvialis apricaria* (Linnaeus) — Goudplevier
- 119 *Pluvialis dominica* (P. L. S. Müller) — Kleine Goudplevier
- 120 *Charadrius morinellus* Linnaeus — Morinelplevier
- *121 *Charadrius hiaticula* Linnaeus — Bontbekplevier
- *122 *Charadrius dubius* Scopoli — Kleine Plevier
- *123 *Charadrius alexandrinus* Linnaeus — Strandplevier
- 124 *Arenaria interpres* (Linnaeus) — Steenloper

Familie Scolopacidae

- *125 *Gallinago gallinago* (Linnaeus) — Watersnip
- 126 *Gallinago media* (Latham) — Poelsnip
- 127 *Lymnocyptes minimus* (Brünnich) — Bokje
- *128 *Scolopax rusticola* Linnaeus — Houtsnip
- 129 *Bartramia longicauda* (Bechstein) — Bartrams Ruiter
- *130 *Numenius arquata* (Linnaeus) — Wulp
- 131 *Numenius phaeopus* (Linnaeus) — Regenwulp
- 132 *Numenius tenuirostris* Vieillot — Dunbekwulp
- *133 *Limosa limosa* (Linnaeus) — Grutto
- 134 *Limosa lapponica* (Linnaeus) — Rosse Grutto
- 135 *Tringa ochropus* Linnaeus — Witgatje
- *136 *Tringa glareola* Linnaeus — Bosruiter
- *137 *Tringa hypoleucos* Linnaeus — Oeverloper
- *138 *Tringa totanus* (Linnaeus) — Tureluur
- 139 *Tringa erythropus* (Pallas) — Zwarte Ruiter
- 140 *Tringa nebularia* (Gunnerus) — Groenpootruiter
- 141 *Calidris canutus* (Linnaeus) — Kanoetstrandloper
- 142 *Calidris maritima* (Brünnich) — Paarse Strandloper
- 143 *Calidris minuta* (Leisler) — Kleine Strandloper
- 144 *Calidris temminckii* (Leisler) — Temmincks Strandloper
- 145 *Calidris fuscicollis* (Vieillot) — Bonapartes Strandloper
- *146 *Calidris alpina* (Linnaeus) — Bonte Strandloper
- 147 *Calidris ferruginea* (Pontoppidan) — Krombekstrandloper
- 148 *Calidris alba* (Pallas) — Drieteenstrandloper
- 149 *Tryngites subruficollis* (Vieillot) — Blonde Ruiter
- 150 *Limicola falcinellus* (Pontoppidan) — Breedbekstrandloper
- *151 *Philomachus pugnax* (Linnaeus) — Kemphaan

Familie Recurvirostridae

- *152 *Recurvirostra avosetta* Linnaeus — Kluut
- *153 *Himantopus himantopus* (Linnaeus) — Steltkluut

Familie Phalaropidae

- 154 *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus) — Rosse Franjepoot
- 155 *Phalaropus lobatus* (Linnaeus) — Grauwe Franjepoot

Familie *Burhinidae*

- *156 *Burhinus oedicephalus* (Linnaeus) — Griel

Familie *Glareolidae*

- 157 *Glareola pratincola* (Linnaeus) — Vorkstaartplevier
157a *Glareola nordmanni* Fischer — Steppenvorkstaartplevier
158 *Cursorius cursor* (Latham) — Renvogel

Familie *Stercorariidae*

- 159 *Stercorarius skua* (Brünnich) — Grote Jager
160 *Stercorarius pomarinus* (Temminck) — Middelste Jager
161 *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus) — Kleine Jager
162 *Stercorarius longicaudus* Vieillot — Kleinste Jager

Familie *Laridae*

- 163 *Pagophila eburnea* (Phipps) — Ivoormeeuw
164 *Larus marinus* Linnaeus — Grote Mantelmeeuw
165 *Larus hyperboreus* Gunnerus — Grote Burgemeester
*166 *Larus fuscus* Linnaeus — Kleine Mantelmeeuw
*167 *Larus argentatus* Pontoppidan — Zilvermeeuw
168 *Larus glaucoideus* Meyer — Kleine Burgemeester
*169 *Larus canus* Linnaeus — Stormmeeuw
170 *Larus ichthyaetus* Pallas — Reuzenzwartkopmeeuw
171 *Larus melanocephalus* Temminck — Zwartkopmeeuw
*172 *Larus ridibundus* Linnaeus — Kokmeeuw
*173 *Larus minutus* Pallas — Dwergmeeuw
174 *Xema sabini* (Sabine) — Vorkstaartmeeuw
175 *Rissa tridactyla* (Linnaeus) — Drieteenmeeuw
*176 *Chlidonias niger* (Linnaeus) — Zwarte Stern
177 *Chlidonias leucopterus* (Temminck) — Witvleugelstern
*178 *Chlidonias hybrida* (Pallas) — Witwangstern
*179 *Gelochelidon nilotica* (Gmelin) — Lachstern
180 *Hydroprogne caspia* (Pallas) — Reuzenster
*181 *Sterna hirundo* Linnaeus — Vissdiefje
*182 *Sterna paradisaea* Pontoppidan — Noordse Stern
183 *Sterna dougallii* Montagu — Dougall's Stern
*184 *Sterna albifrons* Pallas — Dwergstern
*185 *Sterna sandvicensis* Latham — Grote Stern

Familie *Alcidae*

- 186 *Alca torda* Linnaeus — Alk
187 *Plautus alle* (Linnaeus) — Kleine Alk
188 *Uria aalge* (Pontoppidan) — Zeekoet
189 *Uria lomvia* (Linnaeus) — Dikbekzeekoet
190 *Cephus grylle* (Linnaeus) — Zwarte Zeekoet
191 *Fratercula arctica* (Linnaeus) — Papegaaiduiker

Familie Pteroclididae

- 192
- Syrnhaptes paradoxus*
- (Pallas) — Steppenhoen

Familie Columbidae

- *193 *Columba oenas* Linnaeus — Holenduif
- *194 *Columba palumbus* Linnaeus — Houtduif
- *195 *Streptopelia turtur* (Linnaeus) — Tortelduif
- *196 *Streptopelia decaocto* (Frisvaldsky) — Turkse Tortel

Familie Cuculidae

- *197 *Cuculus canorus* Linnaeus — Koekoek
- 198 *Clamator glandarius* (Linnaeus) — Kuifkoekoek.

Familie Strigidae

- *199 *Tyto alba* (Scopoli) — Kerkuil
- 200 *Otus scops* (Linnaeus) — Dwergooruil
- 201 *Bubo bubo* (Linnaeus) — Oehoe
- 202 *Nyctea scandiaca* (Linnaeus) — Sneeuwuil
- 203 *Surnia ulula* (Linnaeus) — Sperweruil
- *204 *Athene noctua* (Scopoli) — Steenuil
- *205 *Strix aluco* Linnaeus — Bosuil
- *206 *Asio otus* (Linnaeus) — Ransuil
- *207 *Asio flammeus* (Pontoppidan) — Velduil

Familie Caprimulgidae

- *208
- Caprimulgus europaeus*
- Linnaeus — Nachtzwaluw

Familie Apodidae

- *209 *Apus apus* (Linnaeus) — Gierzwaluw
- 210 *Apus melba* (Linnaeus) — Alpengierzwaluw

Familie Alcedinidae

- *211 *Alcedo atthis* (Linnaeus) — IJsvogel
- 212 *Ceryle alcyon* (Linnaeus) — Bandijsvogel

Familie Meropidae

- 213
- Merops apiaster*
- Linnaeus — Bijeneter

Familie Coraciidae

- 214
- Coracias garrulus*
- Linnaeus — Scharrelaar.

Familie Upupidae

- *215
- Upupa epops*
- Linnaeus — Hop

Familie Picidae

- *216 *Picus viridis* Linnaeus — Groene Specht
- *217 *Dendrocopos major* (Linnaeus) — Grote Bonte Specht

- *218 *Dendrocopos medius* (Linnaeus) — Middelste Bonte Specht
- *219 *Dendrocopos minor* (Linnaeus) — Kleine Bonte Specht
- *220 *Dryocopus martius* (Linnaeus) — Zwarte Specht
- *221 *Jynx torquilla* Linnaeus — Draaihals

Familie Alaudidae

- 222 *Melanocorypha yeltonensis* (Forster) — Zwarte Leeuwerik
- *223 *Galerida cristata* (Linnaeus) — Kuifleeuwerik
- *224 *Lullula arborea* (Linnaeus) — Boomleeuwerik
- *225 *Alauda arvensis* Linnaeus — Veldleeuwerik
- 226 *Eremophila alpestris* (Linnaeus) — Strandleeuwerik

Familie Hirundinidae

- *227 *Hirundo rustica* Linnaeus — Boerenzwaluw
- 228 *Hirundo daurica* Linnaeus — Roodstuitzwaluw
- *229 *Delichon urbica* (Linnaeus) — Huiszwaluw
- *230 *Riparia riparia* (Linnaeus) — Oeverzwaluw

Familie Motacillidae

- 231 *Anthus richardi* Vieillot — Grote Pieper
- *232 *Anthus campestris* (Linnaeus) — Duinpieper
- *233 *Anthus trivialis* (Linnaeus) — Boompieper
- *234 *Anthus pratensis* (Linnaeus) — Graspieper
- 235 *Anthus spinoletta* (Linnaeus) — Oeverpieper
(en Waterpieper)
- *236 *Motacilla alba* Linnaeus — Witte Kwikstaart
(en Rouwkwikstaart)
- *237 *Motacilla cinerea* Tunstall — Grote Gele Kwikstaart
- *238 *Motacilla flava* Linnaeus — Gele Kwikstaart

Familie Laniidae

- *239 *Lanius excubitor* Linnaeus — Klapekster
- 240 *Lanius minor* (Gmelin) — Kleine Klapekster
- *241 *Lanius senator* Linnaeus — Roodkopklauwier
- *242 *Lanius collurio* Linnaeus — Grauwe Klauwier

Familie Bombycillidae

- 243 *Bombycilla garrulus* (Linnaeus) — Pestvogel

Familie Cinclidae

- *244 *Cinclus cinclus* (Linnaeus) — Waterspreeuw

Familie Troglodytidae

- *245 *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus) — Winterkoning

Familie Prunellidae

- *246 *Prunella modularis* (Linnaeus) — Heggemus

Familie *Turdidae*

- *247 *Turdus viscivorus* Linnaeus — Grote Lijster
- 248 *Turdus pilaris* Linnaeus — Kramsvogel
- *249 *Turdus philomelos* Brehm — Zanglijster
- 250 *Turdus iliacus* Linnaeus — Koperwiek
- 251 *Turdus obscurus* Gmelin — Vale Lijster
- 252 *Turdus naumanni* Temminck — Naumanns Lijster
(en Bruine Lijster)
- 253 *Turdus torquatus* Linnaeus — Beflijster
- *254 *Turdus merula* Linnaeus — Merel
- 255 *Geokichla sibirica* (Pallas) — Siberische Lijster
- 256 *Oreocinclla dauma* (Latham) — Goudlijster
- 257 *Monticola saxatilis* (Linnaeus) — Rode Rotslijster
- *258 *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus) — Tapuit
- 259 *Oenanthe hispanica* (Linnaeus) — Blonde Tapuit
- *260 *Saxicola torquata* (Linnaeus) — Roodborsttapuit
- *261 *Saxicola rubetra* (Linnaeus) — Paapje
- *262 *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus) — Gekraagde Roodstaart
- *263 *Phoenicurus ochruros* (Gmelin) — Zwarte Roodstaart
- *264 *Luscinia megarhynchos* Brehm — Nachtegaal
- *265 *Cyanosylvia svecica* (Linnaeus) — Blauwborst
- *266 *Erithacus rubecula* (Linnaeus) — Roodborst

Familie *Sylviidae*

- *267 *Locustella naevia* (Boddaert) — Sprinkhaanrietzanger
- 268 *Locustella fluviatilis* (Wolf) — Krekelzanger
- *269 *Locustella luscinioides* (Savi) — Snor
- 270 *Locustella lanceolata* (Temminck) — Temmincks Rietzanger
- *271 *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus) — Grote Karekiet
- *272 *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann) — Kleine Karekiet
- *273 *Acrocephalus palustris* (Bechstein) — Bosrietzanger
- *274 *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus) — Rietzanger
- *275 *Acrocephalus paludicola* (Vieillot) — Waterrietzanger
- *276 *Hippolais icterina* (Vieillot) — Spotvogel
- *277 *Sylvia atricapilla* (Linnaeus) — Zwartkop
- 278 *Sylvia nisoria* (Bechstein) — Sperwergrasmus
- *279 *Sylvia borin* (Boddaert) — Tuinfluiter
- *280 *Sylvia communis* Latham — Grasmus
- *281 *Sylvia curruca* (Linnaeus) — Braamsluiper
- 282 *Sylvia cantillans* (Pallas) — Baardgrasmus
- *283 *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus) — Fitis
- *284 *Phylloscopus collybita* (Vieillot) — Tjiftjaf
- *285 *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein) — Fluiter
- 286 *Phylloscopus borealis* (Blasius) — Noordse Boszanger
- *287 *Phylloscopus inornatus* (Blyth) — Bladkoninkje
- *288 *Regulus regulus* (Linnaeus) — Goudhaantje
- *289 *Regulus ignicapillus* (Temminck) — Vuurgoudhaantje

Familie Muscicapidae

- *290 *Muscicapa striata* (Pallas) — Grauwe Vliegenvanger
- *291 *Ficedula hypoleuca* (Pallas) — Bonte Vliegenvanger
- 292 *Ficedula albicollis* (Temminck) — Withalsvliegenvanger
- 293 *Ficedula parva* (Bechstein) — Kleine Vliegenvanger

Familie Paridae

- *294 *Parus major* Linnaeus — Koolmees
- *295 *Parus caeruleus* Linnaeus — Pimpelmees
- *296 *Parus ater* Linnaeus — Zwarte Mees
- *297 *Parus cristatus* Linnaeus — Kuifmees
- *298 *Parus palustris* Linnaeus — Glanskop
- *299 *Parus montanus* Conrad — Matkop
- *300 *Aegithalos caudatus* (Linnaeus) — Staartmees
- *301 *Panurus biarmicus* (Linnaeus) — Baardmannetje

Familie Sittidae

- *302 *Sitta europaea* Linnaeus — Boomklever

Familie Certhiidae

- *303 *Certhia brachydactyla* Brehm — Boomkruiper

Familie Emberizidae

- *304 *Emberiza calandra* Linnaeus — Grauwe Gors
- *305 *Emberiza citrinella* Linnaeus — Geelgors
- 306 *Emberiza cirlus* Linnaeus — Cirlgors
- 307 *Emberiza leucocephalos* Gmelin — Witkopgors
- 308 *Emberiza bruniceps* Brandt — Bruinkopgors
- 309 *Emberiza melanocephala* Scopoli — Zwartkopgors
- 310 *Emberiza rutila* Pallas — Rosse Gors
- 311 *Emberiza aureola* Pallas — Wilgengors
- *312 *Emberiza hortulana* Linnaeus — Ortolaan
- 313 *Emberiza caesia* Cretzschmar — Bruinkeelortolaan
- 314 *Emberiza cia* Linnaeus — Grijze Gors
- 315 *Emberiza rustica* Pallas — Bosgors
- 316 *Emberiza pusilla* Pallas — Dwerggors
- *317 *Emberiza schoeniclus* Linnaeus — Rietgors
- 318 *Calcarius lapponicus* (Linnaeus) — IJsgors
- 319 *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus) — Sneeuwgorst

Familie Fringillidae

- *320 *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus) — Appelvink
- *321 *Chloris chloris* (Linnaeus) — Groenling
- *322 *Carduelis carduelis* (Linnaeus) — Putter
- *323 *Carduelis spinus* (Linnaeus) — Sijs
- *324 *Carduelis cannabina* (Linnaeus) — Kneu
- 325 *Carduelis flavirostris* (Linnaeus) — Frater

- *326 *Carduelis flammea* (Linnaeus) — Barmsijs
- 327 *Carduelis hornemanni* (Holböll) — Witsluitbarmsijs
- *328 *Serinus serinus* (Linnaeus) — Europese Kanarie
- *329 *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus) — Goudvink
- 330 *Carpodacus erythrinus* (Pallas) — Roodmuk
- 331 *Pinicola enucleator* (Linnaeus) — Haakbek
- *332 *Loxia curvirostra* Linnaeus — Kruisbek
- 333 *Loxia pityopsittacus* Borkhausen — Grote Kruisbek
- 334 *Loxia leucoptera* Gmelin — Witbandkruisbek
- *335 *Fringilla coelebs* Linnaeus — Vink
- 336 *Fringilla montifringilla* Linnaeus — Keep

Familie P l o c e i d a e

- *337 *Passer domesticus* (Linnaeus) — Huismus
- *338 *Passer montanus* (Linnaeus) — Ringmus
- 339 *Petronia petronia* (Linnaeus) — Rotsmus

Familie S t u r n i d a e

- *340 *Sturnus vulgaris* Linnaeus — Spreeuw
- 341 *Pastor roseus* (Linnaeus) — Rose Spreeuw

Familie O r i o l i d a e

- *342 *Oriolus oriolus* (Linnaeus) — Wielewaal

Familie C o r v i d a e

- *343 *Corvus corax* Linnaeus — Raaf
- *344 *Corvus corone* Linnaeus — Kraai
(Zwarte Kraai en Bonte Kraai)
- *345 *Corvus frugilegus* Linnaeus — Roek
- *346 *Corvus monedula* Linnaeus — Kauw
- *347 *Pica pica* (Linnaeus) — Ekster
- 348 *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus) — Notenkraker
- *349 *Garrulus glandarius* (Linnaeus) — Vlaamse Gaai
- 350 *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus) — Alpenkauw

Summary:

This is the first report of the Committee for the Netherlands Avifauna, which is a "checklist-committee", established in 1957 by the Board of the Netherlands Ornithological Union. The report enumerates the species with their scientific and Dutch vernacular names, of which according to the Committee sufficient evidence of their occurrence in the Netherlands exists. As regards field-observations, only those made by two or more trustworthy observers are considered by the Committee. With an asterisk () are indicated those species of which according to the Committee sufficient proof exists of breeding in the Netherlands after 1900.*