

Symbolisch slepen met nestmateriaal door het ♂ van de Grauwe Gors (*Emberiza calandra*).

Alle opgaven in de literatuur zijn eenstemmig over het niet bouwen door het ♂, toch hebben VAN DOOREN en ondergetkende enkele malen geconstateerd, dat het (zingende) ♂ grote slierten nestmateriaal in de bek nam en daarmee op een draad of paaltje ging zitten; na korte tijd liet het echter het nestmateriaal weer vallen. Dit wijst o.i. op een „symbolische” handeling. HELLEBREKERS.

Jonge Spreeuwen (*Sturnus vulgaris*) in februari.

Bij een inwoner van Witmarsum zaten in februari al jonge Spreeuwen in een nest onder het dak (Leeuwarder Courant 21 februari 1957). Op 18 maart 1957 vloog te Ede al een nest jongen uit.

A. B. WIGMAN.

Enige broedvogels in Noord-Brabant

door

SJ. BRAAKSMA, W. H. Th. KNIPPENBERG en V. LANGENHOFF

(vervolg)

(met 1 tekstfiguur)

De Buizerd (*Buteo buteo* L.)

Hoewel ALBARDA in 1897 opgaf, dat de soort toen in de meeste provincies broedend kon worden aangetroffen, ontbreken concrete gegevens over het broeden van Buizerden in Brabant gedurende vroegere eeuwen geheel. Het duurde trouwens tot 1941 vóór in de literatuur de eerste opgave verscheen over het voorkomen van de soort in deze provincie gedurende de broedtijd.

Een en ander kan een gevolg zijn van het feit, dat Brabant vroeger voor de meeste ornithologen terra-incognita was.

Het lijkt echter ook zeer wel mogelijk, dat de soort pas sedert enkele decennia in deze provincie broedt.

Dat de Buizerd thans op verschillende plaatsen een vrij geregelde broedvogel is, moge blijken uit onderstaand overzicht:

Drunen-Helvoirt: 1956, op 6 april 1 ex. baltsend in de bossen n. van de Helvoirtse heide; op 12 april weer ter plaatse gezien; broeden lijkt zeer wel mogelijk (S.B.). — Udenhout: 1950, enkele malen gedurende het broedseizoen 1 ex. gezien in de bossen nabij De Brand. 1956, op 17 april en 18 april hier resp. 2 en 1 ex. gezien; broeden lijkt zeer wel mogelijk (S.B.). — Goirle: „Nieuwkerk”: 1947, broedgeval (SEEGERS); tot 1947 broedvogel, maar van 1948 tot 1952 waarschijnlijk afwezig (J. WITLOX). 1954, op 23 juni waargenomen (J. POST), hier in juni broedend (A. B. WITGEN). „De Rovert”: 1954—1956 geregeld 1 paar broedend (A.B.W.). „De Tulder”: 1954 op 19 juni 1 ex. gezien (A.B.W.). „Gorp en Breehees”: 1953, in juli jonge vogel gezien (A. DE LAAT). — Esbeek-Lage Mierde: 1934, in mei 1 ex. verzameld (thans collectie Beekvliet). 1952, gedurende het broedseizoen gezien in de grensbossen (A.d.L.). 1954 en 1955 broedgeval op „De Utrecht”, waar oude vogels met vliegvlugge

uitgevlogen; 1957, 3 nesten bekend, 1 met 4 eieren verstoord, van de beide andere nesten resp. 3 jongen en 1 jong uitgevlogen (J.v.d.K.). — De Rips-St. Anthonis: 1948, broedvogel op landgoed „De Bunthorst” (A.d.J.); 1953—1957, gemiddeld 4 à 5 paren op „De Bunthorst” (J.v.d.K.). — Kasteelbos tussen Maashees en Geysteren (in Brabants-Limburgs grensgebied): 1944 en 1946, broedend aangetroffen, hier ook reeds voordien als geregelde broedvogel bekend (HENS, 1948); 1948, volgens jachtopzichter weer broedend (R. J. HOOGERVORST).

Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat gedurende de laatste jaren tenminste 20 paar Buizerden geregeld in Brabant broeden. Het werkelijke aantal broedparen is vermoedelijk hoger en schommelt wellicht tussen 25 en 30. De soort broedt zowel in naaldhout als in loofhoutbossen. In het oosten van de provincie is de dichtheid kennelijk veel groter dan in het midden, terwijl de Buizerd in het westelijk deel vermoedelijk ontbreekt als broedvogel. De waarnemingen wijzen er op, dat het aantal broedparen toeneemt.

Literatuur:

- ALBARDA, H. (1897): *Aves Neerlandicae*. Leeuwarden.
 BROUWER, G. A. (1950): Broedvogels 1946. *Ardea* 38, p. 207.
 HAVERSCHMIDT, F. (1942): Faunistisch Overzicht van de Nederlandsche Broedvogels. Leiden.
 HENS, P. A. (1948): Avifauna der Nederlandse provincie Limburg, 3e aanvulling, Publicaties van het Nat. Hist. Genootschap in Limburg, Reeks I, p. 84.
 KATE, C. G. B. TEN (1941): Ornithologie van Nederland. *Limosa* 14, p. 122.
 KAM, J. VAN DER (1956): Twee gevleugelde heersers van onze bossen. De Levende Natuur 59, p. 97—105.
 RUITER, H. (1942): Excursie in de omgeving van Heeze (N.Br.) op 17 mei 1942. *Limosa* 15, p. 125.

Utrecht, maart 1958.

SJ. BRAAKSMA.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 30, 1e deel

door

C. G. B. TEN KATE & J. TAAPKEN

Voor de gebruikte afkortingen en tekens en wijze van vermelding van ringplaatsen, zie het 28ste verslag (*Limosa* 30, 1957, p. 43—44). Alle opgaven zonder bronvermelding zijn afkomstig van het Vogeltrekstation (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden). Volgorde, wetenschappelijke en Nederlandse namen zijn in overeenstemming gebracht met die van de „Naamlijst van de Nederlandse Vogelsoorten” in Mededeling 1 van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna, afgedrukt in *Limosa* 31, p. 107—119. Ter vergemakkelijking van het raadplegen van de voorafgaande verslagen zijn de oude nummers tussen haakjes aangegeven.

Coördinaten van veel gebruikte ringplaatsen, II (voor I, zie *Limosa* 30, p. 43—44).

- Åmager, Kopenhagen (Sjaelland), Denemarken — 55° 38' N; 12° 34' E.
 Beuchel, Rügen, Oostzee (Mecklenburg), Duitsland — 54° 32' N; 13° 19' E.
 Bohdaneč (Pardubice), Tsjecho-Slowakije — 50° 06' N; 15° 40' E.
 Bukovina (Pardubice), Tsjecho-Slowakije — 50° 07' N; 15° 50' E.
 Celle (Niedersachsen), Duitsland — 52° 37' N; 10° 05' E.
 Chlumec n/Cidlina, plas „Zehun” (Hradec Králové), Tsjecho-Slowakije — 50° 08' N; 15° 21' E.