

„te hebben gehad. Dat was dus wel een heel andere doodsoorzaak „dan vergiftiging. Verder was de vogel geheel gaaf en uiterlijk „gezonder. Ik meen niet, dat overvoeding tot de plotselinge dood „kan hebben bijgedragen want de vogel was niet bijzonder vet : „vetafzetting in het mesenterium (darmscheil) en rondom de buik- „spieren was zelfs gering te noemen.”

De oorzaak van deze hersenbloeding met dodelijk gevolg blijft een raadsel. Het mag wel als een zeer groot toeval worden beschouwd, dat het plotseling sterven van de vogel een ooggetuige heeft gehad.

P. HENS.

Verslag van de Excursie van de afdeling N.O.V. naar Beetsterzwaag op 3 en 4 mei 1958

Op zaterdag 3 mei, bij prachtig zonnig maar koud weer, wordt een voorexcursie gehouden in de bossen achter hotel „het Witte Huis”, waar na afloop een 35-tal leden, met de voorzitter als vertegenwoordiger van het bestuur, zich verzamelen voor een gezellige maaltijd en de avond genoegelijk doorbrengen.

Des zondags wordt om 8.30 verzameld bij hotel „de Herder” en onder leiding van de heer BUISMAN, en jachtopzichter Oene DAM gewandeld door „Rome”, vervolgens over de Lippenhuister heide, en terug door het bos achter Lauswold. Het gezelschap is om 15.30 weer thuis. Op deze ideale excursiedag met bijna windstil, fris zonnig weer, werd dus het gebied nog eens goed gezien, waar ruilverkaveling en ontginning een eind dreigen te maken aan de prachtige graslanden, die nog een van de belangrijkste overwinteringsgebieden zijn voor de ganzen in Friesland en een bijzonder mooi broedgebied voor vele vogelsoorten. Ondanks de mode steeds over recreatie te praten en te schrijven, worden met nog meer ijver plannen gemaakt en helaas meestal ook uitgevoerd, die ons land zullen helpen degraderen tot een volkomen cultuursteppe, tot schade en schande van de alarmerend sterk toenemende bevolking. Hoe kunnen wij onze vogels beschermen, wanneer zij op deze wijze van hun biotopen worden beroofd?

Als gevolg van het koude, late voorjaar werden minder vogelsoorten waargenomen, dan verwacht mocht worden: slechts 74 soorten werden genoteerd. Nesten werden gezien van Buerd (Buteo buteo), Havik (Accipiter gentilis), Torenvalk (Falco tinnunculus), Kievit (Vanellus vanellus), Watersnip (Gallinago gallinago), Wulp (Numenius arquata), Grutto (Limosa limosa), en Zwarte Specht (Dryocopus martius). In de konijnenholen op de hei broedden Holenduiven (Columba oenas) en Kruisjes (Coturnix coturnix). Opvallend was dat in tegenstelling tot de meeste soorten de Gierzwaluwen (Apus apus) op tijd en volledig waren teruggekeerd. Verder viel op de afwezigheid van Graspiepers in dit ogenschijnlijk zo gunstige terrein. Onder andere werden waargenomen Winteruling (Anas crecca), Smient (Anas penelope), een drietal Kolganzen (Anser albifrons) (ten minste één daarvan met duidelijke tekenen van beschoten zijn), Regenwulp (Numenius phaeopus), Groenpootruiter (Tringa nebularia), kale Mezensoorten, Kramsvogels (Turdus pilaris), en ook Zanglijsters (Turdus philomelos), die kennelijk nog op doortrek waren. Sijsjes (Carduelis spinus), Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) en een groot aantal Reeën en Hazen. Een groep van 17 Reeën op een weidegebied was in staat zelfs verstokte vogelaars tot verrukking te brengen. Bij Gorredijk zal de Ooievaar (Ciconia ciconia) op zijn nest.

W. H. BIJMAN.