

Oproep om medewerking

Onderzoek broedvogelstand van de Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*) in Nederland

In 1959 stelt het R.I.V.O.N. (Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud) een onderzoek in naar het voorkomen van de Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*) als broedvogel in ons land.

In verband hiermee doet zij een beroep op de medewerking van de zijde van hen, die met de terreinen van deze vogelsoorten bekend zijn.

Het R.I.V.O.N. stelt in een enquête de volgende vragen voor:

1. In welke gemeente is uw waarnemingsgebied gelegen? Welke naam draagt het eventueel?
2. Hoe groot is de oppervlakte van het terrein?
3. Waaruit bestaat de vegetatie? (Heide, dennenbos, sparrenbos, etc.?)
4. Welke veranderingen heeft het gebied in de laatste jaren ondergaan en heeft dit volgens u invloed gehad op de vogelbevolking?
5. Op welke data is het terrein in 1959 door u bezocht?
6. Hoe groot was het aantal vogels op de verschillende bezoeken?
7. Hoe groot is volgens uw vermoeden het aantal broedparen?
8. Heeft de Nachtzwaluw volgens uw mening dit jaar met succes in het terrein gebroed?
9. Beschikt u nog over meer inlichtingen of gegevens van vroeger en van andere terreinen? Zo ja, zou u deze ook willen meedelen?
10. Wordt bij uw weten de Nachtzwaluw om een of andere reden vervolgd? Zo ja, om welke reden? Of is er een andere aanwijsbare oorzaak voor achteruitgang?

Kwartelkoning-inventarisatie 1959

In de jaren 1947 t m 1950 werd onder auspiciën van de toenmalige Afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van de Kwartelkoning (*Crex crex* (L.)) als broedvogel in Nederland. De resultaten van dit onderzoek werden in een uitvoerig rapport vastgelegd, dat in 1951 werd toegezonden aan de voornaamste medewerkers aan het onderzoek en aan verschillende andere hierin geïnteresseerden. Resumerend kan worden gezegd, dat het totale aantal broedparen in ons land destijds hoogstwaarschijnlijk minder dan 100 bedroeg. De soort werd in voornoemde jaren vrijwel uitsluitend in laaggelegen hooilanden aangetroffen. De meeste waarnemingen kwamen binnen uit de provincie Friesland, waar in 1947