

Korte mededelingen

WAARNEMINGEN VAN GRAUWE PIJLSTORMVOGELS

(Puffinus griseus) (**).

Op 28 oktober 1962 hebben wij in Scheveningen, in gezelschap van J. Kist, vrijwel de gehele dag vanuit de auto de boven zee langskomende vogels geobserveerd. Onze standplaats was juist ten zuiden van de ingang van de vissershaven, waar wij aan de aanwezigheid van een boei in zee, het schip Veronica en de opstand van het zuidelijke havenhoofd goede oriënteringspunten hadden. Er woei die dag een stevige wind, ZW kracht 7, tijdens windstoten oplopend tot 8 à 9.

Behalve honderden (!), voornamelijk volwassen Jan van Genten, die meest ver uit de kust bleven, passeerden ons o.a. 3 IJseenden en 6 Middelste Jagers in twee groepjes van 3 exemplaren. Hierbij was één adulte vogel met uitgegroeide, gedraaide middelste staartpennen. Bovendien namen wij een Noordse Pijlstormvogel waar, die vóór de storm uit in noordelijke richting langs scheerde.

Omstreeks 1 uur zagen wij vanuit het noordwesten twee donkere vogels laag over zee naderen. Aan de manier van vliegen en aan de lange, slanke en zeer spitse vleugels herkenden wij hen onmiddellijk als pijlstormvogels. Opvallend waren bovendien de donkere boven- en onderzijde. De grootte kwam ongeveer overeen met die van een Stormmeeuw. Aanvankelijk vlogen zij recht op ons af, maar later bogen zij, op ongeveer 300 m van de kust, af naar het zuiden en verdwenen tenslotte in zuidwestelijke richting uit ons gezichtsveld. Toen de vogels enige tijd evenwijdig aan de kustlijn vlogen, blonken de witte ondervleugeldekveren in het schaarse licht fel wit op.

Inmiddels hadden wij Kist op de vogels geattendeerd en ook hij zag de donker omrande witte vleugelonderzijden.

Gezien de grootte, het donkere totaalbeeld en de witte lengteband over de ondervleugel zijn wij er van overtuigd, dat het hier de Grauwe Pijlstormvogel, *Puffinus griseus* (Gmel.), betreft.

Hoewel er van onze kust tot heden maar drie vondsten van deze soort bekend zijn, is een waarneming langs onze kust onder bepaalde omstandigheden niet verwonderlijk. J. H. Phillips (British Birds, no. 6, 1963) wijst er op, dat *P. griseus* in de nazomer in het noordelijke gedeelte van de Noordzee een vrij regelmatige verschijning is. De soort trekt gewoonlijk ten westen van Engeland en Ierland naar de verre broedgebieden op het zuidelijk halfrond. Onze vogels moeten door de toen heersende storm verder de Noordzee op gedreven zijn.

A. M. van den Oord, J. Swaab.

SUMMARY:

Sight-record of the Sooty Shearwater (Puffinus griseus)

On October 28th, 1962 two specimens of the Sooty Shearwater were seen off the coast near Scheveningen. Till now only three finds were known for the Netherlands.