

spreken, maar van een niet regelmatige overzomeraar óf op sommige plaatsen regelmatig overzomerend in zeer klein aantal. A. B. Wittgen.

*WAARNEMING VAN DE IVOORMEEUW (Pagophila eburnea) IN DE WADDENZEE (**).*

Op 1 september 1963 om 13 uur konden wij op 8 km ten westen van Harlingen, achter de boot van Terschelling gedurende 5-10 minuten een meeuw waarnemen, die de volgende kenmerken had:

Geheel blinkend wit, behoudens een kleine zwarte vlek bovenop de vleugels bij de vleugelpunten. De vleugelpunten zelf waren wit. De buitenvlag van de eerste handpen was over een lengte van ongeveer vier cm vanaf de top eveneens zwart. Grootte ongeveer tussen die van Kokmeeuw en Stormmeeuw, doch er waren geen Stormmeeuwen, wel Kokmeeuwen voor vergelijking aanwezig. Romp relatief dik. Vorm van snavel ongeveer als die van Kokmeeuw. Kleur van snavel overwegend donker, naar de punt iets lichter; de juiste kleur kon niet nader worden vastgesteld. Oog donker. De kleur van de poten kon eveneens niet precies worden vastgesteld, maar deze was in elk geval zeer donker. Middelste staartpenen enigszins verlengd, wat vooral bij uitgespreide staart zeer duidelijk zichtbaar was. De vlucht was verschillend van die van de hem omringende Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen en deed denken aan die van een Dwergmeeuw, met veerkrachtige, soepele, moeiteloze vleugelslag. De vlucht maakte daardoor een elegante indruk.

De meeuw volgde temidden van een groot aantal Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen en Visdiefjes enige tijd het m.s. „Friesland” en viel reeds op grote afstand op door zijn blinkend witte voorkomen. Wij hebben hem tenslotte op een afstand van 5-10 meter gehad. De kleur deed sterk denken aan het wit van een Lepelaar.

Wij waren er van overtuigd met een Ivoormeeuw (*Pagophila eburnea* (Phipps)) te doen te hebben gehad en alleen het feit, dat deze soort sinds anderhalve eeuw niet in Nederland is waargenomen, deed ons aanvankelijk aarzelen deze overtuiging met klem uit te spreken. Het verheugt ons dat de Commissie voor de Nederlandse Avifauna intussen besloten heeft onze waarneming als eerste geval van deze soort van deze eeuw te aanvaarden. Het betreft een vogel in tweede of derde winterkleed. In dit verband zij voorts opgemerkt, dat het Handbook of British Birds (deel 5, 1946, p. 121) ongeveer zeventig waarnemingen van de Britse Eilanden vermeldt, verspreid over een groot deel van het jaar, van de herfst tot de lente.

H. Fischer, P. L. Ploeger.

SUMMARY:

Observation of Ivory Gull in the Netherlands.


A description is given of the observation of an Ivory Gull (*Pagophila eburnea*) in its second or third winter plumage on 1 September 1963 on the Wadden Sea, ca. 8 km west of Harlingen. The bird followed the m.v. „Friesland”, which is the ferry to Ter-

schelling, amidst a large flock of Herring Gulls, Blackheaded Gulls and Common Terns. It is the first record of this species in the Netherlands for this century.

KLEINE MANTELMEEUWEN (Larus fuscus) MET VLEUGEL-VLEKKEN

In de nazomer van 1963 heb ik enkele adulte Kleine Mantelmeeuwen waargenomen met een ongewone vleugeltekening, n.l. 3 ex. op 31 augustus in de Wassenaarse duinen, en 2 en 1 ex (met een tussenpoos van ongeveer een half uur) op 3 september boven zee bij Scheveningen.

Naast het normale wit op de uiteinden van de hand- en armpennen — cp de bovenvleugels — hadden deze meeuwen op de vleugeldekveren van de grote en kleine slagpennen enige witte vlekken; in vlucht leken deze mantelmeeuwen daarom een onregelmatige, smalle, en iets naar voren liggende vleugelstreep te hebben. De rest van het verenkleed was als dat van de gewone Kleine Mantelmeeuw.



Zeer waarschijnlijk betreft het hier een toevallig optredende mutatie, welke in Europa (wellicht ondermeer) is aangetroffen in Engeland en ook in het westelijke gedeelte van de Oostzee; in Nederland was deze vorm waarschijnlijk nog niet waargenomen (Vooüs in litt.).

De vogels van 31 augustus vlogen over de buitenste duinenrij in zuidwestelijke richting, die van 3 september ongeveer 300 m uit de kust, ook naar het zuidwesten (waargenomen vanaf havenhoofd, mede door F. Jansen), alle zes kennelijk trekkend.

Het zou interessant zijn te weten of dit meeuwentype kans zal zien zich in dit jaar of in de volgende jaren uit te breiden, óf dat het verloren zal gaan. Elke waarneming van Kleine Mantelmeeuwen met vleugelvlekken is dus van belang.

J. Gallacher.

SUMMARY:

Lesser Black-backed Gull with abnormal wing pattern.

At least five, probably six Lesser Black-backed Gulls (*Larus fuscus*) with white patches on the upperside of the wing (see the Figure) have been observed on 31 August 1963 at Wassenaar and 3 September 1963 at Scheveningen. All birds observed were in fully adult definite winter plumage. There have been more observations in western Europe of gulls with this abnormal wing pattern, but so far this seems to be the first published record for the Netherlands.