

Korte Mededelingen

EEN NIEUW BROEDGEVAL VAN DE ROODHALSFUUT (Podiceps griseigena) IN NEDERLAND.

Op 16 april 1966 werd bij één der vele bezoeken aan het spaarbekken van de Rotterdamse Drinkwaterleiding aan de Nesserdijk te Rotterdam-Oost een Roodhalsfuut in prachtkleed waargenomen. Het spaarbekken is een ongeveer 15 hectare grote en gemiddeld 1 meter diepe kunstmatige plas met enkele ijle riet- en lisdoddeveldjes en is door de betrekkelijke rust en de grote voedselrijkdom zeer in trek bij watervogels van diverse pluimage.

Zondag, 8 mei deelde C. D. Batenburg uit Ouderkerk a.d. IJssel mij mede dat hij die dag op bovenvermelde plaats 2 ex. had waargenomen. Eén der vogels zwom rond met wat nestmateriaal.




Foto P. DUIVEN

Roodhalsfuut (*Podiceps griseigena*), broedend, mei 1966. Rotterdam-O.

Hierdoor „gealarmeerd” bezocht ondergetekende de daarop volgende ochtend (9 mei 1966) het gebied en behalve, dat de waarneming kon worden bevestigd, werd nu aan de rand van een klein rietveldje een nest ontdekt. Bij aankomst werd één der vogels op het nest aangetroffen. Het andere ex. zwom wat rond en dook naar voedsel (stekeltjes en kikkervisjes) of nestmateriaal. De open ligging van het nest (tussen riet en oever was een ruim 10 meter brede strook water) en de geringe schuwheid van beide vogels boden een

gunstige gelegenheid ze te observeren. Toen na enige tijd de broedende vogel opstond, bleken minstens 3 eieren in het nest te liggen.

Op 10 mei werden met zekerheid 4 eieren geteld.

Aan het waarnemen van het gedrag der Roodhalsfuten op en in de omgeving van het nest werd daarna dagelijks door leden van Vogelwerkgroep Krimpenerwaard enige tijd besteed. Tevens werd een en ander gefotografeerd. Inmiddels was gebleken, dat ook enkele leden van Vogelwerkgroep Vlaardingen/Schiedam ongeveer gelijktijdig het broedgeval hadden ontdekt.

De geraadpleegde „Avifauna van Nederland” verschaftte informatie over een tweetal eerder vastgestelde broedgevallen: in 1918 in Brielle en in 1927 bij Kortenhoef. Voor zover bekend mogen we dus aannemen, dat de hier genoemde waarnemingen betrekking hebben op het derde broedgeval in deze eeuw van deze, voor ons land zeer zeldzame broedvogel.

Volledig geslaagd is deze derde broedpoging niet, want op Hemelvaartsdag (19 mei 1966) gingen bij stormachtige wind nest en eieren door golfslag verloren. De aanhoudende harde wind tijdens de daarop volgende dagen deed hernieuwde nestbouwopgingen mislukken. De hoop op eventueel succes verdween geheel, toen op 2 juni één der Roodhalsfuten dood op de plas werd aangetroffen. Het overgebleven ex. werd daarna nog regelmatig gezien; de laatste maal op 18 juni 1966.

P. Duiven.

SUMMARY:

A new breeding-case of the Red-necked Grebe.

In May 1966 a nest of the Red-necked Grebe was found in Rotterdam-East. This is the third case for the Netherlands.

*WAARNEMING VAN EEN RALREIGER (Ardeola ralloides) OP SCHOUWEN (**).*

Op 20 augustus 1966 hebben wij op Schouwen ten W.N.W. van Renesse in de buurt van het „Watergat” een Ralreiger waargenomen. Een vriend, de heer A. C. de Jonge te Ellemeet, lid van de vogelwacht „Schouwen-Duiveland”, had mij een paar dagen van te voren telefonisch meegedeeld, dat hier een dwaalgast gesignaleerd was, het eerst door de heer L. Kouwen te Renesse, bestuurslid van bovengenoemde vogelwacht; de vogel moest volgens de heer De Jonge, die hem 16 en 19 augustus (de eerste maal samen met de heer Kouwen) al had gezien, een Koe- of een Ralreiger zijn.

Mijn vrouw, lid van de vogelwacht „Utrecht”, de heer De Jonge en ik waren 's morgens $\pm$ half acht in het gebied, waar de vogel zich ophield. We kregen hem spoedig te zien, aan de rand van een weiland, aan drie zijden omzoomd met vrij laag geboomte (els en wilg in hoofdzaak) langs smalle sloten, gedeeltelijk begroeid met riet. De afstand bedroeg $\pm$ 100 m. We hadden de zon in de rug en de wind was N.O. (zwak). Het beeld van de vogel