

liepen dan Kolganzen; „dribbelen” zou een beter woord zijn. Ook het klapwieken had een veel hoger tempo. Het ruzie-geluid en de conversatie-geluiden zou men haast snorrend kunnen noemen. De bewegingen bij „botsingen” tussen twee families leken wel een versnelde film van de ruzies die we in Kolganzen-troepen plegen te zien.

SUMMARY:

An important field character of the Lesser White-fronted Goose

During a 6 days stay in the Hortobágy puszta, Hungary October 30th—November 4th 1966 special attention was paid to the rythm of the call of the Lesser White-fronted Goose. The high rythm of the di- or trisyllabic call of flying Lesser Whitefronts proved a still more valuable field character than its hight. This applies also to the conversational- and quarreling note and to the general appearance (gait, wingflap, grazing speed and quarreling movements).

Middelburg
Lisse

, november 1966.

T. Lebreton en J. Philippona.

*TWEE SNEEUWGANZEN (Anser caerulescens) VAN DE „BLAUWE” PHASE, AAN DE KNARDIJK, OOSTELIJK FLEVOLAND (**).*

Op 11 oktober 1966 bracht ik een werkbezoek aan O. Flevoland, in gezelschap van dr. F. K. Möllring, bioloog bij de Zeiss-fabrieken in Duitsland.

Aan de Knardijk aangekomen zagen wij in een plas ter hoogte van hmpaal 18 zestig Grauwe Ganzen.

Bij het observeren van deze vogels bemerkten wij 2 Sneeuwganzen van de „blauwe” phase. De afstand bedroeg plm. 120 meter, zodat wij met de zon in de rug de ganzen door onze veldkijkers (12 x 60 en 10 x 50) goed konden determineren. Naast een witte kop en een gedeeltelijk witte hals, was de kleur van het lichaam grijsachtig-blauw met een witte afranding, die ook voorkomt bij de Grauwe Ganzen. De poten kregen wij niet te zien, doch de snavels waren vleeskleurig en zwartig aangezet, terwijl de Sneeuwganzen kennelijk kleiner waren dan de aanwezige Grauwe Ganzen.

Gelukkig was dr. Möllring uitgerust met goed filmmateriaal, zodat hij de vogels kon filmen. Vanaf de 8 mm kleurenfilm heeft hij kans gezien zwartwit afdrukken te maken.

Aan de hand van de bijzonderheden van de gedane waarneming en de diverse foto's heeft de Commissie voor de Nederlandse Avifauna deze aanvaard.

Arn. van den Berg.

SUMMARY:

Record of the „Blue” phase of the Snow-Goose

On October 11th, 1966 two specimens of the „blue” phase of the Snow-Goose were seen and filmed near the Knardijk, in the new Polder Oostelijk Flevoland.



Foto dr. F. K. MÖLLRING

Een van de beide „Blauwe” Sneeuwganzen tussen Grauwe Ganzen. Oostelijk Flevoland, Knardijk, 11 oktober 1966.

*STEPPENKIEKENDIEF (Circus macrourus) IN NOORD-BRABANT (**).*

Op 22 oktober 1966 ondernam ik met mijn echtgenote een vogelexcursie naar de Strabrechtse heide en wel naar het Z.W. gedeelte, grenzend aan het gehucht Kreil (gem. Heeze). Het bleek een gunstige roofvogeldag: in de loop van ca 1½ uur namen wij waar 2 Buizerds, 1 ♀ Sperwer, 1 Torenvalk en 1 ♀ Blauwe Kiekendief. Om ca half vier zagen we plotseling op ongeveer 400 m afstand een grote, zeer lichte vogel laag over de heide vliegen.

Het vliegbeeld en de vliegwijze wezen er duidelijk op, dat wij hier met een