

IJsselmeer te vliegen. We namen dit alles waar met prismakijkers 10 x 50 en 7 x 50 van 13.40—13.46 uur en hadden daarbij het licht tijdelijk geheel mee en verder van opzij.

We konden voorts nog het volgende noteren: grootte ca als van Zwarte Stern; nogal opvallende zandkleurige borstband, vrij plotseling overgaand in het wit van de buik (keelkleur niet gezien); duidelijk gevorkte staart (als van Visdief), wat tijdens het vliegen niet opviel, omdat de vogel, net als een Visdief wel doet, de staartpennen tegen elkaar hield, maar bij het zwenken staken de beide punten duidelijk tegen de blauwe lucht af; zeer korte snavel; stuit en staartwortel helder wit; staartpennen zwart; bovenzijde van de vleugels en rug geheel egaal donkerbruin, evenals de staartpennen een scherp contrast vormend met de witte stuit; ondervleugels geheel donker, zwartbruin, waarop ook bij zeer mooie belichting geen „rosse” kleur was te ontdekken tijdens het zwenken; bij vrij vaak gehouden zweefpauzes werden de vleugels iets omlaag gehouden.

Wij menen, na thuis de ter beschikking staande literatuur te hebben geraadpleegd, een Steppenvorkstaartplevier te hebben waargenomen.

Heerlen.

H. Bult, R. Goldbach.

SUMMARY:

New record of the Black-winged Pratincole

On August 16th, 1966 a specimen of the Black-winged Pratincole was seen on the Knardijk in the new Polder Oostelijk Flevoland. This is the fourth record for the Netherlands.

ENKELE GEGEVENS OVER HET BEGIN VAN DE BROEDTIJD VAN DE KOKMEEUW (Larus ridibundus) IN ONS LAND.

Volgens „De Nederlandsche Vogels” (deel 3, p. 915) begint de broedtijd van de Kokmeeuw in ons land eerst in het laatst van april. De aanduiding in dit standaardwerk is niet geheel correct zoals mag blijken uit enkele gegevens, die ik hierover in 1962 en 1963 verzamelde via een oproep aan een aantal beheerders en bewakers van Kokmeeuwenkolonies. Aan genoemde personen werd gevraagd naar de datum, waarop in hun terrein de eerste eieren werden gevonden. De gegevens zijn vermeld in onderstaande tabel, waarin tevens enkele opgaven uit 1961 zijn opgenomen. Alle berichtgevers wil ik hier hartelijk danken voor hun opgaven.

Bij de beoordeling van deze gegevens moet men rekening houden met het feit, dat niet alle bewakers dagelijks de kolonie bezochten, waardoor in verschillende gevallen de eerste eieren enkele dagen later zijn gevonden dan de datum, waarop ze zijn gelegd. De verschillen tussen de kolonies onderling kunnen hierop echter slechts ten dele worden teruggevoerd, omdat de bezoeken aan de kolonies zeker eenmaal, maar in de meeste gevallen minstens twee keer per week plaats vonden.

	Kolonie	1961	1962	1963
Zuidhollandse eilanden	{ De Beer		10 april	11 april
	{ Voorne		10 april	28 april
	{ Scheelhoek		16 april	15 april
	{ Goeree		9 mei*	30 april*
Zuid- en Midden-Nederland	{ Braakman			1 mei
	{ Ospel (L.)		17 april	15 april
	{ Nederweert (L.)		20 april	1 mei
	{ Zuilichem			30 april
	{ Leersum		23 april	29 april
	{ Reeuwijk		23 april	21 april
	{ Hilversum	24 april	24 april	22 april
Noord-Nederland	{ Zaandam			5 mei
	{ Wieringermeer	27 april		
	{ Makkumerwaard		28 april	26 april
	{ Punt van Reide		± 10 mei*	
	{ Vlieland		30 april	2 mei
	{ Terschelling		17 mei*	4 mei
	{ Schiermonnikoog			6 mei

* De meeuwen keerden in deze gevallen eerst in de tweede decade van april op de broedplaatsen terug. Gewoonlijk is dit bijkijns de opgaven in maart. (De gegevens over terugkeer van de vogels op de broedplaatsen betreffen slechts 15 opgaven, 2 in 1961, 10 in 1962 en 3 in 1963.)

Uit de tabel blijkt dat de broedtijd voor verscheidene kolonies een heel stuk vroeger begint dan „De Nederlandsche Vogels” aangeeft. De verschillen zijn echter grotendeels regionaal bepaald. Het vroegst zijn de meeuwen op de Zuidhollandse eilanden (vanaf einde eerste of begin tweede decade van april); in de loop van de tweede helft van april volgen de meeste kolonies uit Zuid- en Midden-Nederland. Eind april en begin mei komen eerst de meeuwen uit het noorden van ons land.

De opgave in „De Nederlandsche Vogels” is niet zozeer onjuist dan wel onvolledig, omdat Tsj. de Vries, die de rubriek broedbiologie in dit werk heeft verzorgd, als Fries oöloog wel voornamelijk gegevens tot zijn beschikking zal hebben gehad uit het noorden van ons land, waar de broedtijd inderdaad eerst eind april begint.

A. L. Spaans.

DECEMBERWAARNEMING VAN EEN NOORDSE STERN (*Sterna paradisaea*).

Op 26 december 1966, 's morgens elf uur, bevonden een vijftal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem zich, bij zonnig en bijna windstil weer, op de Zuiderpier te IJmuiden vlak bij het hek voor het niet toegankelijke gedeelte, ongeveer 1 km van de kustlijn.

Plotseling werd onze aandacht getroffen door een stern, die rondvloog