

Korte Mededelingen

*VERMOEDELIJKE WAARNEMING VAN DE OOSTEUROPESE
GRAUWE GANS (Anser anser rubrirostris)*

In de uiterwaarden van de Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen werden op 12 februari 1967 twee Grauwe Ganzen waargenomen die, op grond van de hieronder te noemen kenmerken, tot de oostelijke vorm van deze soort (*Anser anser rubrirostris*) zouden kunnen behoren.

De vogels werden, bij zeer gunstige waarnemingsomstandigheden (helder weer, zon in de rug, afstand ± 40 m) van achter een dijkje langdurig met een 7 x 50 kijker geobserveerd, waarbij de volgende karakteristieke kenmerken werden genoteerd.

Gehele lichaam zeer licht gekleurd, borst en buik zelfs vrijwel wit. Kop, hals en flanken waren plaatselijk iets donkerder getint, maar toch nog lichter dan bij *Anser anser anser*. Zeer opvallend was de lichte bovenzijde met duidelijk zichtbare witte dwarsbanden.

De snavelkleur was, evenals die van de poten, helder rose-rood zonder enig spoor van de peenkleurige tint die bij mogelijke overgangsvormen tussen *A. a. anser* en *A. a. rubrirostris* werd waargenomen. Het lijkt mij dan ook zeer waarschijnlijk dat de door mij waargenomen vogels tot de vorm *Anser anser rubrirostris* of tot een nauw bij deze vorm aansluitende overgangspopulatie behoren.

Utrecht, maart 1968.

L. M. J. v. d. Bergh.

Naschrift. Er zijn reeds eerder veldwaarnemingen van de oostelijke vorm van de Grauwe Gans in Nederland in „Limosa” gepubliceerd. Laatstelijk betrof dit, behalve het bovenstaande geval, een waarneming van vier exemplaren op 3 maart 1965 te Klundert (Limosa 40, 1967: 21). Ofschoon de gegeven beschrijvingen er wel op wijzen dat de determinaties juist zouden kunnen zijn, meent de Commissie voor de Nederlandse Avifauna toch, bij afwezigheid van bewijsmateriaal, voorlopig van opname in de lijst van de Nederlandse avifauna te moeten afzien omdat de Midden- en Oost-Europese populaties van de Grauwe Gans de kenmerken van een zgn. mengpopulatie van de ondersoorten *anser* en *rubrirostris* vertonen en er in hun broedgebieden veel kleine, geheel of ten dele wilde populaties voorkomen die, wederom geheel of gedeeltelijk, door de mens tot stand zijn gekomen en waaraan vogels van onbekende herkomst hebben deelgenomen. Het Europese beeld van *Anser anser rubrirostris* is daardoor zeer gecompliceerd geworden. Het wachten is dus op een verzameld exemplaar dat op ondubbelzinnige wijze tot de vorm *rubrirostris* gerekend moet worden. — Red.